

**نشرة الدواء**: معلومات للمريض

## ستافين ١٠، ٢٠و ٤٠ملغ أقراص سيمفاستاتين

**اقرأ هذه النشرة بالكامل بعناية قبل القيام بتناول هذا الدواء حيث أنها تحتوي على معلومات مهمة لك.**

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج إليها لاحقاً
- في حال وجود أي تساؤلات لديك، يفضل استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي.
- لقد وصف هذا الدواء لك شخصياً، ولا ينبغي لك أن تعطه لأحد آخر حتى لو ظهرت عليه أعراض مرضك فقد يؤدي ذلك إلى الإضرار به.
- إذا أصبت بأي آثار جانبية غير مذكورة في هذه النشرة، أخبر الطبيب المعالج أو الصيدلي، مراجعة القسم ٤.

**ما الذي تحتويه هذه النشرة**

- ما هو ستافين وما هي دواعي استعماله
- ما الذي يجب عليك معرفته قبل تناول ستافين
- ما هي طريقة تناول ستافين
- الأعراض الجانبية المحتملة
- طريقة تخزين ستافين
- محتويات العلبة ومعلومات إضافية أخرى

**١ ما هو ستافين وما هي دواعي استعماله**
يحتوي ستافين على المادة الفعالة سيمفاستاتين. ستافين هو دواء يُستخدم لخفض مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول "الضار" (أي كوليسترول البروتين الدهني المنخفض الكثافة (LDL) والمواد الدهنية التي تسمى الدهون الثلاثية التي تسمى الكوليسترول، بالإضافة إلى ذلك، يرفع ستافين مستويات الكوليسترول "الجيد" (أي كوليسترول البروتين الدهني العالي الكثافة (HDL).
يتميز ستافين إلى فئة الأدوية تسمى عائلة الستاتين.
الكوليسترول هو إحدى المواد الدهنية العديدة الموجودة في مجرى الدم، يتكون الكوليسترول الكلي بشكل أساسي من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة وكوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة.

غالبًا ما يُطلق على كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) اسم الكوليسترول "الجيد" لأنه يمنع تراكم الكوليسترول الضار في الشرايين ويبقي من أمراض القلب. تعد الدهون الثلاثية شكّل من أشكال الدهون في الدم والتي قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض قلبية. يجب أن لتزوم بنظام غذائي يخفض الكوليسترول أثناء تناول هذا الدواء.
يستخدم ستافين بالإضافة إلى النظام الغذائي الذي يخفض الكوليسترول إذا كنت تعاني من:
• ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم (فرط كوليسترول الدم الابتدائي) أو ارتفاع مستويات الدهون في الدم (فرط شحميات الدم المشترك العائلي).
• مرض وراثي (فرط كوليسترول الدم العائلي) متمثل الربيوجت) الذي يزيد من مستوى الكوليسترول في الدم. قد تتلقى أيضا علاجات أخرى.
• أمراض القلب التاجية أو إذا كنت عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية (في حال كنت تعاني من داء السكري أو إذا عانيت سابقًا من السكتة الدماغية، أو أمراض الأوعية الدموية الأخرى). قد يفسد ستافين صحتك من خلال تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، بغض النظر عن نسبة الكوليسترول في الدم.
معظم الناس لا يواجهون أعراض ارتفاع الكوليسترول بشكل مباشر. يستطيع الطبيب المعالج قياس نسبة الكوليسترول لديك من خلال فحص دم بسيط. قم بزيارة الطبيب المعالج بانتظام وناقش أهدافك معه وتوقع نسبة الكوليسترول لديك.

**٢ ما الذي يجب عليك معرفته قبل تناول ستافين**

- إذا كان لديك حساسية (حساسية مفردة) لسيمفاستاتين أو لأي من مكوّنات هذا الدواء الأخرى (المدرجة في القسم ١؛ محتويات العلبة ومعلومات إضافية أخرى).
- إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد.
- إذا كنت حاملاً أو ترضعين طفلك.
- إذا كنت تتناول دواء (أو أدوية) يحتوي على مادة أو أكثر من المواد الفعالة التالية:
  - إيتراكوزول، كيتوكونازول، بوساكونازول، أو فوريكونازول (التي تُستخدم لمعالجة الالتهابات الفطرية).
  - إرتروميسين، كلاريثروميسين، أو تيليثروميسين (التي تُستخدم لمعالجة الالتهابات).
  - مثبطات الأنزيم البروتيني لمعالجة فيروس نقص المناعة البشرية مثل إندينايفر، نيلفينايفر، ريتونايفر وساكوينافير (تُستخدم مثبطات الأنزيم البروتيني لمعالجة فيروس نقص المناعة البكتيرية).
  - بوسبيريفير أو تيلابريفير (التي تُستخدم لمعالجة فيروس التهاب الكبد من النوع C).
  - نيفازودون (يُستخدم لمعالجة الاكتئاب).
  - كوبيسيستات.
  - جمفيروزيل (يُستخدم لمعالجة الكوليسترول).
  - سيكلوسبورين (الذي يتم وصفه للمرضى بعد زراعة الأعضاء).
- داناوول (هرمون من صنع الإنسان يُستخدم لمعالجة الانتباه البطني الرحمي، وهي حالة تنمو فيها بطانة الرحم خارج الرحم).
- إذا كنت تتناول أو تناولت في الأيام السبعة الماضية، دواء يسمى حمض الفوسيديك (دواء لمعالجة العدوى البكتيرية) عن طريق الفم أو عن طريق الحقن. قد يؤدي تناول حمض الفوسيديك وستافين إلى مشاكل عضلية خطيرة (انحلال الريدات).
- لا تتناول أكثر من ٤٠ ملغ من ستافين إذا كنت تتناول لوميتانيد (يُستخدم لمعالجة مرض الكوليسترول الوراثي الخطير والنادر).
- اسأل الطبيب المعالج إذا لست متأكدًا من أنك تتناول أحد الأدوية المذكورة أعلاه

**التحذيرات والإحتياطات**

أبلغ الطبيب المعالج:

- عن جميع الأمراض التي تعاني منها بما في ذلك الحساسية.
- إذا كنت تشرب كميات كبيرة من الكحول.
- إذا كنت قد عانيت سابقًا من مرض في الكبد. قد لا يكون ستافين مناسبًا لك.
- إذا كنت على وشك إجراء عملية جراحية. قد تحتاج إلى التوقف عن تناول أقراص ستافين لفترة قصيرة.
- إذا كنت أسديولاً، فقد تحتاج إلى جرعة مختلفة.

يجب أن يجري لك الطبيب المعالج فحص دم قبل البدء من تناول ستافين وإذا واجهت أي أعراض ناتجة عن مشاكل في الكبد أثناء تناول ستافين، وذلك للتأكد من وظائف الكبد لديك. قد يطلب منك الطبيب المعالج أيضا إجراء فحوصات الدم للتحقق من وظائف الكبد بعد أن تبدأ في تناول ستافين.
سيرافيك الطبيب المعالج عن كُتب أثناء تناولك لهذا الدواء. خصوصًا إذا كنت تعاني من مرض السكري أو إذا كنت عرضة لخطر الإصابة بمرض السكري. من المحتمل أن تكون معرضًا لخطر الإصابة بمرض السكري إذا كنت تتناول ستافين مع أدوية السكري.
أخبر الطبيب المعالج إذا كنت تعاني من مرض نثوي حاد.

**اتصل بالطبيب المعالج على الفور إذا كنت تعاني من آلام وضعف في العضلات أو مبرر لها، لأنها نادرًا ما قد تكون أعراضًا لأضرار خطيرة في العضلات، بما في ذلك تفكك العضلات ما يؤدي إلى تلف الكلى؛ وفي حالات نادرة جدًا أدت إلى الوفاة.**

يكون خطر الإصابة بتفكك العضلات أكبر عند تناول جرعات عالية من ستافين، وخاصة جرعة ٨٠ ملغ. كما أن خطر الإصابة بتفكك العضلات يكون أكبر لدى بعض المرضى. استشر الطبيب المعالج إذا كانت الشروط أدناه تنطبق عليك:

- إذا كنت تشرب كميات كبيرة من الكحول.
- إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى.
- إذا كنت تتناول في العدة الدرقية.
- إذا كنت تبلغ من العمر ٦٥ عامًا أو أكثر.
- إذا كنت امرأة.
- إذا كنت قد عانيت من مشاكل في العضلات أثناء العلاج بأدوية تخفض الكوليسترول مثل عائلة "الستاتين" أو الفايبريت.
- إذا كنت تعاني أنت أو أحد أفراد أسرتك من اضطراب عضلي وراثي.

أخبر الطبيب المعالج أو الصيدلي أيضًا إذا كنت تعاني من ضعف عضلي دائم. قد تحتاج إلى إجراء بعض الاختبارات وتناول أدوية إضافية لتشخيص المرض ومعالجته.

**الأطفال والمراهقون**

لقد أُجريت دراسة حول سلامة ستافين وعالبيته لدي الفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين ١٧ و ١٩ عامًا ولدى الفتيات اللواتي بدأن الدورة الشهرية (الحيض) قبل عام واحد على الأقل (مراجعة القسم ٣، ما هي طريقة تناول ستافين). لم تجرد دراسة لستافين لدى الأطفال ما دون ١٠ سنوات. لمزيد من المعلومات، استشر الطبيب المعالج.

**الأدوية الأخرى وستافين**

أبلغ الطبيب المعالج إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا أو قد تتناول أي دواء (أو أدوية) أخرى تحتوي على إحدى المواد الفعالة التالية. قد يؤدي تناول ستافين إلى جانب أي من الأدوية التالية إلى زيادة خطر حدوث مشاكل في العضلات (لقد تم إراج بعض هذه الأدوية في القسم أعلاه "لا تتناول ستافين").
• إذا كنت بحاجة إلى تناول حمض الفوسيديك عن طريق الفم لمعالجة عدوى بكتيرية، ستضطر إلى التوقف عن استخدام هذا الدواء لفترة مؤقتة. سيخبرك الطبيب المعالج متى يمكنك تناول ستافين من جديد. نادرًا ما يؤدي تناول ستافين إلى جانب حمض الفوسيديك إلى ضعف أو آلام في العضلات أو ترققها (انحلال الريدات).
• لمزيد من المعلومات حول انحلال الريدات، مراجعة القسم ٤.

- السيكلوسبورين (غالبًا ما يتم وصفه للمرضى بعد زراعة الأعضاء)
- داناوول (هرمون من صنع الإنسان يُستخدم لمعالجة الانتباه البطني الرحمي، وهي حالة تنمو فيها بطانة الرحم خارج الرحم).
- الأدوية التي تحتوي على مكونات فعالة مثل إيتراكونازول، كيتوكونازول، فلوكونازول، بوساكونازول، أو فوريكونازول (تستخدم لمعالجة الالتهابات الفطرية).
- عائلة الفايبرات التي تحتوي على مادة فعالة مثل جيمفيروزيل وبيزافيربات (تستخدم لخفض الكوليسترول).
- إرتروميسين، كلاريثروميسين، أو تيليثروميسين (تستخدم لمعالجة العدوى البكتيرية).
- مثبطات الأنزيم البروتيني لمعالجة فيروس نقص المناعة البشرية مثل إندينايفر ونلفينايفر وريتونايفر وساكوينافير (المستخدمة لمعالجة الإيدز).
- مضادات الفيروسات لمعالجة التهاب الكبد C مثل بوسبيريفر، تيلابريفير، الباسفير، أو جرازوبريفير (تُستخدم لمعالجة التهاب الكبد C الفيروسي).
- نيفازودون (يُستعمل لعلاج الاكتئاب).

- الأدوية التي تحتوي على المادة الفعالة كوبيسيستات.
- الأمودارون (يستخدم لمعالجة اضطراب نظم القلب).
- فيراباميل، ديلتيازم، أملوديبين (تستخدم لمعالجة ارتفاع ضغط الدم، آلام الصدر المتعلقة بأمراض القلب أو اضطرابات القلب الأخرى).
- لوميتانيد (يُستخدم لمعالجة ارتفاع الكوليسترول الوراثي الخطير والنادر).
- دانتومايد (دواء يُستخدم لمعالجة التهابات الحلمية والتهابات بنية الجلد وتجربم الدم). من الممكن أن تكون الآثار الجانبية التي تصيب العضلات أكثر حدة عند تناول هذا الدواء أثناء العلاج بسيمفاستاتين (مثل ستافين). قد يطلب منك الطبيب المعالج أن تتوقف عن تناول ستافين لفترة قصيرة.
- كولنيسين (يُستخدم لمعالجة التقرس).
- تيكاجريلور (دواء مضاد للصفائح).

بالإضافة إلى الأدوية المذكورة أعلاه، أخبر الطبيب المعالج أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا أي أدوية أخرى. بما في ذلك الأدوية التي يتم الحصول عليها بدون وصفة طبية.

- نيكاجريلور (دواء مضاد للصفائح).
- بالإضافة إلى الأدوية المذكورة أعلاه، أخبر الطبيب المعالج أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا أي أدوية أخرى. بما في ذلك الأدوية التي يتم الحصول عليها بدون وصفة طبية.
- الأدوية التي تحتوي على مكونات فعالة لمنع تجلط الدم، مثل الوارفارين، الفينبروكومون أو أسينوكومارول (مضادات التخثر).
- فينوفايبرات (يُستخدم أيضًا لخفض الكوليسترول).
- النيباسين (يُستخدم أيضًا لخفض الكوليسترول).
- ريفامبيسين (لمعالجة السل).

كما يجب أن تبلغ كل طبيب يصف لك دواءً جديدًا أنك تتناول ستافين.

**ستافين مع الطعام والشراب**

يحتوي عصير الجريب فروت على مادة أو أكثر من المواد التي تغير طريقة استجابة الجسم لبعض المنتجات الطبية، بما في ذلك الستافين. تجنب شرب عصير الجريب فروت أثناء تناول هذا الدواء.

**الحمل والرضاعة الطبيعية**

لا تتناولي ستافين إذا كنت حاملاً أو تحاولين الإنجاب أو إذا كنت تعتقدين أنك حامل. إذا حملت أثناء تناول ستافين، توقفي عن تناوله فورًا واتصلي بالطبيب المعالج. لا تتناولي ستافين إذا كنت ترضعين طفلك لأنه من غير المعروف ما إذا كان هذا الدواء ينتقل إلى حليب الثدي.

استشيري الطبيب المعالج أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.

**القيادة واستخدام الآلات**

من غير المضمّن أن يؤثر ستافين على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات، ومع ذلك، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن بعض الناس يشعرون بالدوار بعد تناول ستافين.

**يحتوي ستافين على اللاكتوز**

تحتوي أقراص ستافين على سكر يسمى اللاكتوز. إذا كنت لا تهضم بعض السكريات، اتصل بالطبيب المعالج قبل تناول هذا الدواء.

**٣ ما هي طريقة تناول ستافين**

سيحدد الطبيب المعالج مقدار الجرعة المناسب لك، وذلك بناءً على حالتك الصحية وعلاجك الحالي ونسبة المخاطر التي قد تكون عرضة لها.

اتبع بدقة إرشادات الطبيب المعالج عند تناول هذا الدواء، واستشر الطبيب المعالج أو الصيدلي إذا لست متأكدًا. كما يجب أن لتزوم بنظام غذائي يخفض الكوليسترول أثناء تناول ستافين.

مقدار الجرعة:
الجرعة الموصى بها هي سيمفاستاتين ٥ ملغ، ١٠ ملغ، ٢٠ ملغ، ٤٠ ملغ، أو ٨٠ ملغ يتم تناولها عن طريق الفم مرة واحدة في اليوم.

البالغون:
عادةً ما تكون الجرعة الأولى ١٠، ٢٠، أو في بعض الحالات، ٤٠ ملغ في اليوم. قد يقوم الطبيب المعالج بتعديل جرعتك بعد ٤ أسابيع على الأقل إلى ٨٠ ملغ كحد أقصى في اليوم.

**لا تتناول أكثر من ٨٠ ملغ في اليوم.**
قد يصف لك الطبيب المعالج جرعات أقل، خاصة إذا كنت تتناول بعض الأدوية المذكورة أعلاه أو إذا كنت تعاني من بعض أمراض الكلى.

لا يتم وصف جرعة ٨٠ ملغ إلا للمرضى البالغين الذين يعانون من مستويات عالية جدًا من الكوليسترول في الدم والمعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والذين لم يصلوا إلى مستوى الكوليسترول المطلوب من خلال تناول جرعات أقل.

**الأطفال والمراهقون:**

للأطفال (١٠-١٧ سنة)؛ عادةً ما تكون الجرعة الأولى الموصى بها ١٠ ملغ في اليوم يتم تناولها مساءً. الجرعة القصوى الموصى بها هي ٤٠ ملغ في اليوم.

**طريقة تناول هذا الدواء:**

تناول ستافين في المساء. يمكنك أن تتناوله مع أو بدون الطعام. لا تتوقف عن تناول ستافين ما لم يطلب منك الطبيب المعالج ذلك. إذا وصف لك الطبيب المعالج ستافين مع دواء آخر يخفض الكولسترول ويحتوي على أي منحيات الحمض الصفراوي، يجب أن تتناول ستافين قبل ساعتين على الأقل أو بعد ٤ ساعات من تناول منحيات الحمض الصفراوي.

**إذا تناولت ستافين بكمية أكبر مما ينبغي عليك**

- يرجى الاتصال بالطبيب المعالج أو الصيدلي.
- إذا نسيت تناول ستافين
- لا تتناول جرعة مضاعفة للتعويض عن الجرعة الفائتة. تناول فقط الجرعة المعتادة من ستافين في الوقت المعتاد في اليوم التالي.

**إذا توقفت عن تناول ستافين**

• استشر الطبيب المعالج أو الصيدلي لأن نسبة الكوليسترول قد ترتفع مرة أخرى.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى حول طريقة استخدام هذا الدواء، استشر الطبيب المعالج أو الصيدلي.

**٤. الأعراض الجانبية المحتملة**

قد ينتج عن ستافين وكذلك باقي الأدوية، آثارًا جانبية إلا أنها قد لا تصيب الجميع.

تم استخدام المصطلحات التالية لوصف مدى تواتر الآثار الجانبية التي تم الإبلاغ عنها:

• الآثار الجانبية النادرة (قد تصيب شخصًا من بين ١٠٠٠ شخص).

• الآثار الجانبية النادرة جدًا (قد تصيب شخصًا من بين ١٠,٠٠٠ شخص).

• مدى تواتر الآثار الجانبية غير معروف (لا يمكن تقديره وفقًا للبيانات المتاحة).

**في حال حدوث أي من الآثار الجانبية الخطيرة المذكورة أدناه، توقف عن تناول الدواء وأبلغ الطبيب المعالج على الفور أو اذهب إلى قسم الطوارئ في أقرب مستشفى.**
تم الإبلاغ عن الآثار الجانبية الخطيرة النادرة؛

• آلام أو انسجحات أو ضعف في العضلات، نادرًا ما تكون هذه المشاكل العضلية خطيرة. بما في ذلك تفكك العضلات الذي يؤدي إلى تلف الكلى وفي حالات نادرة جدًا إلى الوفاة.

• تفاعلات تحسسية (حساسية مفردة) بما في ذلك: تورم الوجه، اللسان والحلق الذي قد يسبب صعوبة في التنفس (وذمة وعائية).

• آلام شديدة في العضلات عادة تصيب الكتفين والوركين.

• طفح جلدي مصحوب بضعف في عضلات الأطراف والرقبة.

• ألم أو التهاب المفاصل (ألم العضلات الروماتيزمي).

• التهاب الأوعية الدموية (الالتهاب الوعائي).

• كدمات غير طبيعية، ظهور نتوءات وتورم الجلد (تهاب الجلد والعضل)، الشرى، حساسية الجلد للشمس، النحوى، احمرار الوجه.

• ضيق في التنفس والشعور بالتعب.

• المرض يشبه الذئبة (بما في ذلك الطفح الجلدي واضطرابات المفاصل والتأثيرات على خلايا الدم).

• التهاب الكبد المصحوب بالأعراض التالية: اصفرار الجلد والتعب، فقدان اللون، الشعور بالتعب أو الضعف، فقدان الشهية، فشل الكبدى (نادر جدًا).

• التهاب البنكرياس المصحوب في كثير من الأحيان بالآلم شديدة في البطن.

• تم الإبلاغ عن الآثار الجانبية الخطيرة النادرة جدًا التالية؛

• رد فعل تحسسي خطير يسبب صعوبة في التنفس؛

• الطفح الجلدي الذي قد يظهر على الجلد أو تفرحات في الفم (الطفح الدوائي الحزازي).

• تمرز العضلات.

• التئدي عند الرجال (تضخم الثدي عند الرجال).

• نادرًا ما تم الإبلاغ أيضًا عن الآثار الجانبية التالية:

• انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء (فقر الدم).

• خدر أو ضعف في الذراعين والساقين.

• صداع، وخز، دوخة.

• عدم وضوح الرؤية، ضعف البصر.

• اضطرابات الجهاز الهضمي (آلم في البطن، الإمساك، انتفاخ البطن، عسر الهضم، الإسهال، الغثيان والقيء).

• طفح جلدي، حكة، تساقط الشعر.

• وهن.

• اضطرابات في النوم (نادر جدًا).

• ضعف الذاكرة (نادر جدًا)، فقدان الذاكرة، الارتباك.

تم الإبلاغ أيضًا عن الآثار الجانبية التالفة ولكن لا يمكن تقدير مدى تواترها بناءً على المعلومات المتاحة (مدى تواترها غير معروف):

• ضعف الانتصاب.

• كآبة.

• التهاب الرئتين الذي يسبب صعوبات في التنفس بما في ذلك السعال المستمر و/أو ضيق في التنفس أو الحمى.

• مشاكل في الأوتار، والتي قد تكون خطيرة بسبب تمزق الوتر.

• الآثار الجانبية المحتملة الإضافية التي تم الإبلاغ عنها عند تناول الأدوية المخفضة للكوليسترول:

- اضطرابات في النوم، بما في ذلك الكوابيس.
- الصعوبات الجنسية.
- داء السكري، تزداد احتمالية حدوث ذلك إذا كانت مستويات السكريات والدهون في الدم مرتفعة، وإذا كنت تعاني من زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم. سيرافيك الطبيب المعالج أثناء تناولك لهذا الدواء.

• آلام أو ضعف في العضلات بشكل متواصل قد لا يزول بعد التوقف عن تناول ستافين (مدى تواترها غير معروف).

نتائج الاختبارات
قد تظهر بعض نتائج فحوصات الدم المخبرية المتعلقة بوظائف الكبد وانزيم العضلات (الكرياتين كيناز) مرتفعة.

**التبليغ عن الأعراض الجانبية**

إذا واجهت أي آثار جانبية بما في ذلك الآثار الجانبية المحتملة غير المذكورة في هذه النشرة، استشر الطبيب المعالج أو الصيدلي. من خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية، يمكنك المساعدة في توفير مزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.

**٥ طريقة تخزين ستافين**

- قم بتخزين هذا الدواء بعيدًا عن مرآة ومتناول الأطفال.

- لا تستعمل هذا الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المذكور على الشريط الداخلي والعبوة الخارجية، يشير انتهاء تاريخ الصلاحية إلى أن الدواء قد أصبح غير صالح.

- لا تهم بتخزين هذا الدواء في درجة حرارة تزيد عن ٣٠ درجة مئوية، احفظه بعيدًا عن الرطوبة.

- لا تستخدم هذا الدواء إذا لاحظت علامات تدهور الصحة عليه.

- لا تتخلص من أي أدوية غير مهات الصريف الصحي. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد بحاجة إليها. ستساعد هذه الإجراءات على حماية البيئة.

**١ معلومات العلبة ومعلومات إضافية أخرى**

**على ماذا يحتوي ستافين**

المادة الفعالة هي سيمفاستاتين (١٠ ملغ، ٢٠ ملغ، أو ٤٠ ملغ).

يحتوي كل قرص على ١٠ ملغ، ٢٠ ملغ، أو ٤٠ ملغ من سيمفاستاتين.

المكونات الأخرى هي حمض الأسكوربيك، هيدروكسيبنزول بوتين، حمض الستريك، اللاكتوز، ستيرات المغنيسيوم، السليلوز دقيق التبلور، نشأ الذرة الهلامي، صبغة براون (E١٥٥). HT.

**كيف يبدو شكل ستافين ومحتويات العبوة**

ستافين ١٠ ملغ: أقراص بيضاء اللون ومستديرة الشكل.

ستافين ٢٠ ملغ: أقراص بيضاء اللون ومستديرة الشكل.

ستافين ٤٠ ملغ: أقراص بيضاء اللون، مستديرة الشكل وتحتوي على خط تقسيم من جانب واحد.

يتوفر ستافين ١٠ ملغ، أو ٢٠ ملغ، أو ٤٠ ملغ في عبوات تحتوي على ٣٠ قرص.

قد لا يتم تسويق جميع أحجام العبوات.

**الشركة المصنعة ومالكة حق التسويق**

فارماين ش.مرل - لبنان

الصندوق البريدي ٩٦٠١ حبيدة المتن، لبنان

للتواصل معنا:
pharmaline@maliagroup.com

الموقع الإلكتروني:
www.pharmaline.com.lb

رقم تسجيل ستافين ١٠ ملغ في لبنان: ١/٧٤٢٢٠٠

رقم تسجيل ستافين ٢٠ ملغ في لبنان: ١/٧٤٢١٩

رقم تسجيل ستافين ٤٠ ملغ في لبنان: ٤/١٩٥٠١٧

**إن هذا الدواء:**

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.

- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة استخدامه والاستعمال الموصى عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفه لك.

- الطبيب والصيدلي هما الخياران في الدواء وفي نفعه وضرره.

- لا تقطر صمغ العلاج المجددة لك من تلقاء نفسك.

- لا تتكرر صمغ الدواء بدون استشارة الطبيب.

- احفظ جميع الأدوية بعيدًا عن متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب
 واتحاد الصيدالنة العرب

تمت مراجعة هذه النشرة في نيسان/ ابريل ٢٠٢٢.