

تاسيسيوبيريل كابتيوبيريل (وفقاً لدستور الأدوية الأميركي) لمعالجة إرتفاع ضغط الدم

المواصفات: تاسيسيوبيريل يحتوي على مادة الكابتيوبيريل وهو عامل فعال في معالجة إرتفاع ضغط الدم.
المفعول: التاسيسيوبيريل يعيق جهاز "الرينين - أنجيوتنسين - أدوسيوبيريل" وذلك عبر كبح الأنزيم المسئولة عن تحويل "الأنجيوتنسين ١ إلى أنجيوتنسين ٢". كما أنه يحد أيضاً من تحويل "البراديكينين".

كل هذه المفعول تؤدي إلى انخفاض في مقاومة الشرايين المحيطية وبالتالي إلى انخفاض في ضغط الدم. في حالات قصور القلب الحاد، يؤدي التاسيسيوبيريل إلى انخفاض في ضغط الدم العائد إلى القلب وتؤدي في مقاومة الشرايين للدم المضخ منه. يمكن معاشرة غير الجهاز الهضمي بعدتناوله بواسطة الفم ويصل أعلى تركيز له في البلازما بعد ساعة تقريباً، مع العلم أن نسبة مفعوله الكامنة قد لا تلتلي في العلاجات الطويلة الأمد إلا بعد بضعة أسابيع من العلاج. ينصح ببروتينات البلازما بنسبة ٣٪ - ٤٪ في الأكل ويفتر خاصية في البول.

دوعي الاستعمال: يستعمل التاسيسيوبيريل في معالجة إرتفاع ضغط الدم وفي معالجة قصور القلب الإحتقاني، وعقم الإحتشاء العضلي لدى المرضى الذين يعانون من عسر في وظيفة البطيني الأيسر، وفي حالات الإعتلال الكلوي لدى المصابين بالسكري المتلازمة مع الأنسلين، كما يستعمل في الطور الحاد للإحتشاء القلبي.
موقع الاستعمال: يوصى بعدم إستعمال التاسيسيوبيريل لدى المرضى الذين يظهرون حساسية على مادة الكابتيوبيريل والمواد الشبيهة لها.

احتياطات: يوصى بأخذ الحذر في حالات القصور الكلوي ويطبل معاينة عمل الكلى قبل البدء بالعلاج، كما يوصى بأخذ الحذر في حالات الإضطرابات الكلوية الجينية على مستوى الشرايين.

ينصح بعدم استعماله لدى الحوامل (خاصة في الشهر الثالث حتى التاسع) ولدى من لهن نوبة في الحمل إلا عند الضرورة القصوى وذلك لوجود خطر على الجنين. كما ينصح بتقييد الرضاعة أثناء العلاج.

ينصح بانخفاض تدريجي في ضغط الدم عند بدء العلاج بجرعة خفيفة قبل النوم.
أعراض جانبية: طفح جلدي، حفاف، سعال ناشف وإرتفاع في الحرارة، إضطرابات في الطعام، انخفاض في الوزن، وجود بروتينات في البول، إرتفاع نسبة البوتاسيوم في الدم، قلة الصفائح الدموية، فقر الدم، سرعة في نبضات القلب، تهيج في الجهاز الهضمي، أوجاع في البطن وإصابات كبدية خطيرة.

المقدار: إرتفاع سهيل إلى متواتر في ضغط الدم:
٥ ملخ مرتين في اليوم. يمكن زيادتها عند الحاجة على أن تتعدي ٥٠ ملخ مرتين يومياً كحد أقصى.

إرتفاع حاد في ضغط الدم: ٥٠ ملخ ثلاثة مرات يومياً كحد أقصى.
قصور قلبي إحتقاني: ٢٥ ملخ ثلاثة مرات يومياً يمكن زيادتها عند الحاجة على أن لا تتعدي ٥٠ ملخ ثلاثة مرات يومياً كحد أقصى.

إحتشاء غضالة القلب: البدء في أسرع وقت ممكن بجرعة أولية قدرها ٦٢٥ ملخ.

زيادة المقدار تدريجياً خلال عدةاسبوع حتى بلغ كمية ١٥٠ ملخ يومياً مقسمة على عدة جرعات.

إعتلال كلوي سكري: المقدار اليومي المقترن ٧٥ - ١٠٠ ملخ مقسم على عدة جرعات.
الأشكال الصيدلانية المتوفرة: أقراص:

ـ عبوة تحتوي على ٢٠ قرصاً ويحتوي كل قرص على كابتيوبيريل ٢٥ ملخ، سواغ كمية كافية للقرص الواحد. رقم التسجيل لبنان ٢٧٥٤٤

ـ عبة تحتوي على ٣٠ قرصاً ويحتوي كل قرص على كابتيوبيريل ٥٠ ملخ، سواغ كمية كافية للقرص الواحد. رقم التسجيل لبنان ٢٧٥٤٥

ـ عبة تحتوي على ٣٠ قرصاً على كابتيوبيريل ٢٥ ملخ، سواغ كمية كافية للقرص الواحد. رقم التسجيل لبنان ٤٠٥٩٣٤

ـ عبة تحتوي على ٣٠ قرصاً ويحتوي كل قرص على كابتيوبيريل ٥٠ ملخ، سواغ كمية كافية للقرص الواحد. رقم التسجيل لبنان ٤٠٥٩٣٣

ـ عبة تحتوي على ١٠٠٠ قرص (١٠٠ مسحوبة) ويحتوي كل قرص على كابتيوبيريل ٢٥ ملخ، سواغ كمية كافية للقرص الواحد. رقم التسجيل لبنان ٢٧٥٤٦

ـ عبة تحتوي على ١٠٠٠ قرص (١٠٠ مسحوبة) ويحتوي كل قرص على كابتيوبيريل ٥٠ ملخ، سواغ كمية كافية للقرص الواحد. رقم التسجيل لبنان ٢٧٥٤٧

إن هذا دواء

ـ إبراء مسؤولي يتوثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتليميات يعرضك للخطر.

ـ اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.

ـ فالطبيب والصيدلاني هما الخبران بالدواء وبنفعه وضرره.

ـ لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من ثلقاء نفسك.

ـ لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

ـ إن إسم تاسيسيوبيريل هو ماركة مسجلة.

ـ لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.