

نشرة الدواء: معلومات للمريض فيريفلو ٧٥ ملغ كبسولات أوسيلتاميفير

إستشر الطبيب المعالج إذا كان هذا ينطبق عليك. لا تتناول فيريفلو. تحذيرات واحتياطات:

قبل تناول فيريفلو، تأكد من أنّ الطبيب المعالج على يقين ما إذا

- كان لديك حساسية لأدوية أخرى
- كنت تعاني من مشاكل في الكلى وفي هذه الحالة قد تحتاج إلى تعديل الجرعة

- كانت حالتك الصحية متردية، الأمر الذي قد يتطلّب نقلك إلى المستشفى على الفور
- كان جهازك المناعي لا يعمل بشكل صحيح
- كنت تعاني من أمراض قلب مزمنة أو من أمراض الجهاز التنفسي.
- أثناء العلاج بواسطة فيريفلو، أخبر الطبيب فورًا:

– لقد وُصِفَ هذا الدواء لك شخصيًا، ولا ينبغي بك أن تطه لأحد آخر حتى

لو ظهرت عليه نفس أعراض مرضك فقد يؤدي ذلك إلى الإضرار به.

– إذا أصبت بأي آثار جانبية بما في ذلك الآثار غير المذكورة في هذه النشرة، أخبر الطبيب المعالج أو الصيدلي.
مراجعة القسم ٤.

ما الذي تحتويه هذه النشرة

١. ما هو فيريفلو وما هي دواعي استعماله

٢. ما الذي يجب عليك معرفته قبل تناول فيريفلو

٣. ما هي طريقة تناول فيريفلو

٤. الأعراض الجانبية المحتملة

٥. طريقة تخزين فيريفلو

٦. محتويات العلبة ومعلومات إضافية أخرى

- ١. ما هو فيريفلو وما هي دواعي استعماله**
- يُستخدم فيريفلو عند البالغين، الأطفال، الرضع (بما في ذلك الأطفال حديثي الولادة بعد فترة حمل مكتملة) **لعلاج النزلة الوافدة** (الإنفلونزا). يمكن استخدامه مع بدء أعراض الإنفلونزا لديك و بدء تشخيصه في مجتمعك.
- لروربومايد (لمعالجة أمراض السكري)
- ميثوتريكسات (لمعالجة مثلًا التهاب المفاصل الروماتويدي)
- فيتنيل بوتازون (للتسكين الأول ومعالجة التهاب)
- بروبيسينيد (لمعالجة مرض القرص)

الحمل والرضاعة الطبيعية

يجب أن تخبري الطبيب المعالج إذا كنت حاملًا، متقدّمين أنك حامل أو إذا كنت تصابن الإنجاب لكي يحدد الطبيب ما إذا كان فيريفلو مناسبًا لك أم لا.
أثار الدواء على الأطفال الرضع غير معروفة. يجب إبلاغ الطبيب إذا كنت ترضعين طفلك لكي يحدد لك ما إذا كان فيريفلو مناسبًا أم لا.

استشيري الطبيب المعالج أو الصيدلي قبل استخدام هذا الدواء.

القيادة واستخدام الآلات

لا يؤثر فيريفلو على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات.

٣. ما هي طريقة تناول فيريفلو

إتبع إرشادات الطبيب بدقة عند تناول هذا الدواء واستشر الطبيب المعالج أو الصيدلي إذا لست متأكدًا.

تناول فيريفلو في أسرع وقت ممكن، وتجنّب تناوله خلال يومين من بدء عوارض الإنفلونزا.

تعتبر الإنفلونزا، غالبًا ما تُسمى الحمى الوافدة، عدوى ناجمة عن فيروس.

غالبًا ما تشمل علامات الإنفلونزا حمى مفاجئة (أكثر من ٣٧,٨ درجة مئوية)، سعال، إحتقان أو سيلان في الأنف، صداع، ألم العضلات والإرهاق الشديد. هذه الأعراض قد تحدث أيضًا بسبب عدوى أخرى. تكون عدوى الإنفلونزا حقيقية فقط خلال فترة تشفي هذا الفيروس سنويًا (الأوبئة) حيث تنتشر فيروسات الإنفلونزا في المجتمع. أما الأعراض المماثلة لأعراض الإنفلونزا التي لا تحدث خلال فترة الوباء، عادة ما تكون ناجمة عن نوع مختلف من الأمراض.

٢. ما الذي يجب عليك معرفته قبل تناول فيريفلو

لا تستخدم فيريفلو:

إذا كنت تعاني من حساسية (حساسية مفرطة) للأوسيلتاميفير أو لأي من

مكوّنات فيريفلو الأخرى المذكورة في القسم ٦.

البالغون والمراهقون الذين يبلغون من العمر ١٣ سنة أو أكثر

علاج الإنفلونزا: جرعةٌ لمدة ١٠ أيام	علاج الإنفلونزا (المرضى الذين لديهم ضعف في الجهاز المناعي): جرعة لمدة ١٠ أيام*	وقاية من الإنفلونزا: جرعةٌ لمدة ١٠ أيام	الوزن
٧٥ ملغ مرتين يوميًا	٧٥ ملغ مرتين يوميًا	٧٥ ملغ مرة واحدة يوميًا	٤٠ كلغ أو أكثر

يكون العلاج للمرضى الذين يعانون من جهاز مناعي ضعيف ١٠ أيام.

علاج الإنفلونزا (المرضى الذين لديهم ضعف في الجهاز المناعي): جرعةٌ لمدة ١٠ أيام*	علاج الإنفلونزا (المرضى الذين لديهم ضعف في الجهاز المناعي): جرعةٌ لمدة ١٠ أيام*	وقاية من الإنفلونزا: جعةٌ لمدة ١٠ أيام	الوزن
٧٥ ملغ مرتين يوميًا	٢٠ ملغ مرتين يوميًا	٢٠ ملغ مرة واحدة يوميًا	بين ١٠ و١٥ كلغ
٤٥ ملغ مرتين يوميًا	٤٥ ملغ مرتين يوميًا	٤٥ ملغ مرة واحدة يوميًا	أكثر من ١٥ كلغ وما يصل إلى ١٣ كلغ
٦٠ ملغ مرتين يوميًا	٦٠ ملغ مرتين يوميًا	٦٠ ملغ مرة واحدة يوميًا	أكثر من ٢٣ كلغ وما يصل إلى ٤٠ كلغ
٧٥ ملغ مرتين يوميًا	٧٥ ملغ مرتين يوميًا	٧٥ ملغ مرة واحدة يوميًا	أكثر من ٤٠ كلغ

يكون العلاج للأطفال الذين يعانون من جهاز مناعي ضعيف ١٠ أيام.

الرضع الذين لا يتعدى عمرهم سنة واحدة (من صفر إلى ١٣ شهر)

يجب إعطاء فيريفلو للرضع الذين لا يتعدى عمرهم سنة واحدة للوقاية من الإنفلونزا أثناء جائحة الإنفلونزا وفقًا لقرار الطبيب، وذلك بعد النظر في الفائدة المحتملة مقابل أي خطر محتمل على الرضيع.

علاج الإنفلونزا: جرعةٌ لمدة ١٠ أيام	علاج الإنفلونزا (المرضى الذين لديهم ضعف في الجهاز المناعي): جرعةٌ لمدة ١٠ أيام*	وقاية من الإنفلونزا: جرعةٌ لمدة ١٠ أيام	الوزن
٣ ملغ لكل كلغ من الوزن**	٣ ملغ لكل كلغ من الوزن**	٣ ملغ لكل كلغ مرة واحدة يوميًا	٣ كلغ وما يصل إلى أكثر من ١٠ كلغ

*يكون العلاج للأطفال الذين يعانون من جهاز مناعي ضعيف ١٠ أيام.

**ملغ لكل كلغ = ملغ لكل كلغ من وزن جسم الرضيع. على سبيل المثال: إذا كان الرضيع البالغ من العمر ٦ أشهر يزن ٨ كلغ، تكون الجرعة ٨ كلغ × ٣ ملغ لكل كلغ = ٢٤ ملغ.

طريقة تناول الدواء

إبتلع الكبسولة بالكامل مصحوبة بأماء. لا تقم بكسر الكبسولات أو مضغها. يمكن تناول فيريفلو إلى جانب الطعام أو بدونه، لكن تناوله إلى جانب الطعام قد يقلل من احتمال شعورك بعدم الإرتياح أو بالإزعاج (الغثيان والقيء). يمكن للأشخاص الذين يعانون صعوبة في تناول الكبسولات استخدام معلق فموي سائل. يمكنك إعداد سائل من فيريفلو من خلال الكبسولات. مراجعة إعداد فيريفلو السائل في المنزل، في هذه النشرة الدوائية.

إذا تناولت فيريفلو بكمية أكبر مما ينبغي عليك

توقف عن تناول فيريفلو واتصل بالطبيب أو الصيدلي على الفور.

لم يتم الإبلاغ عن أي آثار جانبية في معظم حالات الجرعة الزائدة من كبسولات الأوسيلتاميفير. وعندما تم الإبلاغ عن آثار جانبية، كانت مماثلة لتلك الناجمة عن الجرعات العادية، كما هو مدرج في القسم ٤.

تم الإبلاغ من جهاز مناعي ضعيف، قد تصل مدة العلاج إلى ٦ أو ١٣ أسبوع.

يتم وصف الجرعات وفقًا لوزن المريض. يجب أن تتناول مقدار الكبسولات الفموية بحسب وصفة الطبيب.

إذا توقفت عن تناول فيريفلو

ليس هناك من آثار جانبية بعد التوقف عن تناول فيريفلو، لكن إذا توقفت عن تناوله قبل الموعد الذي حدّدك لك الطبيب قد تعود أعراض الإنفلونزا. لهذا السبب يجب الإلتزام دائمًا بمدة العلاج الذي حدّدها الطبيب.

إذا كان لديك أي أسئلة إضافية حول طريقة تناول هذا الدواء، إسأل الطبيب المعالج أو الصيدلي.

٤. الأعراض الجانبية المحتملة

قد ينتج عن هذا الدواء، وكذلك باقي الأدوية، آثارًا جانبية إلا أنها قد لا تصيب الجميع. قد تكون معظم الآثار الجانبية المذكورة أدناه ناجمة عن الإنفلونزا. نادرًا ما تم الإبلاغ عن الآثار الجانبية الخطيرة التالية منذ تسويق الأوسيلتاميفير:

- تفاعلات التأتبية والتأقانية: تفاعلات تحسسية شديدة، مع تورم الوجه والجلد، طفح جلدي مسبب للحكة، إنخفاض ضغط الدم وصعوبات في التنفس.
- أمراض في الكبد (التهاب الكبد الخاطف، إختلال وظائف الكبد واليرقان): إضرار الجلد وبيضاض العينين، تغيير في لون البراز، تغيرات في السلوك.
- وذمة وعائية حسيبة: ظهور مفاجئ تورم حاد بالجلد خصوصًا حول منطقة الرأس والرقب بما في ذلك العينين واللسان وصعوبات في التنفس.
- متلازمة ستيفنز جونسون وانحلال البشرة السمي: تفاعل تحسسي محسوب بمضاعفات وربما مهدّد للحياة، إلتهاب حاد في طبقة الجلد الخارجية وربما للدخالية، إلى جانب حصى في البداية، التهاب الحلق والتعب، طفح جلدي، يؤدي إلى ظهور بثور، قشور، خسارة مناطق كبيرة من الجلد، إحتماّل صعوبات في التنفس، وانخفاض ضغط الدم.
- نزيف معوي: نزيف يستمر لمدة أطول في الأمعاء الغليظة أو يصبق الدم.
- إضطرابات عصبية نفسية، على النحو المبين أدناه.

إذا لاحظت أي من هذه الآثار، أطلب مساعدة طبية على الفور.

للأوسيلتاميفير هي الشعور بعدم الإرتياح أو الإزعاج (الغثيان والقيء)، ألم الحلق، إضطراب المعدة، الصداع والألم. غالبًا ما تحدث هذه الآثار الجانبية بعد تناول الجرعة الأولى من الدواء وتوقف عادةً مع مواصلة العلاج، يكون مدى تكرار هذه الآثار أقل إذا تم تناول الدواء إلى جانب الطعام.

آثار جانبية نادرة لكنها خطيرة أطلب مساعدة طبية على الفور

(قد تصيب شخص من بين ١٠٠٠)

أثناء علاج الأوسيلتاميفير، تم الإبلاغ عن آثار نادرة تشمل

- تشنجات وهديان، بما في ذلك تغير في مستوى الوعي
- إرتباك وسلوك غير طبيعي
- أوهام، هلوسة، إضطراب، قلق وكوابيس

لا تتناول فيريفلو مع

أدوية أخرى قد تتداخل مع فيريفلو، مثل

أدوية أخرى قد تتداخل مع فيريفلو، مثل

أدوية أخرى قد تتداخل مع فيريفلو، مثل

أدوية أخرى قد تتداخل مع فيريفلو، مثل

أدوية أخرى قد تتداخل مع فيريفلو، مثل

أدوية أخرى قد تتداخل مع فيريفلو، مثل

أدوية أخرى قد تتداخل مع فيريفلو، مثل

أدوية أخرى قد تتداخل مع فيريفلو، مثل

أدوية أخرى قد تتداخل مع فيريفلو، مثل

أدوية أخرى قد تتداخل مع فيريفلو، مثل

أدوية أخرى قد تتداخل مع فيريفلو، مثل

أدوية أخرى قد تتداخل مع فيريفلو، مثل

أدوية أخرى قد تتداخل مع فيريفلو، مثل

أدوية أخرى قد تتداخل مع فيريفلو، مثل

أدوية أخرى قد تتداخل مع فيريفلو، مثل

أدوية أخرى قد تتداخل مع فيريفلو، مثل

أدوية أخرى قد تتداخل مع فيريفلو، مثل

أدوية أخرى قد تتداخل مع فيريفلو، مثل

أدوية أخرى قد تتداخل مع فيريفلو، مثل

أدوية أخرى قد تتداخل مع فيريفلو، مثل

أدوية أخرى قد تتداخل مع فيريفلو، مثل

أدوية أخرى قد تتداخل مع فيريفلو، مثل

أدوية أخرى قد تتداخل مع فيريفلو، مثل

أدوية أخرى قد تتداخل مع فيريفلو، مثل

الرضع الذين يبلغ عمرهم أقل من سنة واحدة

الآثار الجانبية المبلغ عنها للأوسيلتاميفير لدى الرضع من سن صفر إلى ١٣ شهرًا غالبًا ما تشبه الآثار الجانبية المبلغ عنها لدى الأطفال الأكبر سنًا (عام واحد أو أكبر). بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن الإسهال وطفح الحفاضات. إذا تفاقمت أي من هذه الآثار الجانبية أو إذا لاحظت أي آثار جانبية غير متدرجة في هذه النشرة، أخبر الطبيب المعالج أو الصيدلي. ومع ذلك،

• إذا كنت أنت أو طفلك مريضًا باستمرار، أو

• إذا تفاقمت أعراض الإنفلونزا أو إذا استمرت الحمى،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

• إذا بقيت الأعراض بعد ٥ أيام،

معلومات لمستخدمي الدواء

بالنسبة للأشخاص الذين يواجهون صعوبة في تناول الكبسولات، بما في ذلك الأطفال:

إذا كنت بحاجة لتناول دواء سائل، من الممكن إعداد معلق فموي في الصيدلية من خلال كبسولات فيريفلو. يُعتبر هذا المستحضر الصيدلاني أفضل خيار.

أما إذا كان المستحضر الصيدلاني غير متوفر، يمكنك إعداده في المنزل من خلال كبسولات فيريفلو.

تكون الجرعة نفسها سواء كانت لملاج الإنفلونزا أم للوقاية منها، أما الفرق هو في عدد الجرعات التي يتم تناولها.

إعداد فيريفلو السائل في المنزل

• إذا كان لديك الكبسولة ذات المقدار المناسب للجرعة المطلوبة (جرعة ٧٥ ملغ)، يمكنك فتح الكبسولة و خلط محتوياتها مع ملعقة صغيرة (أو أقل)

– من مادة غذائية لذيذة مناسبة. عادة ما تلائم هذه الخطوة الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن سنة واحدة.

• راجع مجموعة التعليمات الملوية.

• إذا كنت بحاجة إلى جرعات أقل، يتطلّب تحضير فيريفلو السائل خطوات إضافية.

– يكون هذا الأمر مناسبًا للأطفال الأصغر سنًا والرضع الذين غالبًا ما يحتاجون إلى جرعة أقل من ٢٠ ملغ من فيريفلو. راجع مجموعة التعليمات السفلية.

٦. محتويات العلبة ومعلومات إضافية أخرى

على ماذا يحتوي فيريفلو

• المادة الفعالة هي أوسيلتاميفير.

• كبسولة فيريفلو ٧٥ ملغ

• كبسولة فيريفلو ٧٥ ملغ

• كبسولة فيريفلو ٧٥ ملغ

• كبسولة فيريفلو ٧٥ ملغ

• كبسولة فيريفلو ٧٥ ملغ

• كبسولة فيريفلو ٧٥ ملغ

• كبسولة فيريفلو ٧٥ ملغ

• كبسولة فيريفلو ٧٥ ملغ

• كبسولة فيريفلو ٧٥ ملغ

• كبسولة فيريفلو ٧٥ ملغ

• كبسولة فيريفلو ٧٥ ملغ

• كبسولة فيريفلو ٧٥ ملغ

• كبسولة فيريفلو ٧٥ ملغ

• كبسولة فيريفلو ٧٥ ملغ

• كبسولة فيريفلو ٧٥ ملغ

• كبسولة فيريفلو ٧٥ ملغ

• كبسولة فيريفلو ٧٥ ملغ

• كبسولة فيريفلو ٧٥ ملغ

• كبسولة فيريفلو ٧٥ ملغ

• كبسولة فيريفلو ٧٥ ملغ

• كبسولة فيريفلو ٧٥ ملغ

• كبسولة فيريفلو ٧٥ ملغ

• كبسولة فيريفلو ٧٥ ملغ

• كبسولة فيريفلو ٧٥ ملغ

• كبسولة فيريفلو ٧٥ ملغ

• كبسولة فيريفلو ٧٥ ملغ

• كبسولة فيريفلو ٧٥ ملغ

• كبسولة فيريفلو ٧٥ ملغ

• كبسولة فيريفلو ٧٥ ملغ

• كبسولة فيريفلو ٧٥ ملغ

• كبسولة فيريفلو ٧٥ ملغ

• كبسولة فيريفلو ٧٥ ملغ

• كبسولة فيريفلو ٧٥ ملغ

• كبسولة فيريفلو ٧٥ ملغ

• كبسولة فيريفلو ٧٥ ملغ

• كبسولة فيريفلو ٧٥ ملغ

• كبسولة فيريفلو ٧٥ ملغ

• كبسولة فيريفلو ٧٥ ملغ

• كبسولة فيريفلو ٧٥ ملغ

• كبسولة فيريفلو ٧٥ ملغ

• كبسولة فيريفلو ٧٥ ملغ

• كبسولة فيريفلو ٧٥ ملغ

• كبسولة فيريفلو ٧٥ ملغ

• كبسولة فيريفلو ٧٥ ملغ

• كبسولة فيريفلو ٧٥ ملغ

• كبسولة فيريفلو ٧٥ ملغ