



كونكور® كور 2,5 ملغم

المواد النشطة: بيسوبرولول فومارات (1:2)

التكوين

يحتوي القرص المغلف الواحد على المواد الطبية النشطة التالية:
2,5 ملغم بيسوبرولول فومارات (1:2).

مواد إضافية:

ثاني أكسيد السيليكون الغرواني، ماغنيسيوم (سيتارات، لمبيئات، أوليات)، كروسوفيدون، نشا لذرّة، دقيق بلورية السيلوز، هيدروفوسفات الكالسيوم، ديميثكون، ماكروجول 400، ثاني أكسيد التيتانيوم (E171)، هيبروميلوز.

شكل وحجم العبوة

أقرص مغلفة، بوضاء تقريبا، على شكل قلب، محززة في الوسط من أجل تقسيم القرص تحتوي العبوة على 30 قرصا.

الخاصية الدوائية

إن هذا العقار عبارة عن مثبط بيتا الخاص بالقلب.

حق الصنع والتسويق

ميرك، شركة توصية بالأسمه Merck KGaA،
Frankfurter Strasse 250،
64293 Darmstadt دارم شتادت، جمهورية ألمانيا الاتحادية

نوعى الاستعمال

لمعالجة أمراض القلب الشريانية المزمنة الثابتة متوسطة الدرجة وحتى الحادة منها (قصور عضلات القلب) في حالات محدودة عمل لقياس الطبيعي (القفز الجزئي $\geq 35\%$ ، محدد بواسطة تخطيط صدى القلب)، بالإضافة الى مثبطات أنجيوتنسين الأتريمية المحولة ACE ومدرات البول، وإذا تطلب الأمر غليكوسيدات القلب.

مواعى استعمال

معى يمتنع استعمال كونكور كور 2,5 ملغم ؟

يمنع استعمال كونكور كور 2,5 ملغم في الحالات التالية:

- في حال قصور عضلات القلب الحاد (قصور القلب) أو اثناء سوء حال قصور القلب (اللامعوضة) التي تتطلب المعالجة عن طريق الوريد بغير يمل على زيادة قدرة القلب
- في حال الصدمة (الصدمة القلبية) الناتجة عن خلل وظيفي في القلب
- في حال وجود خلل حاد في التوصيل انبضي بطيئي في القلب (من الدرجة الثانية والثالثة) بدون النخامة القلبية
- في حال وجود ظاهرة مرض الجيوب (ظاهرة سيك زينوس)
- في حال وجود خلل توصيلي بين العقدة الجيبية الأذنية من جهة والاذين من جهة اخرى (التحصار جيبى انذني)
- في حال نبض القلب البطيئ جدا (بطء القلب اقل من 60 ضربة في الدقيقة الواحدة) قبل البدء في المعالجة
- في حال الانخفاض الكبير في ضغط الدم (انقص الضغط، ضغط انقباضي اقل من 100 ملم زئبقي)
- في حال وجود مرض الربو القصبي لحاد أو داء الرئة الساد الزمن الحاد
- في المراحل لمتأخرة من أمراض الانسداد المحيطي الشرياني أو لتشنجات الشريانية (ظاهرة رينولد المرضية)
- في حال وجود ورم كحري (ورم القوائم)
- في حال زيادة إفراز لحمض في الجسم (الحماض الأيضي)
- وفي حال فرط الحساسية تجاه بيسوبرولول واي من مكونات قرص الدواء.

معى يجب استشارة الطبيب قبل استعمال كونكور كور 2,5 ملغم؟

لا يسمح في الحالات التالية بتناول كونكور كور 2,5 ملغم إلا تحت شروط محددة ويحذر شديد جدا. يرجى استشارة الطبيب في هذا الخصوص. ينطبق هذا أيضا حتى ولو تعرض الشخص المعنى لمرض هذه الظواهر في مرة سابقة.

- التشنج الشنبي (الربو القصبي، داء الرئة الساد)
- المعالجة بواسطة استنشاق مواد مخدرة
- داء السكري مع تقلبات كبيرة في نسبة جلوكوز الدم، ووجود مؤشرات على نقص كبير في السكر الدم (كثني سكر الدم) قد تكون مخفية
- لصوم الصحي الصارم
- أثناء المعالجة من أجل إزالة التمسك
- اضطرابات قلب أنيضية بطنية خفيفة (إنذني بطني من الدرجة الأولى)،
- اضطرابات في تنفق الدم من وإلى القلب نتيجة الأوعية التاجية أو ما يدعى بـ (Prinzmetal's angina)
- مرض الانسداد الشرياني المحيطي (يمكن أن يزداد الأم خاصة عند بداية العلاج)

ينبغي على المرضى الذين لهم علاقة مباشرة أو متوارثة عائلتها بداء الصدف تناول مثبطات بيتا (على سبيل المثال العلاج كونكور كور 2,5 ملغم) فقط بعد تدقيق تلم بمدى النفع والضرر المترتب عليه.

أما في حال وجود أورام لب الكضر (ورم القوائم) فيسمح باستعمال كونكور كور 2,5 ملغم فقط بعد تناول مثبطات ألفا.

ما الذي يجب مراعاته من قبل السيدات الحوامل والأمهات الحاضنات؟

ينبغي عدم الاستطباب بواسطة كونكور كور 2,5 ملغم أثناء فترة الحمل إلا بعد تدقيق تام جدا ومدى سكر الدم (كثني المترتبان عليه) من قبل الطبيب المعالج. تعمل المثبطات بشكل عام على خفض تنفق الدم إلى المشيمة ويمكن أن تؤثر على تطور الجنين. لذا يجب مراقبة تنفق الدم إلى المشيمة والرحم وتطور الجنين، كما يجب في حال تطلب الأمر ذلك البحث عن بدائل علاجية أخرى. لم يعرف حتى الآن إن كانت مادة البيسوبرولول تنتقل مع حليب الام أو لا. لذا ينصح بعدم الإرضاع خلال فترة تناول كونكور كور 2,5 ملغم.

ما الذي يجب مراعاته لدى الأطفال وكبار السن من المرضى؟

ينبغي عدم استعمال كونكور كور 2,5 ملغم لعلاج الأطفال لعدم توفر الخبرة العلاجية الكافية في هذا المجال. أما لدى كبار السن من المرضى فليس من الضروري مساواة الجرعة. وفيما يتعلق بالمرضى الذين يعانون بقصور قلبي وتزيد أعمارهم عن 80 عاما فلم تتوفر بعد الخبرة العلاجية الكافية في هذا المجال.

تتبعيات وتحذيرات الاستعمال

ما هي الاحتياطات التي يجب مراعاتها؟

تتطلب معالجة قصور عضلات القلب بواسطة كونكور كور 2,5 ملغم المراقبة الطبية المنتظمة، خصوصا في المرحلة الأولى من تناول العلاج.

ينبغي تناول علاج لتوسيع الشعب التنفسية إلى جانب العلاج كونكور كور 2,5 ملغم في حالة معالجة التشنج الشنبي (الربو القصبي) أو أي من اضطرابات العمل الرئوية السادة المزمنة التي يمكن أن تكون مصحوبة بالأعراض المرضية.

قد تظهر في بعض الأحيان زيادة في مقاومة القوات التنفسية لدى مرضى الربو القصبي مما يتطلب رفع كمية الجرعة عن معدل لودي ٢٥ التي تدعى منشطات ٢٥ السميثاوية. يمكن أن تؤدي مادة البيسوبرولول، كما هو الحال أيضا بالنسبة لمثبطات بيتا، إلى زيادة الحساسية تجاه التمسك وردود الفعل اللاقائية الحادة، أي إلى ردود فعل حساسية بشكل عام حادة. ولا يظهر الادرينالين في هذا الخصوص المفعول العلاجي المرغوب. يمكن أن تؤدي مادة البيسوبرولول إلى إخفاء أعراض ارتفاع نسبة إفراز الغدة الدرقية (الإستسمم الدرقي).

لا تتوفر حتى الآن خبرة علاجية كافية بواسطة كونكور كور 2,5 ملغم جديرة بالذكر على المرضى الصغارين بقصور القلب إلى جانب أمراض السكري المرتبطة بالانسولين (داء السكري من النوع الأول)، اضطراب عمل الكليتين (مصل كرياتينين $\leq 3,4$ ملغم لكل 100 ملتر) ولدى المرضى الذين يعانون من خلل كبدى وظيفي، حالات الاعتلال القلبي العضلي المقيدة أمراض القلبية الخلفية أو حول أمراض زخم الدم في الصمام القلبي. وكذلك بالنسبة للقصور القلبي الخفيف (إنذني بطني القلب من الدرجة الثانية NYHA II) وكذلك قصور القلب والنخبة القلبية في الأشهر الثلاثة الأخيرة لا تتوفر خبرة علاجية كافية في هذا المجال.

ينبغي عدم قطع العلاج بواسطة مادة البيسوبرولول فجأة في حال عدم وجود داعي إضطراري لذلك.

ما الذي يجب مراعاته على الطرقات وانشاء العمل على الالات أو العمل في أماكن غير مئتمنة؟

لم تبين الدراسة التي أجريت على مرضى داء القلب الكليتي الذين يخضعون للمعالجة بواسطة مادة البيسوبرولول أية تأثيرات على قدرتهم في الطرقات. ومن الممكن بالرغم من ذلك وفي حالات فردية أن تظهر ردود فعل مختلفة بسبب الدواء، بحيث تتغير القدرة على رد الفعل إلى درجة يتأثر معها التواجد على الطرقات وتشغيل الآلات أو العمل في أماكن غير ثابتة نتيجة للدواء. وينطبق هذا بشكل خاص عن بداية المعالجة وفي حال رفع الجرعة الدوائية وتغيير العلاج وكذلك في حال إقترانه مع تناول الكحول.

تتبعيات خاصة

إن هذا دواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- فالطبيب والصيدلاني هما المختبران بالدواء وفعله وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء دون مراجعة الطبيب.
- لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب اتحاد الصيدالة العرب

التأثرات الدوائية للتفاعل

ما هي الأدوية الأخرى التي تؤثر على مفعول كونكور كور 2,5 ملغم أو ما هو أثر كونكور كور 2,5 ملغم على الأدوية الأخرى؟

ينصح بعدم تزامن تناول الأدوية التالية إلى جانب هذا الدواء:

تتمحاح بزيادة انخفاض ضغط الدم في حال تزامن إستعمال الدواء مع مضادات الكالسيوم، ويتباطؤ في نظام التوصيل الأذيني البطيئي وتزامن قابلية التقلص في عضلات القلب.

كذلك يمكن أن يؤدي تزامن العلاج بواسطة كونكور كور 2,5 ملغم وكولونيين إلى الزيادة الحادة جدا في انخفاض معدل سرعة القلب وإلى القلوسية العضلية في القلب. ويمكن علاوة على ذلك أن يؤدي الانقطاع عن تناول كلونيين إلى زيادة حدة في فرط ضغط الدم.

إن مزامنة تناول كونكور كور 2,5 ملغم إلى جانب مثبطات أحادي اوكسيتاز الأمين (ما عدا مثبطات أحادي اوكسيتاز الأمين ب) قد تؤثر على ضغط الدم (خفض ضغط الدم، كذلك أيضا زيادة حدة في فرط ضغط الدم).

لا يسمح بتزامن تناول كونكور كور 2,5 ملغم مع الأدوية التالية إلا تحت ظروف محددة ويحذر شديد فقط:

يمكن أن تتضاعف فاعلية التثبيط للعقار كونكور كور 2,5 ملغم ومضادات الانظمية على دفعات القلب وقصوية نسج القلب.

إن المعالجة المتزامنة بكونكور كور 2,5 ملغم ومضادات الباراسميثاوية (بما فيها تاردين) قد تؤدي إلى إطالة فترة التوصيل الأذيني البطيئي للقلب.

ربما يزداد مفعول كونكور كور 2,5 ملغم من جراء تزامن المعالجة به إلى جانب مثبطات بيتا بما فيها أيضا قطرة العين، التي تحتوي على مثبطات بيتا.

يمكن أن يؤدي تزامن تناول كونكور كور 2,5 ملغم مع الأمسولين أو المستحضرات الطبية (بما عدا نيتريك أكسيد) في الدم (مضادات انخفاض ضغط الدم عن طريق اللف) إلى زيادة فاعلية هذه المستحضرات. إن مؤشرات انخفاض نسبة السكر في الدم (كثني سكر الدم) – وخاصة (بنيض القلب السريع) – غالبا ما تكون غير واضحة تماما أو خفيفة.

يمكن أن يؤدي تزامن تناول كونكور كور 2,5 ملغم ومواد التخدير إلى مضاعفة إنخفاض ضغط الدم.

يمكن أن تتأثر سلبيا آليات التنظيم المضاد على سبيل المثال إرتفاع بنيض القلب (رد فعل صراع القلب). إن متابعه تثبيط بيتا تقلل من خطر الانظمة أثناء التخدير والتثبيط. يجب إحاطة الطبيب المخدر علما قبل البدء في التخدير فيما إذا كان المريض يتناول كونكور كور 2,5 ملغم.

يمكن أن تؤدي المعالجة المتزامنة بواسطة كونكور كور 2,5 ملغم وديجيتاليس إلى زيادة نبضات القلب والتعويل في القلب.

قد يزداد أيضا يتباطؤ نبضات القلب في حال إقترن تناول كونكور كور 2,5 ملغم بالمعالجة بواسطة ميفلوكوين.

قد يؤدي تزامن المعالجة بواسطة مستحضرات التثبيط بروستغلندين الاصطناعية (على سبيل المثال حامض خليل الصفصاف) إلى الحد من تأثير كونكور كور 2,5 ملغم في خفض ضغط الدم.

قد يؤدي العلاج المتزامن ببعض مشتقات الاربوجوتامين (على سبيل المثال عقاقير علاج الشقيقة التي تحتوي على الاربوجوتامين) وكونكور كور إلى زيادة الخلل في الدورة الدموية المحيطة.

قد يؤدي استعمال كونكور كور 2,5 ملغم المتزامن مع تناول مستحضرات طبية أخرى مثل منشطات الجهاز السميثاوي إلى خفض مفعول العقارين. وقد تتطلب معالجة ردود فعل على شكل حساسية جرعة عالية من الادرينالين.

يمكن أن يؤدي تزامن العلاج بواسطة كونكور كور 2,5 ملغم إلى جانب ثلاثي الحلقي المضاد للكآبة، أو الباربيتورات أو مستحضرات الفينوثيازين وغيرها من مواد خفض ضغط الدم إلى تؤدي مزامنة المعالجة بواسطة كونكور كور 2,5 ملغم في خفض ضغط الدم.

يمكن أن تؤدي مزامنة المعالجة بواسطة كونكور كور 2,5 ملغم إلى جانب ريفامبين إلى تقليل خفيف في العمر النصفي للبيسوبرولول. إن زيادة الجرعة في المعتاد ليست ضرورية.

تحديد الجرعة وطريقة ومددة الاستعمال

تطبق تعليمات تحديد الجرعة التالية على كونكور كور 2,5 ملغم، إلا في حال أورصى الطبيب بغير ذلك. يرجى اتباع تعليمات الطبيب بغاية، ولا فقل يؤدي كونكور كور 2,5 ملغم المفعول المناسب!

ما هي الكمية التي ينبغي تناولها من كونكور كور 2,5 ملغم وما هو عدد مرات التناول؟

ينبغي أن يكون الشخص الذي يستلجح بواسطة كونكور كور 2,5 ملغم يعاني من قصور قلبي مزمن ثابت دون تردى حد (اللامعوضة) في الأسابيع الستة الأخيرة.

ينبغي أن يكون المريض قد حصل مقنما على علاج بواسطة مضبطات أنجيوتنسين الأتريمية المحولة ACE بجرعة مناسبة (أو بواسطة علاج لتوسيع الاوعية الدموية (موسع الاوعية) في حال عدم القدرة على تحمل مضبطات أنجيوتنسين الأتريمية المحولة (ACE)، وعلاج مساعد على إدرار البول (مدر البول)، إذا تطلب الأمر علاج ديجيتاليس. ويجب أن تكون المعالجة الاساسية بهذه الأدوية ثابتة إلى ابد بعد حد ممكن في الاسابيع الأخرين، وذلك قبل الشروع في العلاج بواسطة كونكور كور 2,5 ملغم.

تبدأ المعالجة بواسطة كونكور كور 2,5 ملغم بجرعة قليلة يتم رفعها تدريجيا. يجب أن يتعمد الطبيب المعالج بخبرة في علاج القصور القلبي المزمن.

إن كونكور كور 2,5 ملغم للمرحلة الأولى من العلاج. قد يكون كونكور كور 2,5 ملغم كاف لمتابعه المعالجة الدوائية لدى بعض المرضى.

ينصح بتناول الجرعات وزياتها على الشكل التالي:

1,25 ملغم بيسوبرولول (أي ما يعادل نصف قرص من كونكور كور 2,5 ملغم) مرة واحدة يوميا لمدة أسبوع واحد.

إذا كانت قابلية الجرعة مناسبة، يتم في هذه الحالة رفع الجرعة إلى 2,5 ملغم بيسوبرولول (أي ما يعادل قرصا واحدا فقط من كونكور كور 2,5 ملغم) مرة واحدة يوميا لمدة أسبوع واحد.

إذا كانت قابلية الجرعة مناسبة، يتم في هذه الحالة رفع الجرعة إلى 5 ملغم بيسوبرولول مرة واحدة يوميا لمدة أربعة أسابيع.

إذا كانت قابلية الجرعة مناسبة، يتم في هذه الحالة رفع الجرعة إلى 7,5 ملغم بيسوبرولول مرة واحدة يوميا لمدة أربعة أسابيع.

إذا كانت قابلية الجرعة مناسبة، يتم في هذه الحالة رفع الجرعة إلى 10 ملغم بيسوبرولول مرة واحدة يوميا كجرعة دائمة.

وفي حال تطلب الأمر جرعات أعلى من 2,5 ملغم بيسوبرولول، فهناك أقرص متوفرة من كونكور كور بجرعات أعلى.

يجب أن يخضع المريض خلال الأربع ساعات التالية لبداية المعالجة بواسطة 1,25 ملغم بيسوبرولول (نصف قرص من كونكور كور 2,5 ملغم) لمراقبة (ضغط الدم، معدل سرعة القلب، اضطرابات جهاز الوصيل، مؤشرات على تردى في قصور القلب).

ينبغي عدم تناول الجرعة العليا بمقدار 10 ملغم بيسوبرولول مرة واحدة يوميا إلا بعد رفع الجرعة تدريجيا خلال فترة لا تقل عن 12 أسبوع ويمكن عدم تجاوز الجرعة.

يمكن أن يؤدي ظهور أعراض جانبية (على سبيل المثال بطء القلب العرضي أو هبوط ضغط الدم، مؤشرات على تردى في قصور القلب) إلى عدم إمكانية العلاج بالجرعة التي ينصح بها. ويمكن في حال تطلب الأمر العودة إلى خفض الجرعة العلاجية تدريجيا. كما يمكن عند الضرورة قطع المعالجة بالمستحضر وإستئناف الاستعمال من جديد كما هو مخصص في وقت لاحق.

وفي حال تردى في قصور القلب أو عدم القدرة على تحمل العلاج في مرحلة التردى ينصح الطبيب المعالج بخفض كمية البيسوبرولول وإذا تطلب الأمر لأسباب إضطرارية وقف العلاج مباشرة.

تكون معالجة أمراض القلب الشريانية المزمنة الثابتة بواسطة كونكور كور عادة معالجة طويلة الأمد.

مقدار الجرعة في حال اضطرابات الوظيفية في الكبد و/ أو الكلى

يجب تعيين الجرعة الدوائية لدى المرضى الذين يعانون من خلل وظيفي في الكبد أو الكلى بدقة وصارمة وذلك لعدم توفر الفحوصات حول حركته العقار.

كيف ومعى ينبغي تناول كونكور كور 2,5 ملغم في الصباح قبل أو أثناء أو بعد تناول الإفطار دون مضغها مع قليل من السوائل.

ما هو طول المدة الزمنية التي ينبغي فيها تناول كونكور كور 2,5 ملغم؟

تعتبر معالجة أمراض القلب الشريانية المزمنة الثابتة بواسطة كونكور كور 2,5 ملغم بشكل عام معالجة طويلة الأمد. يمنع منعا باتا تغيير مقدار الجرعة دون توجيه مسبق من قبل الطبيب المعالج. كما يجب عدم قطع أو إنهاء العلاج بكونكور كور أو دون توجيه من الطبيب. يجب عند إنهاء العلاج بواسطة كونكور كور 2,5 ملغم أن يتم خفض الجرعة تدريجيا على طريق إتهاتها (على سبيل المثال تناول نصف الجرعة أسبوعيا). يجب عدم قطع العلاج بواسطة كونكور كور، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تردى آني ببالية لقصور القلب الإحتقاني.

الاستخدام غير السليم و تجاوز الجرعة

ما الذي يجب عمله عند تناول كمية كبيرة من كونكور كور 2,5 ملغم؟

يجب مراجعة الطبيب فوراً في حال زيادة الجرعة من كونكور كور 2,5 ملغم. يقرر الطبيب في حال تطلب الأمر ذلك في خطورة زيادة الجرعة والإجراءات الضرورية اللازمة لذلك. في حال زيادة الجرعة يظهر أثرها بشكل خاص في أضعاف القلب بحيث تصبح نبضاته بطيئة (باطئ القلب) أو ينخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ جدا (انخفاض ضغط الدم) ولتشنجات الشعبية (تشنج شنبي) وقصور حد في عضلات القلب (قصور قلبي) وانخفاض نسبة السكر في الدم (نقص سكر الدم).

ينبغي في حالة تجاوز الجرعة قطع العلاج بواسطة كونكور كور 2,5 ملغم بعد مراجعة الطبيب المعالج فقط.

ما الذي يتوجب مراعاته عند تناول جرعة قليلة من كونكور كور 2,5 ملغم أو عند نسيان تناول الجرعة؟

يجب عدم مضاعفة الجرعة في حال نسيانها في إحدى المرات من أجل تعويضها، وإمّا متعانة تناول العلاج حسب الجرعة المحددة أو كما يقررها الطبيب المعالج.

ما الذي يتوجب مراعاته عند الانقطاع أو التوقف عن العلاج قبل الأوان؟

يرجى عدم قطع العلاج بواسطة كونكور كور 2,5 ملغم إلا بعد مراجعة الطبيب المعالج مقدما فقط.

يجب عدم قطع العلاج بواسطة كونكور كور 2,5 ملغم، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تردى آني بداية لقصور القلب الإحتقاني. يجب عند إنهاء العلاج بواسطة كونكور كور 2,5 ملغم أن يتم خفض الجرعة تدريجيا على طريق إتهاتها (على سبيل المثال تناول نصف الجرعة أسبوعيا). ويجب مراعاة ذلك بشكل خاص من قبل المرضى الذين يعانون من اضطراب تاجي في تدفق الدم.

التأثيرات المضادة

يمكن أن يكون للعقارات الطبية تأثيرات غير مرغوب بها، تدعى بتأثيرات مضادة، إلى جانب تأثيراتها الرئيسية المنشودة، وليس بالضرورة أن تظهر هذه الأعراض لدى كل المرضى. ماهي رموز الفعل المضادة التي قد تحدث أثناء استعمال كونكور كور 2,5 ملغم؟

إن المعلومات التالية قائمة على أساس الخبرة العلاجية بعد ترخيص إستعمال بيسوبرولول في معالجة إرتفاع ضغط الدم ومعالجة داء القلب الاكليلي:

الجهاز العصبي المركزي:

أحيانا: إعياء*، وضع إرهاق*، شعور بالدوخ*، صداع*
نادرا: اضطرابات في النوم، شعور بالكآبة،
نادرا جدا: كوابيس نوم، هلوسة

العينين:

نادرا جدا: انخفاض الدمع (يجب مراعاة ذلك في حال إستعمال العدسات اللاصقة)

حالات فردية:

التهاب المتنتحة

الأذنين:

نادرا جدا: اضطرابات سمعية

القلب والدورة الدموية والأوعية الشريانية:

أحيانا: الشعور بالبرد وخذر الأطراف
نادرا: تباطؤ عمل القلب (بطء القلب)، واضطرابات في نظام التوصيل القلبي الأذيني البطيئي (انخفاض الأذيني البطيئي)، وزيادة سوء قصور القلب، زيادة إنخفاض ضغط الدم (أيضا عند الإنتقال من الإستلقاء إلى الوقوف، نقص الضغط الشرياني)

المجاري التنفسية:

نادرا: تشنج في المجاري التنفسية (تشنج قسبي) لدى المرضى الذين يعانون من الربو القصبي أو أية أمراض انغلاق رئوي مزمنة
نادرا جدا: زكام مصحوب بحساسية (إلتهاب الأنف)

الجهاز الهضمي:

أحيانا: شعور بالتقيؤ، القيء، إسهال (إسهال)، الإمساك (إمساك مستعصي)
نادرا: ضعف العضلات، تشنج عضلي

الجلد:

نادرا جدا: ردود فعل جلدية حساسية عالية(الحك) والتورد الآثي (التورد حساسية)

حالات فردية: يمكن لمثبطات بيتا أن تؤدي إلى ظهور داء الصدف، تردى أو نشوء حساسية صدفية، تساقط الشعر

الثثانة والجهاز التناسلي:

نادرا جدا: اضطراب القدرة الجنسية

الأيض:

نادرا جدا: زيادة في أنزيمات الكبد (اللاين أمينوترانسفيراز، اسبارتات أمينوترانسفيراز) (إلتهاب الكبد، ارتفاع في ثلاثي الغليسريد

* تظهر هذه الاعراض بشكل خاص في بداية المعالجة، وتكون في العادة بسيطة وتلتشى بعد أسبوع أو إسبوعين من بداية العلاج.

في حال لوحظت أي من التأثيرات المضادة بما في ذلك التأثيرات غير المذكورة في هذه الفقرة الطبية، يرجى مراجعة وإبلاغ الطبيب المختص أو الصيدلي بذلك حالا.

ما هي الإجراءات المضادة التي يجب إتخاذها في حال حدوث التأثيرات المضادة؟

يرجى في حال تطلب الأمر إتخاذ إجراءات مضادة مراجعة الطبيب المعالج للتقرير في الموضوع.

ملاحظات ومعلومات تتعلق بصلاحية الدواء

تاريخ إنتهاء صلاحية هذا الدواء مطبوع على العبوة المغلفة للدواء وعلى حافة كل شريط من أشرطة الأقرص. يمنع استخدام هذه العبوة بمجرد إنتهاء تاريخ صلاحيتها!

كيفية تخزين كونكور كور 2,5 ملغم؟

يحفظ في مكان درجة حرارته دون 25 درجة مئوية.

تاريخ الإصدار

شباط (فبراير) 2002.

رقم التسجيل لبنان -149٢٣١٤

توضيح فارماين. لبنان

إجازة من ميرك، شركة توصية بالأشهم.

دارمشتادت. ألمانيا