

كونكور كور ٢,٥ مجم أقراص مخلفة

بيسوبوروولول فيومارات

إذا نسيت تناول مستحضر كونكور كور لا تتناول جرعة مُضاعفة لتعويض الجرعة التي نسيتها. تناول جرعتك المعتادة في صباح اليوم التالي.

إذا توقفت عن تناول مستحضر كونكور كور لا توقف أبداً عن تناول مستحضر كونكور كور إلا بناء على نصيحة طبيبك. وإن فقد تسوء حالتك بشكل أكير.

إذا كانت لديك أية أستلة إضافية حول استخدام هذا المنتج، فاستشر الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.

٤. الآثار الجانبية المحتملة

مثل جميع الأدوية، قد يُسبب هذا الدواء أثاراً جانبية، على الرغم من عدم حدوثها لدى الجميع. لمنع حدوث آثار جانبية خطيرة، تحدث إلى طبيب فوراً إذا كان الأثر الجانبي شديداً أو حدث فجأة أو تفاقم سريعاً.

الآثار الجانبية الأكثر خطورة المتعلقة بوظائف القلب، هي كالتالي:

- بطء معدل ضربات القلب (قد تظهر لدى أكثر من ١٠٪ من كل ١٠٠ شخص)
- تناقص فشل القلب (قد تظهر على ما يصل من ١٠٪ من كل ١٠٠ شخص)
- بطء أو عدم انتظام ضربات القلب (قد تظهر على ما يصل من ١٪ من كل ١٠٠ شخص)

إذا شعرت بدوخة أو ضعف، أو كان لديك صعوبات في التنفس، يرجى الاتصال بطبيبك في أسرع وقت ممكناً.

المزيد من الآثار الجانبية مُدرجة أدناه وفقاً لمعنٌ تكرار حدوثها، كالتالي:

- شائعة (قد تظهر على ما يصل من ١٪ من كل ١٠٠ شخص):
- تعب، شعور بالضيق، دوخة، صداع
- شعور ببرودة أو تبمٌ في اليدين أو القدمين
- انخفاض ضغط الدم
- مشاكل بالعدة أو المعاة مثل الغثيان أو القيء، أو الإسهال أو الإمساك.

غير شائعة (قد تظهر على ما يصل من ١٪ من كل ١٠٠ شخص):

- اضطرابات النوم
- الارتجاع
- دوخة عند النهوض
- مشاكل في التنفس في المرضى المصابين بربو أو مرض مُزمن بالرئة
- ضعف العضلات، تقلصات عضلية

نادرة (قد تظهر على ما يصل من ١٪ من كل ١٠٠٠ شخص):

- مشاكل بجهاز المسح
- رش الأنف التحسسي
- انخفاض تدفق الدم

• التهاب الكبد الذي قد يُسبب اضطرابات الجلد أو بياض العينين

• اختلاف بعض تباين احبارات الدم الخاصة بوظائف الكبد أو مستويات الدهون عن المعدل الطبيعي

• تقلّفات شبه الحساسية مثل الحكة، الاحمرار، الطفح الجلدي. يجب أن ترى طبيبك على الفور إذا كنت تعاني من ردود فعل تحسّسية أكثر شدة، والتي قد تشمل تورم الوجه أو الرقبة أو الإنسان أو الفم أو الحلق أو صعوبة التنفس.

• ضغف الانصمام

• كوابيس، هالوس

• إغماء

نادرة جدًا (قد تظهر على ما يصل من ١٪ من كل ١٠٠٠٠ شخص):

- تبيج واحمرار العين (التهاب الملتحمة)
- سقط الشعر
- ظهور أو تفاقم طفح جلدي متقدّر (صدفية)، طفح جلدي شبيه بالصدفية.

إذا ظهرت لديك أية آثار جانبية، تحدث إلى الطبيب أو الصيدلي الخاص بك، بما في ذلك أية آثار جانبية مُختلة. غير المُرّجة في هذه النشرة، بالإبلاغ عن الآثار الجانبية، يمكن المساعدة على توفير المزيد من المعلومات عن سلامة الدواء.

٥. كيفية تخزين مستحضر كونكور كور

• يحفظ هذا الدواء بعيداً عن رؤية ومتناول الأطفال.

• لا تستعمل هذا الدواء بعد تارikh انتهاء الصلاحية المدون على العبوة والشريط بعد كلمة "EXP". يُشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

ظروف تخزين شريط الألومنيوم /ألومنيوم.

• لا يُخزن في درجة حرارة تتعدي ٣٠ درجة مئوية.

لا تخلص من الأدوية عن طريق إلقائها في مياه الصرف أو مع المخلفات المنزلية. استشر الصيدلي الخاص بك عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تُعد مستخدمة. ستساعد هذه الإجراءات في الحفاظ على البيئة.

٦. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

ما هي محتويات مستحضر كونكور كور

كونكور كور ٢,٥ مجم أقراص مخلفة.

المادة الفعالة هي بيسوبوروولول فومارات. يحتوي كل قرص مُغلف على ٢,٥ مجم.

المكونات الأخرى هي:

المحتوى الداخلي للفرص: سيليكا غروية لا مائية: ستيرات الماغنيسيوم؛ كروسيوفيدون؛ نشا النزرة؛ سليولوز دقيق الشيلور؛ فوسفات هيدروجين الكالسيوم (الإماني). طبقاً للغلاف، ثالث الميثيون، ماكروجول ٤٠٠؛ ثالث أكسيد التيتانيوم (E171)؛ هيروميلوز.

ما هو شكل مستحضر كونكور كور؟ وما هي محتويات العبوة؟

مستحضر كونكور كور ٢,٥ مجم أقراص مخلفة هو عبارة عن أقراص بيضاء اللون على شكل قلب وبها خط تقسيم على كلا جانبيها.

علية ترتكز تحتوى على ٧ شريط ألومنيوم /ألومنيوم ونشرة داخلية. كل شريط يحتوى على ١٥ أقراص.

تاريخ المعلومات

نوفمبر 2020

حامل حق التسويق

Merck Healthcare KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, Germany

هذا منتج دوائي

- الدواء منتج يُؤثر على صحتك وتناوله على نحو مختلف للتسلعيات يعرضك للخطر.

- يُرجى التذكرة الطبية تماماً وطريقة الاستخدام وتعليمات الصيدلي الذي ياعك للدواء.

- لا تطلب والصيادي خبران في الأدوية وفادتها ومحاطتها.

- لا تقطع فترة العلاج الموصوفة لك دون إذن الطبيب.

- لا تكرر نفس التذكرة الطبية دون استشارة طبيبك.

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب

اتحاد الصيادة العرب

الحمل: هناك خطورة لاستخدام مستحضر كونكور كور أثناء الحمل فقد يضر بالجنين، إذا كنت حاملاً أو تخطط للحمل، فأخبر طبيبك.

الرضاعة الطبيعية: إذا كنت تناول كونكور كور أثناء الرضاعة، فإن زبادات الحمولة التي

تُسببها قد تؤدي إلى تدهور حمولة الرضاعة، مما يضر الجنين.

القيادة واستخدام الآلات: قد تتأثر قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات وفقاً لمدى تحملك للدواء، يرجى توخي حذرًا خاصاً عند

القيادة واستخدام الآلات على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات وفقاً لمدى تحملك للدواء، يرجى توخي حذرًا خاصاً عند

القيادة واستخدام الآلات على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات وفقاً لمدى تحملك للدواء، يرجى توخي حذرًا خاصاً عند

القيادة واستخدام الآلات على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات وفقاً لمدى تحملك للدواء، يرجى توخي حذرًا خاصاً عند

القيادة واستخدام الآلات على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات وفقاً لمدى تحملك للدواء، يرجى توخي حذرًا خاصاً عند

القيادة واستخدام الآلات على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات وفقاً لمدى تحملك للدواء، يرجى توخي حذرًا خاصاً عند

القيادة واستخدام الآلات على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات وفقاً لمدى تحملك للدواء، يرجى توخي حذرًا خاصاً عند

القيادة واستخدام الآلات على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات وفقاً لمدى تحملك للدواء، يرجى توخي حذرًا خاصاً عند

القيادة واستخدام الآلات على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات وفقاً لمدى تحملك للدواء، يرجى توخي حذرًا خاصاً عند

القيادة واستخدام الآلات على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات وفقاً لمدى تحملك للدواء، يرجى توخي حذرًا خاصاً عند

القيادة واستخدام الآلات على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات وفقاً لمدى تحملك للدواء، يرجى توخي حذرًا خاصاً عند

القيادة واستخدام الآلات على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات وفقاً لمدى تحملك للدواء، يرجى توخي حذرًا خاصاً عند

القيادة واستخدام الآلات على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات وفقاً لمدى تحملك للدواء، يرجى توخي حذرًا خاصاً عند

القيادة واستخدام الآلات على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات وفقاً لمدى تحملك للدواء، يرجى توخي حذرًا خاصاً عند

القيادة واستخدام الآلات على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات وفقاً لمدى تحملك للدواء، يرجى توخي حذرًا خاصاً عند

القيادة واستخدام الآلات على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات وفقاً لمدى تحملك للدواء، يرجى توخي حذرًا خاصاً عند

القيادة واستخدام الآلات على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات وفقاً لمدى تحملك للدواء، يرجى توخي حذرًا خاصاً عند

القيادة واستخدام الآلات على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات وفقاً لمدى تحملك للدواء، يرجى توخي حذرًا خاصاً عند

القيادة واستخدام الآلات على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات وفقاً لمدى تحملك للدواء، يرجى توخي حذرًا خاصاً عند

القيادة واستخدام الآلات على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات وفقاً لمدى تحملك للدواء، يرجى توخي حذرًا خاصاً عند

القيادة واستخدام الآلات على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات وفقاً لمدى تحملك للدواء، يرجى توخي حذرًا خاصاً عند

القيادة واستخدام الآلات على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات وفقاً لمدى تحملك للدواء، يرجى توخي حذرًا خاصاً عند

القيادة واستخدام الآلات على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات وفقاً لمدى تحملك للدواء، يرجى توخي حذرًا خاصاً عند

القيادة واستخدام الآلات على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات وفقاً لمدى تحملك للدواء، يرجى توخي حذرًا خاصاً عند

القيادة واستخدام الآلات على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات وفقاً لمدى تحملك للدواء، يرجى توخي حذرًا خاصاً عند

القيادة واستخدام الآلات على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات وفقاً لمدى تحملك للدواء، يرجى توخي حذرًا خاصاً عند

القيادة واستخدام الآلات على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات وفقاً لمدى تحملك للدواء، يرجى توخي حذرًا خاصاً عند

القيادة واستخدام الآلات على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات وفقاً لمدى تحملك للدواء، يرجى توخي حذرًا خاصاً عند

القيادة واستخدام الآلات على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات وفقاً لمدى تحملك للدواء، يرجى توخي حذرًا خاصاً عند

القيادة واستخدام الآلات على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات وفقاً لمدى تحملك للدواء، يرجى توخي حذرًا خاصاً عند

القيادة واستخدام الآلات على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات وفقاً لمدى تحملك للدواء، يرجى توخي حذرًا خاصاً عند

القيادة واستخدام الآلات على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات وفقاً لمدى تحملك للدواء، يرجى توخي حذرًا خاصاً عند

القيادة واستخدام الآلات على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات وفقاً لمدى تحملك للدواء، يرجى توخي حذرًا خاصاً عند

القيادة واستخدام الآلات على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات وفقاً لمدى تحملك للدواء، يرجى توخي حذرًا خاصاً عند

القيادة واستخدام الآلات على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات وفقاً لمدى تحملك للدواء، يرجى توخي حذرًا خاصاً عند

القيادة واستخدام الآلات على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات وفقاً لمدى تحملك للدواء، يرجى توخي حذرًا خاصاً عند

القيادة واستخدام الآلات على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات وفقاً لمدى تحملك للدواء، يرجى توخي حذرًا خاصاً عند

القيادة واستخدام الآلات على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات وفقاً لمدى تحملك للدواء، يرجى توخي حذرًا خاصاً عند

القيادة واستخدام الآلات على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات وفقاً لمدى تحملك للدواء، يرجى توخي حذرًا خاصاً عند

القيادة واستخدام الآلات على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات وفقاً لمدى تحملك للدواء، يرجى توخي حذرًا خاصاً عند

القيادة واستخدام الآلات على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات وفقاً لمدى تحملك للدواء، يرجى توخي حذرًا خاصاً عند

القيادة واستخدام الآلات على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات وفقاً لمدى تحملك للدواء، يرجى توخي حذرًا خاصاً عند

القيادة واستخدام الآلات على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات وفقاً لمدى تحملك للدواء، يرجى توخي حذرًا خاصاً عند

القيادة واستخدام الآلات على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات وفقاً لمدى تحملك للدواء، يرجى توخي حذرًا خاصاً عند

القيادة واستخدام الآلات على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات وفقاً لمدى تحملك للدواء، يرجى توخي حذرًا خاصاً عند

القيادة واستخدام الآلات على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات وفقاً لمدى تحملك للدواء، يرجى توخي حذرًا خاصاً عند

القيادة واستخدام الآلات على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات وفقاً لمدى تحملك للدواء، يرجى توخي حذرًا خاصاً عند

القيادة واستخدام الآلات على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات وفقاً لمدى تحملك للدواء، يرجى توخي حذرًا خاصاً عند

القيادة واستخدام الآلات على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات وفقاً لمدى تحملك للدواء، يرجى توخي حذرًا خاصاً عند

القيادة واستخدام الآلات على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات وفقاً لمدى تحملك للدواء، ي