

## Merck كونكور® 5 بلوس

### المواد النشطة : بيسوبرولول فومات (1:2) وهيدروكلورثياسيد

#### التركيب

يحتوي القرص المغلف الواحد على المواد الطبية النشطة التالية:  
5 ملغم بيسوبرولول فومات (1:2) 12,5 ملغم هيدروكلورثياسيد.  
مواد إضافية:  
ثاني أكسيد السيليكون الغرواني، ستيرات المغنيسيوم، دقيق بلورية السيلوز، نشأ الذرة، هيدروكسوفات الكالسيوم، ديميثكون 100، ماكروجول 400، ميثيل هيدروكسيبروبيل السيلوز، ملونات E171، E172.

#### شكل وحجم العبوة

أقراص مغلفة، على شكل قلب، محززة في الوسط من أجل تقسيم القرص

تحتوي العبوة على 30 قرصا.

**الخاصية الدوائية**

إن هذا العقار عبارة عن مثبط البيتا الخاص بالقلب ومدد للبول.

#### حق الصنع والتسويق

ميرك، شركة توصية بالاسم Merck KGaA، Frankfurter Strasse 250 Darmstadt 64293، جمهورية ألمانيا الاتحادية Germany

#### دواعي الاستعمال

لمعالجة ارتفاع ضغط الدم (قرط ضغط الدم) ينصح بتناول المستحضر المركب كونكور 5 بلوس فقط في حال كانت المعالجة بالمادة الفاعلة منفردة بواسطة بيسوبرولول أو هيدروكلوروثiazيد، التي كان ينبغي تجربتها في معالجة قرط ضغط الدم العالي، غير كافية المغفول وثابتت تركيبة المواد الفاعلة ضمن كونكور 5 بلوس نتائج إيجابية ضمن الجرعة المحددة.

#### موانع الاستعمال

**متى يمنع استعمال كونكور 5 ملغم؟**

يمنع استعمال كونكور 5 بلوس في الحالات التالية:

في حال قصور عضلات القلب الحاد (قصور القلب) أو أثناء سوء حال قصور القلب (اللاعضوية) التي تتطلب المعالجة عن طريق الوريد بعقار يعمل على زيادة قدرة القلب، في حال الصدمة (العضلة القلبية) الناتجة عن خلل وظيفي في القلب، في حال وجود خلل حاد في التوصيل أذيني بطيني في القلب (من الدرجة الثانية والثالثة) بدون الناعمة القلبية، في حال وجود ظاهرة مرض الجيوب (ظاهرة سيك زينو)، في حال وجود خلل توصيلي بين العقدة الجيبية الأذينية من جهة والأيمن من جهة أخرى (إحصار جيبى أذني)، في حال نبض القلب الطبيعي جدا (بطئ القلب اقل من 50 ضربة في الدقيقة الواحدة) قبل البدء في المعالجة،

في حال زيادة نسبة حموضة الدم (الحماض)، في حال المعال للاحصابى بمرض التشنج الشعبي (على سبيل المثال الربو القصبي)، كذلك في المراحل المتقدمة من الخلل الحويطي في الدورة الدموية، مزمنة تناول كونكور إلى جانب مثبطات أحادي أوكسيد الأمين (ما عدا مثبطات أحادي أوكسيد الأمين ب)، في حال وجود اضطراب حاد في عمل الكلية (لدى المرضى الذين يعانون من خلل كلوي إلى جانب قلة البول أو انقطاع البول وكرياتينين > 3 ملغم/100ملتر، و/أو مصل - كرياتينين أكثر من 1,8 ملغم/100ملتر)، التهاب حاد في أجزاء معينة من الكلى (التهاب كلوي كبيبي حاد)، خلل كلوي مصحوب بالغيبوية (غيبوية وقيل بدايات السبات الكيدي)، في حالات نقص البوتاسيوم في الدم (نقص البوتاسيمية) الغير

قابلة للعلاج، في حالات نقص الحاد في صوديوم الدم (نقص صوديوم الدم الحاد)، في حالات ارتفاع نسبة الكالسيوم في الدم (إرتط الكالسيوم)، النقرس، الحساسية المفرطة تجاه

الهيدروكلوروثiazيد والتيازيدات الأخرى، والسفوناميدات ومثبطات البيتا، بالنسبة للأطفال (لا تتوفر الخبرة العلاجية اللازمة في هذا المجال).

تؤدي مزمنة تناول كونكور 5 بلوس مع مثبطات الكالسيوم من صنف فيرابميل وديليسيازيم أو أي مضادات للأنظمة أخرى (على سبيل المثال ديسوبيراميد) إلى ردود فعل عكسية (باستثناء: طب العناية المكثفة).

يمنع استعمال كونكور 5 بلوس أثناء فترة الحمل والإرضاع.

**متى يجب استثمارة الطبيب قبل استعمال كونكور 5 ملغم؟**

لا يسمح في الحالات التالية بتناول كونكور 5 بلوس إلا تحت شروط محددة وبحذر شديد جدا. يرجى استثمارة الطبيب في هذا الخصوص. يطمئن هذا أيضا حتى ولو تعرض الشخص المعنى لمثل هذه الظواهر في مرة سابقة.

في حال وجود اضطرابات القلب (أذيني بطني من الدرجة الأولى)، في حال وجود داء السكري المسبق الظاهر أو المستتر (في حال إمكانية نقص سكر الدم، مراقبة نسبة السكر في الدم بشكل منتظم)، أثناء فترة الصوم الصحي الصارم

الطويلة وعين الإرهاق البدني (إمكانية انخفاض شديد في سكر الدم)، في حال وجود أمراض الغدة الكظرية التي تفرز هرمونات (ورم القواتم، يجب المعالجة المسبقة بمثبطات البيتا)، في حال نقص كمية الدم في الدورة الدموية (نقص حجم الدم)، في حال التئسك الحاد في الأوعية الدموية في

الدماغ (التصلب الدماغي)، في حال تصلب الشرايين الحاد في القلب (التصلب التاجي)، في حالات الأمراض الصدرية حتى التي تنشأ بسبب تشنج الأوعية الدموية في القلب في أوضاع الراحة (تنبج الراحة (Prinzmetal angina)، ضعف في عمل الكلية من الدرجة المتوسطة في جانب

جود ضعف وظيفي في الكبد. ينبغي العلاج بواسطة مثبطات البيتا (على سبيل المثال كونكور 5 بلوس) عند المرضى بداء الصدف من خلال سيرتهم الشخضية أو العائلية الطبية بحذر وبعد التشقق الشديد بالفائدة والضرر المترتب على ذلك.

يمكن أن يصبح كونكور 5 بلوس عديم الفعول في حال القصور الكلوي (قصور كلوي، إذا كانت الرضاحة الكبيبية أقل من 30 ملتر/الدقيقة و/أو كان مصل الكرياتينين أكثر من 1,8 ملغم/100 ملتر) وقد يصبح ضارا إذا استمرت نسبة الرشاخ الكبيبي في الانخفاض.

يمكن أن تؤدي مثبطات البيتا إلى زيادة الحساسية حدة إلى خطورة في ردود الفعل الاستهادية، أي زيادة زيادة ردود فعل حساسية عامة حادة. لذا يجب عدم تناول كونكور 5 بلوس إلا فقط بعد التتقيق في أوضاع المرضى ذوي تاريخ ردود الفعل المتعلقة بالحساسية العالية والمرضى الذين يخضعون للعلاج من أجل إزالة الحساسية (يجب الحذر من ردود الفعل الاستهادية القوية).

**ما الذي يجب مراعاته من قبل السيدات الحوامل والأمهات المرضعات؟**

يمنع تناول كونكور 5 بلوس أثناء فترة الحمل بسبب إمكانية قلة الصفحات النموية لدى الوليد الجديد. ينبغي أيضا عدم تناول كونكور 5 بلوس أثناء فترة الإرضاع لان مادة هيدروكلورثياسيد تعمل على تثبيط إدرار الحليب. وفي حال توجب تناول كونكور 5 ملغم، فينبغي في هذه الحالة إقطاع الطفل.

**ما الذي يجب مراعاته لدى الأطفال وكبار السن والمرضى؟**

ينبغي عدم استعمال كونكور 5 بلوس لعلاج الأطفال لعدم توفر الخبرة العلاجية الكافية على الإنسان في هذا المجال. أما فيما يتعلق بكبار السن والمرضى فليس هناك ما يجب مراعاته بشكل خاص.

#### تنبهات وتحذيرات الاستعمال

**ما هي الاحتياطات التي يجب مراعاتها؟**

يمكن أن تؤدي العلاجات التي تحتوي على مثبطات البيتا إلى زيادة الحساسية حدة إلى خطورة في ردود الفعل الاستهادية، أي زيادة ردود فعل حساسية عامة حادة. لذا يجب عدم تناول كونكور 5 بلوس إلا فقط بعد التتقيق في أوضاع المرضى ذوي تاريخ ردود الفعل المتعلقة بالحساسية العالية والمرضى الذين يخضعون للعلاج من أجل إزالة الحساسية (يجب الحذر من ردود الفعل الاستهادية القوية).

يجب مراعاة التعليمات الخاصة بالجرعة فيما يتعلق بالمرض الوظيفي الحاد في الكبد والكلى بسبب تنبني إمكانية التصلب من مادة هيدروكلورثياسيد التي تدخل في تركيب كونكور 5 بلوس (انظر القسم الخاص بالجرعة).

بما أنه من الممكن أن تكون إشارة هذه الحالة نقص سكر الدم خفية، فيجب في هذه الحالة مراقبة نسبة السكر في الدم بشكل منتظم.

يجب أن يخضع المرضى للاشتراف الطبي في حالات المعالجة الطبية طويلة الأمد بواسطة كونكور 5 بلوس من أجل مراقبة أمصال المنحل الكهربيوية (خاصة البوتاسيوم، والصوديوم، والكالسيوم)، والكرياتينين واليورين، والمصل الشحمي (كوليسترول ولاثلي الغليسيريد)، وحامض البوليوك ونسبة جلوكوز الدم.

يجب التنبيه في حال استعمال الحماض اللاصقة إلى إمكانية انخفاض تنفق الدمع.

ينبغي على المرضى الذين يخضعون للمعالجة بواسطة كونكور 5 بلوس الالتزام بالجدول المنسوب بالسوائل والأطعمة الغنية بالبوتاسيوم (على سبيل المثال الموز والخضار الجوز)، وذلك من أجل التعويض عن نقص البوتاسيوم. ومن الممكن التقليل أو الوقاية من خسارة البوتاسيوم من خلال العلاج المترام بمدرات البول شحيح البوتاسيوم.

**ما الذي يجب مراعاته على الظروف و أثناء العمل على آلات أو العمل في أماكن غير ميثئة؟**

تتطلب معالجة ارتفاع نسبة السكر في الدم بواسطة هذا المستحضر الطبي الرقابة الطبية المنتظمة. بسبب اختلاف ردود الفعل عند استعمال هذا الدواء من شخص إلى آخر، من الممكن أن تتغير القدرة على رد الفعل إلى درجة يصعب عندها القدرة على سواقة السيارات أو العمل على الآلات في أماكن غير ميثئة. ويعتبر هذا هاما بشكل خاص في المرحلة العلاجية الأولى وفي حال رفع الجرعة وتغيير الدواء وذلك من خلال التأثر بالحد.

**إلى ماذا يجب التنبيه أيضا؟**

قد تؤدي المستحضرات الطبية التي تحتوي على مثبطات البيتا (على سبيل المثال كونكور 5 بلوس) في حالات فردية إلى ظهور أعراض داء الصدف وتؤدي الإصابة به أو ظهور أشكال تنبتهات خاصة على الجلد.

إن هذا دواء - الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافا لتعليمات بعرضك للخطر .

- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفه لك.
- فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء ونفعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء دون مراجعة الطبيب.

**لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.**

مجلس وزراء الصحة العرب اتحاد الصيدالة العرب التاترات الدوائية للقلب

**ما هي الأدوية الأخرى التي تؤثر على مغفول كونكور 5 بلوس؟**

إن هناك خطورة عند تزامن تناول جرعات كونكور 5 بلوس في جانب مثبطات ACE الخاصة بضغط الدم والقلب (على سبيل المثال كابتوبريل، انلاريل) حيث يؤدي ذلك إلى خفض حاد في ضغط الدم في المرحلة الأولى من المعالجة. إن مزمنة تناول كونكور 5 بلوس إلى جانب الأسولين أو مضادات السكري التي يتم تناولها عن طريق الفم ربما تؤدي إلى زيادة فاعليتها أو إلى إطالة فترتها أو أيضا إلى أضعاف مغفولها. إن إشارة الإنذار إلى نقص سكر الدم - وبشكل خاص تسرع القلب والرعاش - تكون خفية أو ضعيفة، يجب في هذه الحالة مراقبة نسبة السكر في الدم بشكل منتظم. قد تؤدي ساليولات ومستحضرات مضادات التهاب أخرى خالية من الستيرويد (على سبيل المثال الستيروئيدات) إلى أضعاف مغفول مضادات قرط ضغط الدم ومفعول كونكور 5 بلوس على إدرار البول.

وفي حالات الجرعات العلاجية العالية من الساليولات قد يزداد المغفول السمي للساليولات على الجهاز العصبي الرئيسي. قد يؤدي تزامن تناول جرعات كونكور 5 بلوس في جانب مستحضرات مضادات الالتهاب الخالية من الستيرويد لدى المصابين بنقص حجم الدم إلى قصور كلوي حاد.

قد يزداد مغفول كونكور 5 بلوس المضاد لقرط ضغط الدم في حال تم تناوله إلى جانب مستحضرات أخرى مضادة لقرط ضغط الدم أو باربيتورات أو فينوثيازينات أو ثلاثي الدوروي المضاد للكتئاب أو موسع الأوعية أو الكحول.

يمكن أن تؤدي مزمنة العلاج بكونكور 5 بلوس ومثبطات الكالسيوم من صنف نيفيديين إلى زيادة انخفاض ضغط الدم وفي بعض الأحوال إلى زيادة قصور القلب.

من الممكن أن يخضع مفعول المثبط القلبي لكونكور 5 بلوس من خلال مضادات الأنظمة. ويجب في حال مزمنة تناول كونكور مع مثبطات الكالسيوم من صنف فيرابميل وديليسيازيم أو أي مضادات للأنظمة أخرى (على سبيل المثال ديسوبيراميد) إلى خفض المراقبة الطبية من قبل الطبيب مبانرا، وذلك بسبب إمكانية انخفاض ضغط الدم، وترجع نبضات القلب وظهور خلل في انتظام عمل القلب أو القصور القلبي وما شابه ذلك.

إن المعالجة بمثبطات الكالسيوم عن طريق كورتا من صنف فيرابميل وديليسيازيم أو أي مضادات للأنظمة أخرى (على سبيل المثال ديسوبيراميد) للمرضى الذين يخضعون للمعالجة بواسطة كونكور 5 بلوس يعتبر تضادا استنباطي (باستثناء: العناية الطبية المكثفة). قد تؤدي المعالجة

المتزامنة بواسطة كونكور 5 بلوس في جانب ريسبريين أو الفا - ميثول دوبا أو غوانفاسين أو كلوندين إلى الاقراط في نقص سرعة القلب أو إعاقة الإيصال القلبي.

إن الانقطاع المفاجئ عن تناول كلوندين بالتزامن مع تناول كونكور 5 بلوس قد يؤدي إلى الارتفاع الحاد في ضغط الدم، لذا لا يسمح بإيقاف العلاج به إلا فقط بعد مرور عدة أيام على الانتهاء من المعالجة بكونكور 5 بلوس.

إضافة إلى ذلك قد تؤدي المعالجة المتزامنة بواسطة كونكور 5 بلوس ونورادرينالين أو الأدرينالين أو أي مستحضر ملقد ودي آخر (على سبيل المثال في المستحضرات ضد السعال، وطغرات الأتف والعيون) أيضا إلى انخفاض ضغط الدم.

ينبغي عدم تناول مثبطات أحادي الأيون بالتزامن مع كونكور 5 بلوس بسبب إمكانية ارتفاع قرط ضغط الدم. ربما يضعف تأثير المستحضرات التي تعمل على خفض حمض البوليوك عند المعالجة المتزامنة بكونكور 5 بلوس.

في حال المعالجة المتزامنة بالغليكوسيدات القلبية يجب التنبه إلى أنه من الممكن أن يحدث نقص البوتاسيمية و/أو نقص المانيزيمية أثناء العلاج بكونكور 5 بلوس ، ويزداد الضعف العضلي القلبي حيث يؤدي زيادة الحساسية للغليكوسيدات القلبية، وتؤدي هذه بدورها إلى زيادة مغفولها وروود فعل مختلفة.

إن المعالجة المتزامنة بواسطة مشتقات إرغوتامين (على سبيل المثال في مضادات الشقيقة مركبات إرغوتامين) إلى جانب كونكور 5 بلوس قد تؤدي إلى زيادة حدة اضطراب الدورة الدموية الحويطية.

وقد ينتج عن التناول المتزامن لكونكور 5 بلوس في جانب الهرمونات القشرانية السكرية أو ACTH أو المضاد المشتمين كاربينوكسولون، أو أمفوتيريس ب، أو فروسماليد أو المليئات ارتفاع فقدان البوتاسيوم.

أما المعالجة المتزامنة بكونكور 5 بلوس إلى جانب الليثيوم فإنها تزيد من مغفول مسلمات القلب ومن مسلمات العصب الناتجة عن الليثيوم. وذلك من خلال التأثير على القدرة على إخراج الليثيوم. تؤدي المعالجة المتزامنة بواسطة كونكور 5 بلوس والمواد المخدرة إلى الضعف المفرط في ضغط الدم. ويمكن أن يؤدي إضافة لذلك إلى مغفول عضلي سلمي.

وقد يؤدي العلاج بكونكور 5 بلوس إلى جانب احد أصناف الكورار الخاص بارخاء العضلات إلى زيادة أو إطالة فترة الضمالات.

وفي حال تطلب الأمر ضرورة إجراء عملية تخدير عام أو تناول أصناف الكورار الخاصة بارخاء العضلات مع عدم إمكانية الكف عن تناول كونكور 5 بلوس يجب في هذه الحالة إحاطة الطبيب المخدر علما بذلك قبل البدء في التخدير، وذلك بان المريض يتناول كونكور 5 بلوس.

أما المعالجة المتزامنة مع الزكود الخلوي (على سبيل المثال سيكلوفوسفاميد، فلوروراسيل، ميثوتريكسات) فمن الممكن أن تؤدي إلى زيادة سمية النقي.

أما ريفامبين فقد يقلل من مغفول كونكور 5 بلوس في خفض ضغط الدم، بينما بإمكان سيميثيدين العمل على زيادة ضغط الدم.

قد يؤدي كونكور 5 بلوس إلى تقليل إخراج الليدوكاين. تؤدي المعالجة المتزامنة بواسطة الكولستيرامين أو الكولستيبول إلى تقليل امتصاص مكونات الهيدروكلوروثiazيد في كونكور 5 بلوس.

وفي بعض الحالات الفردية تمت ملاحظة أن تزامن العلاج مع ميثول دوبا لحل الدم يعمل على نشوء اجسام مضادة للهيدروكلوروثiazيد. إن المعالجة بمثبطات الكالسيوم عن طريق الوريد من صنف فيرابميل وديليسيازيم أو أي مضادات للأنظمة أخرى (على سبيل المثال ديسوبيراميد) للمرضى الذين يخضعون للمعالجة بواسطة كونكور 5 بلوس يعتبر تضادا استنباطي (باستثناء: العناية الطبية المكثفة).

#### تحديد الجرعة وطريقة ومدة الاستعمال

**تطبيق تعليمات تحديد الجرعة التالية على كونكور 5 بلوس، إلا في حال أوصى الطبيب بغير ذلك. يرجى اتباع تعليمات الطبيب بعناية، وإلا فلن يؤدي كونكور 5 بلوس المغفول المناسب؛ ما هي الكمية التي ينبغي تناولها من كونكور 5 بلوس وما هو عدد مرات تناولها؟**

تبدأ معالجة ضغط الدم المرتفع جدا بمدنيا بجرعات خفيفة مقصورة على مادة نشطة واحدة يمكن رفعها بعد ذلك تدريجيا. ينبغي استعمال الترتيبية الثانية كونكور 5 بلوس من بيسوبرولول وهيدروكلوروثiazيد فقط إذا لم يعد ضغط الدم طبيعيا على إثر المعالجة بالمادة النشطة الفردية أو في حال ظهور ردود فعل جانبية مختلفة شديدة من جراء الجرعات العالية، وبعد التأكد من أن تركيبة المكونات النشطة ضمن كونكور 5 بلوس مناسبة جدا حسب الجرعة المحددة. يمنع تغيير الجرعة دون مراجعة الطبيب.

في حال لم يحدد غير ذلك، يتم في المعتاد تناول قرصا مغلفا واحدا فقط من كونكور 5 بلوس (أي ما يعادل 5 ملغم بيسوبرولول فومات (1-2) و 12,5 ملغم هيدروكلوروثiazيد) مرة واحدة يوميا فقط.

أما إذا كان ضغط الدم لم ينخفض بشكل كاف فيمكن في هذه الحالة زيادة الجرعة إلى قرصين مرتين فقط مرة واحدة يوميا من كونكور 5 بلوس (أي ما يعادل 10 ملغم بيسوبرولول فومات (2-1) و 25 ملغم هيدروكلوروثiazيد).

أما بالنسبة للمرضى الذين يعانون بنض الوقت من خلل وظيفي في الكلى و / أو الكبد فينبغي أن لا تتعدى الجرعة 5 ملجمعالجة ملغم بيسوبرولول فومات (1-2) + 12,5 ملغم

هيدروكلوروثiazيد.

**كيف ومتى ينبغي تناول كونكور 5 ملغم؟**

يتم تناول قرصا كونكور 5 بلوس في الصباح أثناء تناول الإفطار دون مضغها مع قليل من السوائل.

**ما هو طول المدة الزمنية التي ينبغي فيها تناول كونكور 5 ملغم؟**

يجز الطبيب المعالج فترة العلاج بالتمسك لتناول بقرصا متحدد المدة للمعالجة بالمنسحضر حسب حدة المرض. يمنع منعا باتا تغيير مقدار الجرعة من كونكور 5 بلوس دون توجيه مسبق من قبل الطبيب المعالج. كما يجب عدم قطع العلاج بكونكور 5 بلوس دون توجيه من الطبيب.

يمنع قطع العلاج بواسطة كونكور 5 بلوس فجأة، وإنما يجب من حيث المبدأ أن يتم ذلك تدريجيا ويطبق (أي خلال فترة 7 إلى 10 أيام) على طريق إنهاؤها. ويجب التنبيه لذلك خاصة بالنسبة للمرضى الذين يعانون من اضطراب في تنفق الدم في الشرايين التاجية للقلب، لان القطع المفاجئ للعلاج يمكن أن يؤدي إلى تردي حاد في الوضع الصحي.

#### الاستخدام غير السليم و تجاوز الجرعة

**ما الذي يجب عمله عند تناول كمية كبيرة من كونكور 5 ملغم؟**

يجب مراجعة الطبيب فوراً في حال زيادة الجرعة.

في حال زيادة الجرعة (من كونكور 5 ملغم) أو حصول انخفاض حاد وخطر في معدل نبضات القلب و / أو انخفاض ضغط الدم يجب التوقف فوراً عن تناول كونكور 5 بلوس. يمكن عند زيادة الجرعة أن يظهر أثرها بشكل خاص في أضعاف القلب بحيث تصبح نبضاته بطيئة جدا. ويمكن حصول أزمة تنفسية بسبب التشنج الشعبي. وقد يؤدي ذلك أيضا إلى العطش بسبب نقص السوائل والإعياء والشعور بالوار أو ألم في العضل

وإرتفاع في سرعة نبضات القلب والتهاب المري والمغص والقصور الحاد في الكبد والأنظمة القلبية والإسما الذي قد يصل إلى حد إسداد الأمعاء.

ينبغي في حال تطلب الأمر أن يحدد الطبيب المعالج المواد المضادة التالية على أن يتم تناولها منفردة أو بالتوالي:

- لثروبين عن طريق الوريد بجرعة قدرها 0,5 - 2,0 ملغم كحقنة كبيرة

- جوكاجون عن طريق الوريد بجرعة قدرها 1 - 10 ملغم بعد ذلك 2 - 2,5 ملغم كل ساعة كحقنة مستمرة

- أورسيسينذالين عن طريق الوريد بشكل بطيئ حتى يبدأ المغفول

- أما في حالات التشنج فينبغي إعطاء المصاب العقار المهدئ ديزسيام حقا عن طريق الوريد بشكل بطيئ

- قد تكون المعالجة الاستبدالية بالسوائل والبوتاسيوم ضرورية

- يمكن في حال حصول تشنج شعبي إعطاء المصاب أدوية من أجل توسيع الشرايين التنفسية على سبيل المثال فينوثيزول أو ساليوتامول على طريق الرذاذ.

**ما الذي يتوجب مراعاته عند تناول جرعة قليلة من كونكور 5 بلوس أو عند نسيان تناول الجرعة؟**

يجب متابعة تناول المغفول في اليوم التالي حسب الجرعة العادية المعتادة.

**ما الذي يتوجب مراعاته عند الانقطاع أو التوقف عن العلاج قبل الأوان؟**

يجب عدم قطع العلاج بواسطة كونكور 5 ملغم فجأة مرة واحدة وإنما يتم مدنيا خفض الجرعة تدريجيا على طريق إنهاؤها. ويجب مراعاة ذلك بشكل خاص من قبل المرضى الذين يعانون من أمراض الأوعية التاجية. كما يمنع من حيث المبدأ تغيير الجرعة دون أمر الطبيب.

#### التأثيرات المضادة

**ماهي ردود الفعل المضادة التي قد تحدث أثناء استعمال كونكور 5 بلوس؟**

**الجهاز العصبي الرئيسي**  
تتصل أحيانا اضطرابات في الجهاز العصبي الرئيسي، على سبيل المثال إعياء، شعور بالكآبة، شعور بالدوخ، إرتباك، صداع، ترقق، كوابيس نوم أو أحلام مكثفة، اضطرابات في النوم، هلوسة.

#### العينين

نادرا: اضطرابات في الرؤية، انخفاض الدمع (يجب مراعاة ذلك في حال استعمال الحماض اللاصقة)، التهاب المتحمدة.

**القلب والنورة النموية والأوعية الشريانية**  
يمكن أن تؤدي المعالجة بواسطة كونكور 5 بلوس إلى تباطؤ في عمل القلب (بطء القلب)، واضطرابات في نظام التوصيل القلبي الأذيني البطيني (الاحساس الأذيني البطيني) أو وزيادة ضغط عضلات القلب (قصور القلب) المفردن بالأوديما الطرفية و / أو الأزمة التنفسية عند التعرض للضغط زيادة انخفاض ضغط الدم (أيضا عند الانتقال من الإستلقاء إلى الوقوف، نقص الضغط الشرياني)، كما تؤدي أحيانا إلى الإصابة بالغيبوية المفاجئة (الإغماء) وفحطان القلب. أما فيما يتعلق بمرضى النذحة الصدرية فيمكن في حالات نادرة جدا حصول آلام في منطقة القلب قابلة للإزياة.

قائلة للشعور أحيانا بالبرد وخدر الأطراف وضعف العضلات أو تشنجه (على سبيل المثال في ريلة الساق). كذلك يمكن زيادة الآلام الناتجة عن اضطرابات في الدورة الدموية - بما في ذلك تشنج أوردة الأصابع (ظاهرة رينولد).

#### المجاري التنفسية

نتيجة لإمكانية زيادة مقاومة المجاري التنفسية، يمكن تعرض المرضى الذين يعانون من الربو القصبي أو أية امراض انغلاق رئوي مزمنة إلى تشنج في المجاري التنفسية (تشنج قصبي) مما قد يؤدي بالتالي إلى أزمة تنفسية.

**الجهاز الهضمي**  
تمت أحيانا ملاحظة فقدان الشهية وحدث آلام في المعدة والإمعاء على سبيل المثال شعور بالتقيؤ، القيء، إسهال (إسهال)، الإمساك (إسك) مستعصي)، الأم وتشنجات في البطن. ونادرا: جفاف الفم.

#### الهيكل العضلي والعصبي

تمت أحيانا على أثر المعالجة بواسطة مثبطات البيتا المادة النشطة بيسوبرولول ضمن كونكور 5 بلوس ملاحظة ظهور إعتلال المفصل مع إصابة مفصل أو أكثر (التهاب مفصلي فردي أو متعددي).

تظهر أحيانا ردود فعل جلدية حساسية (على سبيل المثال الحماص، الحك، الأرجية الضوئية (أي حمى أرجية الضوء الطفحية)، إجمار الجلد الدامي والأغشية المخاطية والشري الحاد.

#### المثانة والجهاز التناسلي

في حالات فردية: تشنج في القدرة الجنسية.

في حالات فردية: زيادة في أنزيمات الكبد (الانين أمينوترانسفيراز، أسبارتات أمينوترانسفيراز) في الدم، التهاب الكبد (تهاب كيدي). قد يتحول ديابيطس السكري المخفني إلى ديابيطس سكري، وقد يصبح ديابيطس السكري أكثر حدة. ومن الممكن أن تؤدي المعالجة بواسطة كونكور 5 بلوس على أثر الصوم الحساسية الصارم لفترة طويلة الأجل أو الجهد البدني الكبير إلى انخفاض نسبة الجلوكوز في الدم إلى ما دون المعدل الأدنى. قد يكون انخفاض مستوى الجلوكوز في الدم غير ظاهر (خاصة معدل سرعة القلب، الرجاخ اللارادي).

قد يؤدي نشوء قرط حمض البول في الدم في بعض الحالات إلى مرض النقرس لدى المرضى المؤهلين للإصابة بذلك. ومن الممكن أحيانا ملاحظة حصول زيادة عكسية في مصل المواد المخرجة مع البول (كرياتين، يوريا).

يمكن في حالات نادرة أن تؤدي المعالجة بواسطة كونكور 5 بلوس إلى ارتفاع المصل الشحمي في الدم (كوليستيرول، ثلاثي الغليسريد).

#### الدم

في حالات فردية: حدوث قلة في الصفائح النموية، أو فقر الدم، أو قلة كريات الدم البيضاء.

توازن السوائل والمنحل الكهربيوي.

يمكن أن يؤدي مغفول مادة الهيدروكلوروثiazيد على المدى الطويل والاستمرار في المعالجة بواسطة كونكور 5 بلوس أحيانا إلى اضطرابات في توازن السوائل وتوازن المنحل الكهربيوي، وبشكل خاص إلى نقص البوتاسيمية ونقص صوديوم الدم، وأن يؤدي علاوة على ذلك إلى نقص مغنسيوم الدم وقلة كلور الدم، كما يمكن أن يؤدي إلى فرط الكسيمي.

ومن الممكن أن يؤدي نقص البوتاسيمية إلى شعور غير عادي في العضء الجسم (تشنج الحن)، التشنج الخفيف، الحمول، تجمع الغازات بشكل كبير في الجهاز الهضمي (إنتفاخ البطن)، أو إلى خلل في انتظام عمل القلب أي الأنظمة. وقد يؤدي فقدان كمية كبيرة من البوتاسيوم إلى شلل في الأمعاء (علوص شللي) وإلى اضطرابات في الوعي قد تصل إلى حد الإغماء.

يمكن أن يؤدي فقدان توازن السوائل والمنحل الكهربيوي إلى القلاء الإيضي كما يمكن أن يؤدي إلى تردي القلاء الأيضي في حال كان قلما.

#### تأثيرات مضادة أخرى

يمكن في بعض الحالات النادرة نشو ردود فعل مضادة للمادة العاملة على إدرار البول (الهيدروكلوروثiazيد) النادرة في تكوين كونكور 5 بلوس مثل حمى الأودية، التهاب الكلية الخلالي الحاد، والتهاب الوعائي، على سبيل المثال الفرورية، والصفار، والتهاب المتحمدة الحاد - وبشكل خاص فيدل الإصابة بالتهصي الصفراوي - التهاب المرارة الحاد. وقد يزداد قصر البصر سوء في حال وجوده.

وقد تمت ملاحظة حدوث فحاج لأوديما رئوية مصحوبة باعراض النذحة وفحاج في حالات فردية، ومن المحتمل أن تحصل كدة فعل حساسية تجاه الهيدروكلوروثiazيد. علاوة على ذلك تمت تبها بعض الحالات الفردية ملاحظة تصاقط الشعر، خلل في السمع أو الطنين، زيادة الوزن، اضطراب عاطفي، فقدان الذاكرة القصير، التهاب الأنف الأرجي أو التصلب اللصفي (مرض البيرينية).

#### ملاحظة خاصة:

يمكن لمحتويات مستحضرات مثبطات البيتا أن تؤدي إلى زيادة الحساسية تجاه اللوزجات والحساسية تجاه ردود الفعل اللوزجائية، وذلك من الممكن أن يتعرض المرضى ذوي سوابق ردود فعل وخيمة والمرضى الذين يخضعون للمعالجة بواسطة مثبطات التنسسي إلى الإصابة برودود فعل

إلزامية عالية.

يجب معالجة كونكور 5 بلوس في الحالات التالية:

- وجود اضطرابات مستعصية علاجيا في التوازن الكهربيوي،
- وجود اضطرابات في توازن القيام على سبيل المثال الغشبية أوالدوخان أو الطنين في الأذن،
- وردود فعل الحساسية المفرطة،
- الإصابة من الأجل المعدية المعوية الواضحة،
- اضطراب الجهاز المعدية المركزي،
- التهابات المتحمدة،
- تغيرات في تعداد كريات الدم (فقر الدم، قلة كريات الدم البيضاء، قلة الصفحات النموية)،
- التهاب المرارة،
- حدوث التهاب وعائي،
- في حال حصول تدهور في قصر البصر القائم،
- في حال كان مصل - كرياتينين أكثر من 1,8 ملغم/100ملتر و / أو كان كرياتينين - التصفيية  $\geq 30$  ملتر/المنظف.

في حال لوحظت أي من التأثيرات المضادة بما في ذلك التأثيرات غير المذكورة في هذه النشرة الطبية، يرجى مراجعة وإبلاغ الطبيب المختص أو الصيدلي بذلك حالا.

**ما هي الإجراءات المضادة التي يجب اتخاذها في حال حدوث التأثيرات المضادة؟**

يرجى في حال تطلب الأمر إتخاذ إجراءات مضادة مراجعة الطبيب المعالج للتقرير في الموضوع.

#### صلاحية الدواء

تاريخ انتهاء صلاحية هذا الدواء مطبوع على العبوة المغلفة للدواء وعلى حافة كل شريط من شرائط الأقراص. يمنع استخدام هذه العبوة بمجرد انتهائها تاريخ صلاحيتها!

#### تحفظ الأدوية بعيدا عن متناول أيدي الأطفال

أذار (مارس) 2002.

رقم التسجيل لبنان - ٢٠٢٧٠٢

توضيب فارمالين - لبنان  
بإجازة من ميرك، شركة توصية بالاسم.

دار مشندات. ألمانيا