

المواد النشطة : بيسوبرولول فومات (1:2) وهيدروكلورثياسيد

التكوين
يحتوي القرص المغلف الواحد على المواد الطبية النشطة التالية:
10 ملغم بيسوبرولول فومات (1:2) 25 ملغم هيدروكلورثياسيد.
مواد إضافية:
ثاني أكسيد السيليكون الغرواني، ستيرات المغنيسيوم، دقيق بلورية السيلوز، نشا الذرة، هيدروكسيدات الكالسيوم، ديميكتون 100، ماكروجول 400، ميتيل هيدروكسيبروبون السيلوز، ملونات E171، E172.

شكل وحجم العبوة
أقرص مغلفة، على شكل قلب، محززة في الوسط من أجل تقسيم القرص
تحتوي العبوة على 30 قرصاً.
الخاصية الدوائية
إن هذا المقار عباره عن مثبط البيتا الخاص بالقلب ومدر للبول.

حق الصنع والتسويق
مركز، شركة توصية بالاسم Merck KGaA، فرانكفورت شرادة 250 Frankfurter Strasse، دارم شتات Darmstadt 64293، جمهورية ألمانيا الاتحادية Germany

دواعي الاستعمال
لمعالجة ارتفاع ضغط الدم (قرط ضغط الدم) ينصح بتناول المستحضر المركب كونكور 10 بلوس فقط في حال كانت المعالجة بالمادة الفاعلة منفردة بواسطة بيسوبرولول أو هيدروكلورثياسيد، التي كان ينبغي تجربتها في معالجة قرط ضغط الدم العالي، غير كافية المفعول وأثبتت تركيبة المواد الفاعلة ضمن كونكور 10 بلوس نتائج إيجابية ضمن الجرعة المحددة.

مواعيد الاستعمال
متى يمنع استعمال كونكور 10 بلوس؟
يمنع استعمال كونكور 10 بلوس في الحالات التالية:

في حال قصور عضلات القلب الحاد (قصور القلب) أوفي حال (قصور القلب الاحتقاني)، كذلك في حال الصدمة (الصدمة القلبية) الناتجة عن خلل وظيفي في القلب، في حال وجود خلل حاد في التوصيل الأصيل لبطيني في القلب (من الدرجة الثانية والثالثة) بدون الناظمة القلبية، في حال وجود ظاهرة مرض الجيوب (ظاهرة سفة زونوس)، في حال وجود خلل توصيلي بين العقدة الجيبية الأذنية من جهة والأذنين من جهة أخرى (انحصار الجيب الأذني)، في حال نبض القلب البطيني جدا (بطئ القلب أقل من 50 ضربة في الدقيقة الواحدة) قبل البدء في المعالجة، في حال زيادة نسبة حموضة الدم (الحماض)، في حال الميل للصلابة بمرض التنسج الشعبي (على سبيل المثال الربو القصبي)، كذلك في المراحل المتقدمة من الخلل الميحيطي في الدورة الدموية ، مزمنة تناول كونكور 10 بلوس إلى جانب مثبطات أحادي أوكسيداز الأمين (ما عدا مثبطات أحادي أوكسيداز الأمين ب)، في حال وجود اضطراب حاد في عمل الكلية (لدى المرضى الذين يعانون من عطل كلوي إلى جانب قلة البول أو انقطاع البول وكرياتينين - تصفية أقل من 30 مللتر/الدقيقة، وأو مصلى - كرياتينين أكثر من 1,8ملغ/100مللتر)، التهاب حاد في أجزاء معينة من الكلى (التهاب كلوي كبيبي حاد)، خلل كلبي مصحوب بالغيبوبة (غيبوبة وقيل بدايات السبات الكلوي)، في حالات نقص البوتاسيوم في الدم (نقص البوتاسيمية) الغير قابلة للعلاج، في حالات النقص الحاد في صوديوم الدم (نقص صوديوم الدم الحاد)، في حالات ارتفاع نسبة الكالسيوم في الدم (قرط الكسيمي)، النفرس، الحساسية المفرطة تجاه الهيدروكلوروثيازيد، والتيازيدات الأخرى، والسلفوناميدات ومثبطات البيتا، بالنسبة للأطفال (لا تتوفر الخبرة العلاجية اللازمة في هذا المجال).

تؤدي مزمنة تناول كونكور 10 بلوس مع مثبطات الكالسيوم من صنف فيرابميل وديلبسيازيم أو أي مضادات لللانظمية أخرى (على سبيل المثال ديسوبيراميد) إلى ورود فعل عكسية (باستثناء: طب العناية المكثفة).

يمنع استعمال كونكور 10 بلوس أثناء فترة الحمل والإرضاع.
متى يجب استشارة الطبيب قبل استعمال كونكور 10 بلوس؟

لا يسمح في الحالات التالية بتناول كونكور 10 بلوس إلا تحت شروط محددة وبحذر شديد جدا. يرجى استشارة الطبيب في هذا الخصوص. ينطبق هذا أيضا حتى ولو تعرض الشخص المعنى لمثل هذه الظواهر في مرة سابقة.

في حال وجود اضطرابات القلب (الذيني بعني من درجة الأولى)، في حال وجود داء السكري المسبق (تظاهر أو المستتر (في حال إمكانية نقص سكر الدم، مراقبة نسبة السكر في الدم بشكل منتظم)، أثناء فترة الصوم الصحي الصارم الطويلة وعصى الإرهاق البدني (إمكانية انخفاض شديد في سكر الدم)، في حال وجود أمراض الغدة الكظرية التي تفرز هرمونات (ورم القواتم؛ يجب المعالجة المسبقة بمثبطات البيتا)، في حال نقص كمية الدم في الدورة الدموية (نقص حجم الدم)، في حال التصلب الحاد في الأوعية الدموية في الدماغ (التصلب الدماغى)، في حال تصلب الشرايين الحاد في القلب (التصلب التاجي)، في حالات الأمراض الصدرية حتى التي تنشأ بسبب تنسج الأوعية الدموية في القلب في أوضاع الراحة (نذبة الراحة Prinzmetal angina)، ضعف في عمل الكلية من الدرجة المتوسطة في جانب وجود ضعف وظيفي في الكبد. ينبغي العلاج بواسطة مثبطات البيتا (على سبيل المثال كونكور 10 بلوس) عند المرضى بداء الصل من خلال سيرتهم للشخصية أو العائلية الطبية بحذر وبعد التدقيق الشديد بالفائدة والضرر المترتبان من ذلك.

يمكن أن يصبح كونكور 10 بلوس عديم المفعول في حال نقص الكلوي (قصور كلوي، إذا كانت الرشحاة الكبيبية أقل من 30 مللتر/الدقيقة وأو كان معدل الكرياتينين أكثر من 1,8 ملغم/100 مللتر) وقد يصبح ضارا إذا استمرت نسبة الرشح الكبيبي في الانخفاض.

يمكن أن تؤدي مثبطات البيتا إلى زيادة الحساسية حدة والى خطورة في ردود الفعل الاستهفاية، أي زيادة ردود فعل حساسية عامة حادة. لذا يجب عدم تناول كونكور 10 بلوس إلا فقط بعد التدقيق في أوضاع المرضى ذوي تاريخ ردود الفعل المتعلقة بالحساسية العالية والمرضى الذين يخضعون للعلاج من أجل إزالة الحساسية (يجب الحذر من ردود الفعل الاستهفاية القوية).

ما الذي يجب مراعاته من قبل السيدات الحوامل والأمهات الحاضيات؟

يمنع تناول كونكور 10 بلوس أثناء فترة الحمل بسبب إمكانية قلة الصفائح الدموية لدى الوليد الجديد. ينبغي أيضا عدم تناول كونكور 10 بلوس أثناء فترة الإرضاع لأن مادة هيدروكلورثياسيد تعمل على تثبيط إدرار الحليب. وفي حال توجب تناول كونكور 10 بلوس، فينبغي في هذه الحالة إطفاء الطفل.

من الذي يجب مراعاته لدى الأطفال وكبار السن المرضى؟
ينبغي عدم استعمال كونكور 10 بلوس لعلاج الأطفال لعدم توفر الخبرة العلاجية الكافية على المرضى في هذا المجال. أما فيما يتعلق بكبار السن من المرضى فليس هناك ما يجب مراعاته بشكل خاص.

تنبيهات وتحذيرات الاستعمال
ما هي الاحتياطات التي يجب مراعاتها؟

يمكن أن تؤدي العلاجات التي تحتوي على مثبطات البيتا إلى زيادة الحساسية حدة والى خطورة في ردود الفعل الاستهفاية، أي زيادة ردود فعل حساسية عامة حادة. لذا يجب عدم تناول كونكور 10 بلوس إلا فقط بعد التدقيق في أوضاع المرضى ذوي تاريخ ردود الفعل المتعلقة بالحساسية العالية والمرضى الذين يخضعون للعلاج من أجل إزالة الحساسية (يجب الحذر من ردود الفعل الاستهفاية القوية).

يجب مراعاة التعليمات الخاصة بالجرعة فيما يتعلق بقصور الوظيفة الحاد في الكبد والكلى بسبب تندي إمكانية التخلص من مادة هيدروكلورثياسيد التي تدخل في تركيب كونكور 10 بلوس (أنظر القسم الخاص بالجرعة). بما أنه من الممكن أن تكون إشارة الأذثار اللى نقص سكر الدم خفية، فيجب في هذه الحالة مراقبة نسبة السكر في الدم بشكل منتظم.

يجب أن يخضع المرضى للأشرف الطبي في حالات المعالجة الطبية طويلة الأمد بواسطة كونكور 10 بلوس من أجل مراقبة الامد المنحل الكهروإيوية (خاصة البوتاسيوم، والصوديوم، والكالسيوم)، والكرياتينين واليوريا، والمصل الشحمي (كوليسترول وثلاثي الفليسريد)، وحامض البوليك ونسبة جلوكوز الدم.

يجب التنبيه في حال استعمال العدسات اللاصقة إلى إمكانية انخفاض تدفق الدم. ينبغي على المرضى الذين يخضعون للمعالجة بواسطة كونكور 10 بلوس الالتزام بالتزود المناسب بالسوائل والأطعمة الغنية بالبوتاسيوم (على سبيل المثال الموز والخضار والجوز) وذلك من أجل التعويض عن نقص البوتاسيوم. ومن خلال التقليل أو التوازي من خسارة البوتاسيوم من خلال العلاج الممتزج بمدرات البول شحجح البوتاسيوم.

ما الذي يجب مراعاته على الطرقات وأثناء العمل على آلات أو العمل في أماكن غير مثبئة؟
تتطلب معالجة ارتفاع نسبة السكر في الدم بواسطة هذا المستحضر الطبي المناسبة المنتظمة. بسبب اختلاف ردود الفعل عند استعمال هذا الدواء على شخص إلى آخر، من الممكن أن تتغير القدرة على رد الفعل إلى درجة يصعب عندها القدرة على سواقة السيارات أو العمل على الآلات في أماكن غير مثبئة. ويحتر هذا هاما بشكل خاص في المرحلة العلاجية الأولى وفي حال توفر الجرعات وتغيير الدواء وكذلك من خلال التأثر بالكحول.

لدى ماذا يجب التنبيه أيضا؟
قد تؤدي المستحضرات الطبية التي تحتوي على مثبطات البيتا (على سبيل المثال كونكور 10 بلوس) في حالات فردية إلى ظهور أعراض داء الصنف أو ترددي الصنفية به أو ظهور أشكال مشابهة لداء الصنف على الجلد.

تنبيهات خاصة
إن هذا دواء

- الدواء المستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.

- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المتصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء ونفعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء دون مراجعة الطبيب.
- لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.
مجلس وزراء الصحة العرب اتحاد الصيدالة العرب

التأثيرات الدوائية للمعالج
ما هي الأوتية الأخرى التي تؤثر على مفعول كونكور 10 بلوس؟

إن هناك خطورة عند تزامن تناول جرعات كونكور 10 بلوس إلى جانب مثبطات ACE الخاصة بضغط الدم والقلب (على سبيل المثال كابتوبريل، انلابريل) حيث يؤدي ذلك إلى خفض حاد في ضغط الدم في مرحلة العلاج الأولى. إن مزمنة تناول كونكور 10 بلوس إلى جانب الانسولين أو مضادات السكري التي يتم تناولها عن طريق فترتها ربما تؤدي إلى زيادة فاعليتها أو إلى اضطراب فترتها أو أيضا إلى اضطراب مفعولها. إن إشارة الأذثار إلى نقص جلوكوز الدم (نقص سكر الدم) وبشكل خاص تسرع القلب والرعاش تكون خفية أو ضعيفة، يجب في هذه الحالة مراقبة نسبة السكر في الدم بشكل منتظم. قد تؤدي ساليوسيلات ومستحضرات مضادات التهاب أخرى خالية من الستيرويد (على سبيل المثال اندوميستين) إلى اضطراب مفعول مضادات قرط ضغط الدم ومفعول كونكور 10 بلوس على إدرار البول.

وفي حالات الجرعات العلاجية العالية من الساليوسيلات قد يزداد المفعول السمي للساليوسيلات على الجهاز العصبي الرئيسي. قد يؤدي تزامن تناول جرعات كونكور 10 بلوس إلى جانب مستحضرات مضادات الالتهاب الخالية من الستيرويد لدى المصابين بنقص حجم الدم إلى قصور كلوي حاد.

قد يزداد مفعول كونكور 10 بلوس المضاد لقرط ضغط الدم في حال تم تناوله إلى جانب مستحضرات أخرى مضادة لقرط ضغط الدم أو باريوتورات أو فينوثيازينات أو ثلاثي الدوروي المضاد للكتبات أو موسع الأوعية أو الكحول. يمكن أن تؤدي مزمنة العلاج بكونكور 10 بلوس ومثبطات الكالسيوم من صنف نيفيديبين إلى زيادة انخفاض ضغط الدم وفي بعض الأحوال إلى زيادة قصور القلب.

من الممكن أن يخضع مفعول المثبط القلبي لكونكور 10 بلوس من خلال مضادات اللانظمية. ويجب في حال مزمنة تناول كونكور 10 بلوس مع مثبطات الكالسيوم من صنف فيرابميل وديلبسيازيم أو أي مضادات لللانظمية أخرى (على سبيل المثال ديسوبيراميد) أن يخضع المريض إلى المراقبة الطبية من قبل الطبيب مباشرة، وذلك بسبب إمكانية انخفاض ضغط الدم، وترجع نبضات القلب وتوسع خال في انتظام عمل القلب أو القصور القلبي وما شابه ذلك.

إن المعالجة بمثبطات الكالسيوم عن طريق الوريد من صنف فيرابميل وديلبسيازيم أو أي مضادات لللانظمية أخرى (على سبيل المثال ديسوبيراميد) للمرضى الذين يخضعون للمعالجة بواسطة كونكور 10 بلوس يعتبر تضاد استطلاحي (باستثناء: العناية الطبية المكثفة). قد تؤدي المعالجة المترزمة بواسطة كونكور 10 بلوس إلى جانب ريسبريين أو الفا - ميثول دوبا أو غوفاناسين أو كلونيدين إلى الأفراط في نقص سرعة القلب أو إعاقة الإيصال القلبي.

إن الانقطاع المفاجيء عن تناول كلونيدين بالتزامن مع تناول كونكور 10 بلوس قد يؤدي إلى الارتفاع الحاد في ضغط الدم. لذا لا يسمح بإيقاف العلاج به إلا فقط بعد مرور عدة أيام على الانتهاء من المعالجة بكونكور 10 بلوس.

إضافة إلى ذلك قد تؤدي المعالجة المترزمة بواسطة كونكور 10 بلوس ونورادرينالين أو الأدرينالين أو أي مستحضر مثقل ودي آخر أي منشطات الجهاز الستيماوي (على سبيل المثال في المستحضرات ضد السعال، وسوائل الأنف والعيون) أيضا إلى انخفاض ضغط الدم.

ينبغي عدم تناول مثبطات أحادي أوكسيداز الأمين بالتزامن مع كونكور 10 بلوس بسبب إمكانية ارتفاع قرط ضغط الدم. ربما يخفض تأثير المستحضرات التي تعمل على خفض حمض البوليك عند المعالجة المترزمة بكونكور 10 بلوس.

في حال المعالجة المترزمة بالفليكوسيدات القلبية يجب التنبيه إلى أنه من الممكن أن يحدث نقص في العمل الوظيفي و/أو نقص الالتهاب أثناء العلاج بكونكور 10 بلوس، ويزداد الضعف العضلي القلبي حيث يبدي زيادة الحساسية للفليكوسيدات القلبية، وتؤدي هذه بدورها إلى زيادة مفعولها ووردود فعل مختلفة.

إن المعالجة المترزمة بواسطة مشتقات إرغوتامين (على سبيل المثال في مضادات الشقيقة مركبات ارغوتامين) إلى جانب كونكور 10 بلوس قد تؤدي إلى زيادة حدة اضطراب الدورة الدموية المحيطية.

وقد ينتج عن التناول المترزم لكونكور 10 بلوس إلى جانب الستيرويدات القشرانية السكرية أو ACTH أو مضاد الهستامين كاربينوكسولون، أو امفوتيريسين ب، أو فروسميد أو المليات ارتفاع فقدان البوتاسيوم.

إن المعالجة المترزمة بكونكور 10 بلوس إلى جانب الليثيوم فإنها تزيد من مفعول مستومات القلب ومن مسمات العصب الناتجة عن الليثيوم وذلك من خلال التأثير على القدرة على إخراج الليثيوم. تؤدي المعالجة المترزمة بواسطة كونكور 10 بلوس والمواد المخدرة إلى الضعف المفرط في ضغط الدم. ويمكن أن يؤدي إضافة ذلك إلى مفعول عضلي سلبي.

وقد يؤدي العلاج بكونكور 10 بلوس إلى جانب أحد أصناف الكورار الخاص بإرخاء العضلات إلى زيادة أو إطالة فترة ضعف العضلات. وفي حال تطلب الأمر ضرورة إجراء عملية تخدير عام أو تناول أصناف الكورار الخاصة بإرخاء العضلات مع عدم إمكانية الكف عن تناول كونكور 10 بلوس فيجب في هذه الحالة إحاطة الطبيب المخدر علما بذلك قبل البدء في التخدير، وذلك بان المريض يتناول كونكور 10 بلوس.

أما المعالجة المترزمة مع الزكود كونكور (على سبيل المثال سيكلوفوسفاميد، فلوروراسيل، ميثوتريكسات) فمن الممكن أن تؤدي إلى زيادة سمية النقي.

أما ريفامبين فقد يقلل من مفعول كونكور 10 بلوس في خفض ضغط الدم، بينما بإمكان سيميثيدين العمل على زيادة ضغط الدم.

قد يؤدي كونكور 10 بلوس إلى تقليل إخراج الليثوكاين. تؤدي المعالجة المترزمة بواسطة الكولسترامين أو الكوليستيول إلى تقليل امتصاص مكونات الهيدروكلوروثيازيد في كونكور 10 بلوس.

وفي بعض الحالات الفردية تمت ملاحظة أن تزامن العلاج مع ميتول دوبا لحل الدم يعمل على نشوء اجسام مضادة للهيدروكلوروثيازيد. إن معالج بمثبطات الكالسيوم عن طريق الوريد من صنف فيرابميل وديلبسيازيم أو أي مضادات لللانظمية أخرى (على سبيل المثال ديسوبيراميد) للمرضى الذين يخضعون للمعالجة بواسطة كونكور 10 بلوس يعتبر تضاد استطلاحي (باستثناء: العناية الطبية المكثفة).

تحديد الجرعة وطريقة ومدة الاستعمال

تطبيق تعليمات تحديد الجرعة التالية على كونكور 10 بلوس، إلا في حال أوصى الطبيب وبغير ذلك. يرجى اتباع تعليمات الطبيب بعناية، وإلا فلن يؤدي كونكور 10 بلوس المفعول المناسب!

ما هي الكمية التي ينبغي تناولها من كونكور 10 بلوس وما هي عدد مرات تناولها؟
تبدأ معالجة ضغط الدم المنرفع جدا ومبينا بجرعة خفيفة مقصورة على مادة نشطة واحدة ويمكن رفعها بعد ذلك تدريجيا. ينبغي استعمال التركيبة الثابتة لكونكور 10 بلوس من بيسوبرولول وهيدروكلوروثيازيد فقط إذا لم يعد ضغط الدم طبيعيا على اثر المعالجة بالمادة النشطة الفردية أو في حال ظهور ردود فعل جانبية مختلفة شديدة من جراء الجرعات العالية، وبعد التأكد من أن تركيبة المكونات النشطة ضمن لكونكور 10 بلوس مناسبة جدا حسب الجرعة المحددة. يمنع تغيير الجرعة دون مراجعة الطبيب.

في حال لم يحدد غير ذلك، يتم في المعتاد تناول نصف قرص مغلف فقط من كونكور 10 بلوس (أي ما يعادل 5 ملغم بيسوبرولول فومات (1-2) + 12,5 ملغم هيدروكلوروثيازيد) مرة واحدة يوميا فقط.

في حال كان ضغط الدم لم ينخفض بشكل كاف فيمكن في هذه الحالة زيادة الجرعة إلى قرص مغلف واحد فقط مرة واحدة يوميا من كونكور 10 بلوس (أي ما يعادل 10 ملغم بيسوبرولول فومات (1-2) + 25 ملغم هيدروكلوروثيازيد).

أما بالنسبة للمرضى الذين يعانون بنفس الوتات من خلل وظيفي في الكلى و / أو الكبد فينبغي أن لا تتعدى الجرعة العلاجية 5 ملغم بيسوبرولول فومات (1-2) + 12,5 ملغم هيدروكلوروثيازيد.

كيفية ومتى ينبغي تناول كونكور 10 بلوس؟

يتم تناول أقرص كونكور 10 بلوس في الصباح أثناء تناول الإفطار دون مضغها مع قليل من السوائل.

ما هو طول المدة الزمنية التي ينبغي فيها تناول كونكور 10 بلوس؟
يقرر الطبيب المعالج طول الفترة الزمنية لتناول العلاج. تتحدد الفترة الزمنية للمعالجة بالمستحضر حسب حدة المرض. يمنع منعاً باتاً تغيير مقدار الجرعة من كونكور 10 بلوس دون توجيه مسبق من قبل الطبيب المعالج. يجب عدم قطع العلاج بكونكور 10 بلوس دون توجيه من الطبيب. يمنع قطع العلاج بواسطة كونكور 10 بلوس فجأة، وإنما يجب من حيث المبدأ أن يتم ذلك تدريجيا وببطء، وإنما يجب من خلال فترة 7 إلى 10 أيام) على طريق إيهائنها. ويجب التنبيه لذلك خاصة بالنسبة للمرضى الذين يعانون من اضطرابات في تدفق الدم في الأوعية الناتجة للقلب (داء القلب الكلبي: النذبة الصدرية) لان القطع المفاجئ للعلاج يمكن أن يؤدي إلى تودي حاد في الوضغ الصحي.

الاستخدام غير السليم وتجاوز الجرعة
ما الذي يجب عمله عند تناول كمية كبيرة من كونكور 10 بلوس؟

يجب مراجعة الطبيب فوراً في حال زيادة الجرعة.
في حال زيادة الجرعة (من كونكور 10 بلوس) أو حصول انخفاض حاد وخطر في معدل نبضات القلب و / أو انخفاض ضغط الدم يجب التوقف فوراً عن تناول كونكور 10 بلوس. يمكن عند

زيادة الجرعة أن يظهر أثرها بشكل خاص في أضعاف القلب بحيث تصبح نبضاته بطينة جدا. ويمكن حصول أزمة تنفسية بسبب التنسج الشعبي. وقد يؤدي ذلك أيضا إلى العطش بسبب نقص السوائل والإعياء والشعور بالدوار وآلم في العضل وإرتقاع في سرعة نبضات القلب والإهبير الدموي والقصور الحاد في الكبد واللانظمية القلبية والإسعال الذي قد يصل إلى حد إندساد الأمعاء. ينبغي في حال تطلب الأمر أن يحدد الطبيب المعالج المواد المضادة التالية على أن يتم تناولها منفردة أو بالتوالي:

- تروبين عن طريق الوريد بجرعة قدرها 0,5 - 2,0 ملغم كحقنة كبيرة
- جلوكاجون عن طريق الوريد بجرعة قدرها 1 - 10 ملغم بعد ذلك 2 - 2,5 ملغم كل ساعة كحقنة سائلة

- اوسيبيرينالين عن طريق الوريد بشكل بطئ حتى يبدأ المفعول
- أما في حالات التنسج فينبغي إعطاء المصاب العقاقير المهدئ ديزسيام حقنا عن طريق الوريد بشكل بطئ

- قد تكون المعالجة الاستبدالية بالسوائل والبوتاسيوم ضرورية
- يمكن في حال حصول تنسج شعبي إعطاء المصاب أدوية من أجل توسيع الشيبات التنفسية على سبيل المثال فينوتيرول أو ساليوتامول على شكل رذاذ.

ما الذي يتوجب مراعاته عند تناول جرعة قليلة من كونكور 10 بلوس أو عند تسمان تناول الجرعة؟

يجب متابعة تناول العلاج في اليوم التالي حسب الجرعة العادية المحددة.
ما الذي يتوجب مراعاته عند الانقطاع أو التوقف عن العلاج قبل الأوان؟

يجب عدم قطع العلاج بواسطة كونكور 10 بلوس فجأة مرة واحدة وإنما يتم مبدنيا خفض الجرعة تدريجيا على طريق إيهائنها. ويجب مراعاة ذلك بشكل خاص من قبل المرضى الذين يعانون من أمراض الأوعية التاجية. كما يمنع من حيث المبدأ تغيير الجرعة دون أمر الطبيب.

التأثيرات المضادة
ماهي ردود الفعل المضادة التي قد تحدث أثناء استعمال كونكور 10 بلوس؟

الجهاز العصبي الرئيسي
تحصل أحيانا اضطرابات في الجهاز العصبي الرئيسي، على سبيل المثال إعياء، شعور بالكآبة، شعور بالدوار، إرتباك، صداع، تعرق، كوابيس نوم أو أحلام مكثفة، اضطرابات في النوم، هلوسة.

العينين
نادرًا: اضطرابات في الرؤية، انخفاض الدمع (يجب مراعاة ذلك في حال استعمال العدسات اللاصقة)، التهاب الملتحمة.

القلب والأوعية الدموية والأوعية الشريانية
يمكن أن تؤدي المعالجة بواسطة كونكور 10 بلوس إلى يتأطو في عمل القلب (بطء القلب)، واضطرابات في نظام التوصيل القلبي الأذيني البطيني (الانحسار الأذيني البطيني) أو وزيادة ضعف عضلات القلب (قصور القلب) المقرون بالأوريميا الطرفية و / أو الأزمات التنفسية عند التعرض للضغط زيادة إنخفاض ضغط الدم (أيضا عند الإنتقال من الإستلقاء إلى الوقوف، نقص الضغط الشرياني)، كما تؤدي إلى الإصابة بالغيبوبة المفاجئة (الأوعية) وخفقان القلب. أما في ما يتعلق بمرضى النذبة الصدرية فيمكن في حالات نادرة جدا حصول آلام في منطقة القلب قابلة للزيادة.

يمكن الشعور أحيانا بالبرد وخطر الأطراف و ضعف العضلات أو تشنجهذا (على سبيل المثال في ريلة الساق). كذلك يمكن زيادة الآلام الناتجة عن اضطرابات في الدورة الدموية - بما في ذلك تنسج أوردة الأصابع (ظاهرة رينادو).

المجاري التنفسية
نتيجة لإمكانية زيادة مقاومة المجاري التنفسية، يمكن تعرض المرضى الذين يعانون من الربو القصبي أو آية أمراض انغلاق رئوي مزمنة إلى تنسج في المجاري التنفسية (تنسج قسبي) مما قد يؤدي بالتالي إلى أزمة تنفسية.

الجهاز الهضمي
تمت أحيانا ملاحظة فقدان الشهية وحدوث آلام في المعدة والإمعاء على سبيل المثال شعور بالتقيؤ، القيء، إسهال (إسهال)، الإمساك (إمساك) مستعصي)، الآم وتشنجات في البطن. ونادرا: جفاف الفم.

الهيكل العضلي والعصبي
تمت أحيانا على اثر المعالجة بواسطة مثبطات البيتا (المادة النشطة بيسوبرولول ضمن كونكور 10 بلوس) ملاحظة ظهور احتلال المفصائل مع إصابة مفصل أو أكثر (التهاب مفصلي فردي أو تعددي).

الجلد
تظهر أحيانا ردود فعل جلدية حساسية (على سبيل المثال الحماصي، الحك، الارجية الضونية (أي الحامى أرجية الضوء الطفحية)، إجمرار الجلد الدموي والأغشية المخاطية والشري الحاد.

المثانة والجهاز التناسلي
في حالات فردية: اضطراب القدرة الجنسية. **الايض**

في حالات فردية: زيادة في أنزيمات الكبد (الانين أمينوترانسفيراز، اسبارتات أمينوترانسفيراز) في الدم، التهاب الكبد (تهاب كبدي). قد يتحول ديابيطس السكري المخفئي في ديابيطس سكري، وقد يصبح ديابيطس السكري أكثر حدة. ومن الممكن أن تؤدي المعالجة بواسطة كونكور 10 بلوس على اثر الصوم الصحي الصارم لفترة طويلة الأجل أو الجهد البدني الكبير إلى انخفاض نسبة الجلوكوز في الدم إلى ما دون المعدل الأدنى. قد يكون انخفاض مستوى الجلوكوز في الدم غير ظاهر (خاصة معدل سرعة القلب، الارتفاع الجلايادي).

قد يؤدي نشوء قرط حمض البول في الدم في بعض الحالات إلى مرض النفرس لدى المرضى الموهلين للصلابة بذلك. ومن الممكن أحيانا ملاحظة حصول زيادة عكسية في معدل المواد المخرجة مع البول (كرياتينين، يوريا).

يمكن في حالات نادرة أن تؤدي المعالجة بواسطة كونكور 10 بلوس إلى ارتفاع المصل الشحمي في الدم (كوليسترول، ثلاثي الغليسريد).

في حالات فردية: حدوث قلة في الصفائح الدموية، أو فقر الدم، أو قلة كريات الدم البيضاء. توازن السوائل والمنحل الكهربائي:

يمكن أن يؤدي مفعول مادة الهيدروكلوروثيازيد على المدى الطويل والاستمرار في المعالجة بواسطة كونكور 10 بلوس لحينا إلى اضطرابات في توازن السوائل وتوازن المنحل الكهربائي، وبشكل خاص إلى نقص البوتاسيم ونقص صوديوم الدم، وأن يؤدي علاوة على ذلك إلى نقص صوديوم الدم وقلة كلور الدم، كما يمكن أن يؤدي إلى قرط الكسيمي.

ومن الممكن أن يؤدي نقص البوتاسيمية في شعور غير عادي في أعضاء الجسم (تشوش الحس)، الشلل الخفيف، الحمول، تجمع الغازات بشكل كبير في الجهاز الهضمي (إنتفاخ البطن)، أو إلى خلل في انتظام عمل القلب في اللانظمية. وقد يؤدي فقدان كمية كبيرة من البوتاسيوم إلى شلل في الأمعاء (علوص شلل) وإلى اضطرابات في الوعي قد تصل إلى حد الإغماء.

يمكن أن يؤدي فقدان توازن السوائل والمنحل الكهربائي إلى القلاء الأيضي كما يمكن أن يؤدي إلى تودي القلاء الأيضي في حال كان قائما. **تأثيرات مضادة أخرى**

يمكن في بعض الحالات النادرة نشو ردود فعل مضادة للمادة العاملة على إدرار البول (الهيدروكلوروثيازيد) الداخلة في تكوين كونكور 10 بلوس مثل حمى الأذوية، التهاب الكلية الحثالي الحاد، والتهاب العرواني، على سبيل المثال الفرغرية، والصفار، والتهاب الحاد المعككة الكلى، وبشكل خاص قبيل الإصابة بالتحصي الصفراوي - التهاب المرارة الحاد. وقد يزداد قصور البصر سوء في حال وجوده.

وقد تمت ملاحظة حدوث مفاجئ لأورديا رئوية مصحوبة باعراض النذبة وذلك في حالات فردية، ومن المحتمل أن تحصل كردة فعل حساسية تجاه الهيدروكلوروثيازيد. علاوة على ذلك تمت في بعض الحالات الفردية ملاحظة تساقط الشعر، خلل في السمع أو الطنين، زيادة الوزن، اضطراب اعراضي، فقدان الذاكرة القصير، التهاب الأتف الأرجي أو التصلب القضيبي (مرض البيرونية).

ملاحظة خاصة:

يمكن لمحتويات مستحضرات مثبطات البيتا أن تؤدي إلى زيادة الحساسية تجاه المورجات والحساسية تجاه ردود الفعل للاراقية. ولذلك من الممكن أن يتعرض المرضى ذوي سوابق ردود فعل وخيمة والمرضى الذين يخضعون للمعالجة من أجل إزالة التحسس إلى الإصابة بردود فعل لاراقية عالية.

يجب قطع المعالجة بكونكور 10 بلوس في الحالات التالية:

- التوازن اضطرابات مستعصية علاجيا في الجود الكهروإيوي،
- وجود اضطرابات في توازن القيام على سبيل المثال الغشقة أو الدوخان أو الطنين في الأذن،
- ردود فعل الحساسية المفرطة،
- المعتامة من الآلام المعدية المعوية الواضحة،
- اضطراب الجهاز العصبي المركزي،
- التهاب المعككة،
- تغيرات في تعداد كريات الدم (فقر الدم، قلة كريات الدم البيضاء، قلة الصفائح الدموية)،
- التهاب المرارة،
- حدوث التهاب وعائي،
- في حال حصول تدهور في قصر البصر القائم،
- في حال كان معدل ص / أو كرياتينين - 1,8ملغم/100مللتر أو كرياتينين - تصفية 30 مللتر/الدقيقة.

في حال التأثر بجزء أي من التأثيرات المضادة بما في ذلك التأثيرات غير المذكورة في هذه النشرة الطبية، يرجى مراجعة وإبلاغ الطبيب المختص أو الصيدلي بذلك حالا.

ما هي الإجراءات المضادة التي يجب اتخاذها في حال حدوث تأثيرات المضادة؟

يجب مراجعة الطبيب المعالج للتقرير في الموضوع.
صلاحية الدواء
تاريخ انتهاء صلاحية هذا مطبوع على العبوة المغلفة للدواء وعلى حافة كل مطبوع من شريطة من أجل ضمان سلامة استخدام هذه العبوة بمجرد انتهاء تاريخ صلاحيتها!

تاريخ الإصدار
آذار (مارس) 1997.

رقم التسجيل لبنان - ٢٣٧٠٣

توزيع فارما.لين لبنان بإجازة من مارك، شركة توصية بالاسم. دار مشنات. ألمانيا