

دليل المعلومات المخصّصة للمريض

دياسميريل ١ ملغ، ٢ ملغ، ٣ ملغ، ٤ ملغ، ٦ ملغ غليسيريد

يُرجى قراءة هذا الدليل بالكامل بدقة قبل البدء بتناول هذا الدواء لأنه يحتوي على معلومات هامة بالنسبة إليكم.

إذا كانت لدى المريض الاحتفاظ بهذا الدليل إذ قد يحتاج إلى قراءته مرة أخرى .
- إذا كانت لدى المريض أي أسئلة إضافية، ينبغي عليه إستشارةالطبيب أو الصيدلي .
- تم وصف هذا الدواء للمريض، لذا عليه ألا يصفه للآخرين لأنه قد يؤذيهم حتى وإن كانوا يعانون من الأعراض عينها التي يعاني منها.
- في حال أصيب المريض بأي آثار جانبية، يُرجى إستشارة الطبيب أو الصيدلي بها ويشمل ذلك أي آثار جانبية لم تُذكر في هذا الدليل.

في هذا الدليل:

١- ما هي أقراص ديامريل وما هي استعمالاتها.

٢- ما تحتاج الي معرفته قبل تناول أقراص ديامريل.

٣- كيفية تناول أقراص ديامريل.

٤- الأعراض الجانبية المحتملة.

٥- كيفية تخزين ديامريل.

٦- محتوى هذه العلبة ومعلومات أخرى

١- ما هي أقراص ديامريل وما هي استعمالاتها:

يحتوي ديامريل على غليبيريد يؤخذ بالفم وهو دواء فعال لتخفيف مستوى السكر في الدم. ينتمي هذا الدواء الى مجموعة أدوية لتخفيف مستوى السكر في الدم تدعى سلفونيلوريا. يعمل ديامريل بزيادة كمية الأنسولين الذي يطلقه البنكرياس، علوفاً يخفض الأنسولين مستويات السكر في دمك. يستخدم ديامريل لعلاج نوعاً معيناً من السكري (السكري غير المرتبط بالأنسولين (نوع T) عندما تكون الحمية، التمرين الجسدي وتخفيض الوزن وحده لم يكن كافياً لضبط مستويات السكري في دمك.

٢- ما تحتاج إلى معرفته قبل تناول ديامريل

لا تتناول ديامريل:

- إذا كان لديك حساسية (حساسية شديدة) على: غليمبريد او غيرها من السلفونيلوريا
- أدوية تستخدم لتخفيف مستوى السكر في دمك مثل غليكليتاميد) أو السلفوناميد (أدوية الضخم الجرثومي كالسالفاميثوكسازول) أو أي مكونات أخرى من هذا الدواء (واردة في القسم ٦)

- إذا كان لديك سكري مرتبط بالأنسولين (سكري نوع 1)

- إذا كان لديك حمض كيتوني مرتبط بالسكري (مضاعفات السكري عندما يكون مستوى الاسيد مرتفعاً في جسمك ويمكن ان يكون لديك بعض الاشارات التالية: التعب، الشعور بالاعتلال ، تبول متكرر وتيبس عضلات).

- إذا كنت تعاني من سيات سكري اذا كنت تعاني من مرض حاد في الكلى

- اذا كنت تعاني من مرض حاد في الكبد.

إذا كان الورد أعلاه يطبق عليك لا تتناول هذا الدواء واستشر طبيبك او الصيدلي.

تحذيرات واحتياطات:

استشر طبيبك او الصيدلي قبل تناول ديامريل.

خذ عناية خاصة مع ديامريل:

- إذا كنت في فترة شفاء من إصابة، عملية، التهاب مع حرارة، أو من أي شكل آخر من أشكال الاجهاد، إستشر طبيبك، إذ يمكن ان يكون هناك ضرورة

- إذا كان لديك اضطراباً حاداً في الكبد او الكلى

- إذا كان لدى الهموغلوبين وتصلب خلايا الدم الحمراء (الأنيميا

الأحلائية) يمكن حدوثها عند المرضى الذين يفقدون ال أنزيم الفلوكوز ٦- فوسفات نازع الهيدروجين.

إذا كان هناك أي من هذه تطبق عليك استشر طبيبك او الصيدلي.

الأولاد والراهقين:

المعلومات المتوفرة عن استعمال ديامريل لدى الأشخاص تحت سن الثامنة عشرة محدودة. لذلك لا يُنصح باستعماله لدى هؤلاء المرضى.

إذا كانت لدى المريض أي أسئلة إضافية، ينبغي عليه إستشارةالطبيب أو الصيدلي

- تم وصف هذا الدواء للمريض، لذا عليه ألا يصفه للآخرين لأنه قد يؤذيهم حتى وإن كانوا يعانون من الأعراض عينها التي يعاني منها.
- في حال أصيب المريض بأي آثار جانبية، يُرجى إستشارة الطبيب أو الصيدلي بها ويشمل ذلك أي آثار جانبية لم تُذكر في هذا الدليل.

• عوامل يمكن ان تزيد من خطر تدني مستوى سكر في الدم:

- سوء التغذية، عدم احترام مواعيد محددة لتناول الوجبات، التخلف او التأخير في وجبة الطعام او في فترة الصيام.

- تغييرات في نظام حياتك

- تناول ديامريل أكثر مما تحتاجه.

- قصور في وظيفة الكلى.

- قصور في وظيفة الكبد.

- إذا كنت تعاني من اضطرابات هرمونية (اضطرابات في الغدد الدرقية، الغدة الخامية او الكشرة الكظر).

- شرب الكحول (خاصة عند حذف الوجبات)

- تناول بعض الأدوية الأخرى (راجع تناول بعض الأدوية الأخرى أدناه).

- إذا زدت من التمرين الجسدي دون ان تأكل ما يكفي او تناولت طعاماً يحتوي من الكربوهيدرات أقل من المعدل الطبيعي.

• تتضمن علامات تدني مستوى سكر في الدم:

- الجوع، الصداع، الغثيان، التقيؤ، الكسل، النعاس، النوم المضطرب، التعمل، عدائية، ضعف في التركيز، يقظة منخفضة وارتكاس، كآبة، الارباك في الكلام واضطرابات في النظر، حديث غير واضح، رجفان، شلل جزئي، انزعاجات حسية، دوار، الشعور بالعجز.

- يمكن ان تحصل كذلك العلامات التالية: تعرق، بشرة لزجة، قلق، تسارع نبض القلب، وضط الدم المرتفع، الخفقان، ألم قوي مفاجيء في الصدر يمكن ان يشع على المناطق المجاورة (الذبحة الصدرية) وعدم الانتظام القلبي).

إذا استمرت مستويات السكر في الدم بالهبوط يمكن ان تعاني من ارتباك هائل (هزيان)، تطور في الاختلاجات، فقدان السيطرة الذاتية، يمكن للتشنج ان يكون ضحلاً وان يطيرض ضربات قلبك، يمكن ان تقع في غيبوبة (يمكن ان تشبه الصورة السريرية لانخفاض الحاد في مستوى السكر في الدم بالسكتة الدماغية):

• علاج تدني مستوى سكر في الدم:

- في معظم الحالات تضمنحل علامات انخفاض السكر في الدم بسرعة عندما تستهلك بعض اشكال لعلاج مثلا مكعبات السكر، عصير حلو، شاي محلى

- عليك بالتالي ان تأخذ معك بعض اشكال السكر (مثلاً مكعبات سكر) تذكر ان المحليات الاصطناعية ليست فعالة. الرجاء إستشارة طبيبك او اذهب الى المستشفى اذا كان تناول السكر لم يساعد او اذا عاودت العوارض.

الاختبارات المخبرية:

يجب الكشف على مستوى السكر في دمك وفي بولك بانتظام. يمكن لطبيبك ان يأخذ فحوصات دم لمراقبة مستويات خلايا دمك ووظيفة الكبد.

أدوية أخرى ودياسميريل:

الرجاء ابلاغ طبيبك او الصيدلي اذا كنت تأخذ الآن او سبق وتناولت مؤخرأ أدوية أخرى، يمكن ان تصف او تقوي من أثر هذا الدواء على مستوى السكر في دمك.

الأنوية التالية يمكن ان تزيد من أثر انخفاض السكر في الدم لدياسميريل. يمكن ان يؤدي ذلك الي خطرالهيبوغلايسيميا (انخفاض السكر في الدم):

- منتجات دوائية أخرى لمعالجة مرض السكر في الدم (كالانسولين او متفورمين)

- منتجات دوائية أخرى لعلاج الخمج، السل (ريفامبين)

- منتجات دوائية لعلاج الانخفاض الحاد في مستويات السكر بالدم (غلوكاغون)

- منتجات الدوائية التالية يمكن ان تزيد او تخفض من تأثير انخفاض السكر بالدم لدياسميريل:

- منتجات دوائية تعالج قرحة المعدة (المسماة مضادات T)

- منتجات دوائية لمعالجة ضغط الدم المرتفع او هبوط في القلب كمحصر بيتا، كلونيدين، غابنيتيديد ورسبرين. يمكن لهذه الأدوية ان تخفي علامات

الهيبوغلايسيميا، لذا يتطلب العناية الخاصة عند تناول هذه الادوية.

يمكن لدياسميريل اما ان يزيد او يضعف من تأثير الادوية التالية:

- منتجات دوائية تمنع الجلطة الدموية (مشتقات كومانين كالوارفارين)

-دياسميريل مع المائل والكحول والمشروبات والكحول

يمكن ان يزيد تناول الكحول او يخفض من عمل دياميريل بالنسبة لانخفاض السكر في الدم بطريقة غير متوقعة

الحمل والرضاعة:

- منتجات دوائية تخفض من ارتفاع الكولسترول (الياف)

- منتجات دوائية تخفض من ارتفاع ضغط الدم (موانع الشريان الثباتي الخارجي)

- منتجات دوائية يطلق عليها عناصر مضادة غير انتظامية تستعمل لضبط

ضربات القلب غير الطبيعية (ديازوراميد)

- منتجات دوائية لعلاج التقرس (البيورينول، بروبنيسيد، سلفنبرازون)

- منتجات دوائية لعلاج السرطان (سيكلوفوسفاميد، ايفوسفاميد، تروفوسفاميد)

- منتجات دوائية تستخدم لتخفيض الوزن (فنفلورامين).

- منتجات دوائية لزيادة الدورة الدموية عندما تغطي بجرعة عالية متسرية بالوريد (بنتوكسيلان)

- منتجات دوائية لعلاج حساسيات الانف كحمى القش (تريثوكالين)

- منتجات دوائية يطلق عليها سببا توليتكس (مضادة للودية) لعلاج عوارض

ضغط الدم المرتفع، هبوط القلب و البروستات.

الأدوية التالية يمكن ان تزيد السكر في الدم مخففة من تأثير دياميريل.

يمكن ان يؤدي ذلك الي خطر الهيبوغلايسيميا (مستوى عال للسكر في الدم):

- منتجات دوائية تحتوي على هرمونات أنثوية (أستروجين، بروجستوجين)

- منتجات دوائية تدعم ادرا البول (ثيازيد لا درار البول)

- منتجات دوائية تستخدم لبنته الغدة الدرقية (مثل ليفوثيروكسين).

- منتجات دوائية لعلاج الحساسيات والتهابات (غلوكوكورتيكويد).

- منتجات دوائية لعلاج الاضطرابات العقلية الحادة (كلوروبرومازين وغيرها من المحلحات الفينوثيازين).

- منتجات دوائية تستخدم لرفع ضربة القلب، لعلاج الربو، احتقان الجيوب

الأنفية، السعال والزكام، تستخدم لتخفيف الوزن، لحالات الطوارئ المعهدة للحية (دريثالين ومقلدات الودي).

- منتجات دوائية لعلاج مستوى الكولسترول المرتفع (حاصض النيكوتينيك).

- منتجات دوائية لعلاج نوبات الصرع (فنتيتين)

- منتجات دوائية لعلاج العصبية ومشاكل في النوم (باربيتورات-أدوية مسكنة)

- منتجات دوائية لعلاج الضغط المتزايد في العين (ايتازولاميد)

- منتجات دوائية لعلاج ضغط الدم المرتفع او انخفاض السكر في الدم (ديازوكسيد)

- منتجات دوائية لعلاج الخمج، السل (ريفامبين)

- منتجات دوائية لعلاج الانخفاض الحاد في مستويات السكر بالدم (غلوكاغون)

- المنتجات الدوائية التالية يمكن ان تزيد او تخفض من تأثير انخفاض السكر بالدم لدياسميريل:

- منتجات دوائية تعالج قرحة المعدة (المسماة مضادات T)

- منتجات دوائية لمعالجة ضغط الدم المرتفع او هبوط في القلب كمحصر بيتا، كلونيدين، غابنيتيديد ورسبرين. يمكن لهذه الأدوية ان تخفي علامات

الهيبوغلايسيميا، لذا يتطلب العناية الخاصة عند تناول هذه الادوية.

يمكن لدياسميريل اما ان يزيد او يضعف من تأثير الادوية التالية:

- منتجات دوائية تمنع الجلطة الدموية (مشتقات كومانين كالوارفارين)

-دياسميريل مع المائل والمشروبات والكحول

يمكن ان يزيد تناول الكحول او يخفض من عمل دياميريل بالنسبة لانخفاض السكر في الدم بطريقة غير متوقعة

الحمل والرضاعة:

- منتجات دوائية تخفض من ارتفاع الكولسترول (الياف)

- منتجات دوائية تخفض من ارتفاع ضغط الدم (موانع الشريان الثباتي الخارجي)

- منتجات دوائية يطلق عليها عناصر مضادة غير انتظامية تستعمل لضبط

ضربات القلب غير الطبيعية (ديازوراميد)

- منتجات دوائية لعلاج التقرس (البيورينول، بروبنيسيد، سلفنبرازون)

- منتجات دوائية يطلق عليها سببا توليتكس (مضادة للذبحة الصدرية) لعلاج عوارض

ضغط الدم المرتفع، هبوط القلب و البروستات.

الأدوية التالية يمكن ان تزيد السكر في الدم مخففة من تأثير دياميريل.

يمكن ان يؤدي ذلك الي خطر الهيبوغلايسيميا (مستوى عال للسكر في الدم):

- منتجات دوائية تحتوي على هرمونات أنثوية (أستروجين، بروجستوجين)

- منتجات دوائية تدعم ادرا البول (ثيازيد لا درار البول)

- منتجات دوائية تستخدم لبنته الغدة الدرقية (مثل ليفوثيروكسين).

- منتجات دوائية لعلاج الحساسيات والتهابات (غلوكوكورتيكويد).

- منتجات دوائية لعلاج الاضطرابات العقلية الحادة (كلوروبرومازين وغيرها من المحلحات الفينوثيازين).

- منتجات دوائية تستخدم لرفع ضربة القلب، لعلاج الربو، احتقان الجيوب

الأنفية، السعال والزكام، تستخدم لتخفيف الوزن، لحالات الطوارئ المعهدة للحية (دريثالين ومقلدات الودي).

- منتجات دوائية لعلاج مستوى الكولسترول المرتفع (حاصض النيكوتينيك).

- ابلع الاقراص كاملة في لا اقل من نصف كوب ماء. لا تهرس او تمكك الاقراص.

تكون جرعة دياميريل بحسب حاجاتك، وضع نتائج فحوصات السكر في الدم والبول. يحدد ذلك طبيبك، لا تأخذ اقراص أكثر ممّا وصفه لك طبيبك.

- جرعة البداية المعتادة هي قرص واحد من دياميريل ١ ملغ مرّة في اليوم

- إذا كان ذلك ضرورياً يمكن لطبيبك زيادة الجرعة بعد اسبوع او اسبوعين من العلاج

- الجرعة القصوى المعتمدة هي ٦ ملغ دياميريل يومياً

- يمكن المباشرة بعلاج خليط الغليمبريد زائد متفورمين او غليمبريد زائد انسولين.

في هذه الحال يحدد طبيبك الجرعات المناسبة من غليمبريد، متفورمين او الانسولين المتصل بك وحدهك.

- إذا فقّر وزنك او اذا غيرت من نمط حياتك، او كنت في وضع مكتئب هذا يمكن ان يتطلب تغيير جرعات دياميريل، بلغ طبيبك.

- إذا شمרת ان تأثير دواتك ضعيف جداً او قوي جداً لا تغير الجرعة بنفسك بل اسأل طبيبك.

اذا أخذت دياميريل أكثر ممّا هو متوجّب:

إذا حدث وأخذت الكثير من الدياميريل او جرعة اضافية هناك خطر الهايپوغلايسيميا (علامات الهايپوغلايسيميا أنظر القسم ٢- خذ عناية خاصة مع دياميريل). وبالتالى عليك فوراً ان تستهلك كمية كافية من السكر (أي لوح صغير او مكعبات سكر، عصير حلو، شاي محلى) وإستشارة الطبيب فوراً.

عند علاج الهايپوغلايسيميا بسبب تناوله عن طريق الخطأ من قبل الأولاد، ان كمية السكر المعطاة يجب مراقبتها بعناية لتفادي امكانية الهايبرغلايسيميا

خطرة. يجب عدم اعطاء الأشخاص في حاله اللاوعي المأكّل والمشرب.

حيث ان يتم الاشراف على المريض بعناية حتى يزول الخطر عنه. يمكن ان يكون هناك ضرورة لدخول المستشفى، ذلك كتدبير وقائي. اطلع الطبيب على

الغلاف او الأقراص البقية، وهكذا يعلم الطبيب ماذا أخذ منه.

هناك حالات حادة من الهايپوغلايسيميا يصاحبها فقدان الوعي وهبوط حاد في الجهاز الهضمي، تكون حالات طبية طارئة تتطلب علاج طبي فوري ودخول

مستشفى. يجب التأكد ان يكون هناك دائماً شخصاً على علم مسبق باسماطته ندوة الطبيب في الحالة الطارئة.

١.اذا سيجب تناول دياميريل

لا تتناول جرعة مزدوجة (قرصان مرّة واحدة) لتستعص عن جرعة نسيئها.

اذا انقطعت او توقفت عن العلاج عليك ان تكون على علم بان تأخير انخفاض

السكر في الدم المرغوب فيه لم ينجز أو أن المرض سيتفاقم مجدداً. اذا كان لديك اسئلة أخرى حول استخدام هذا الدواء إستشر طبيبك او الصيدلي.

٤. الأعراض الجانبية المحتملة:

مثل كافة الأدوية، هذا الدواء يمكن ان يتسبب بأعراض جانبية، مع ذلك فهي لا تحدث للجميع.

٣. كيف تتناول دياميريل:

تتناول دائماً هذا الدواء تماماً كما قال لك طبيبك. إستشر طبيبك اذا لم تكن متأكد.

تتناول هذا الدواء:

- تناول هذا الدواء بالفم، قبل او مع الوجبة الاولى الرئيسية في اليوم (عادة الفطور). اذا كنت لا تتناول فطوراً صباحياً عليك تناول المنتج بالتسلسل كما

وصفه لك طبيبك. من المفيد جداً عدم ترك اى وجبة عندما تعالج دياميريل.

- ابلع الاقراص كاملة في لا اقل من نصف كوب ماء. لا تهرس او تمكك الاقراص.
تكون جرعة دياميريل بحسب حاجاتك، وضع نتائج فحوصات السكر في الدم والبول. يحدد ذلك طبيبك، لا تأخذ اقراص أكثر ممّا وصفه لك طبيبك.

- وظيفة غير طبيعية للكبد بما فيه اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)

- إذا كان ذلك ضرورياً يمكن لطبيبك زيادة الجرعة بعد اسبوع او اسبوعين من العلاج

- الهايپوغلايسيميا حادة بما فيه فقدان الوعي (الغيبوبة)، النوبات او السبات (راجع القسم ٢)

أعراض جانبية أخرى لدياسميريل تتضمن:

نادر:

- زيادة في عدد خلايا الدم: لويحات الدم (التي تزيد من خطر النزف او الكدمات). خلايا الدم الأبيض (التي غالباً ما تتسبب بالالتهابات) الخلايا الحمر

(يمكن ان تجعل الجلد شاحباً بالصفو او انقطاع النفس).

كل هذه المشاكل تصبح بصورة عامة

بعد توقفك عن تناول دياميريل

تشرع بالغثيان، الاسهال، تشعر بالانتفاخ او التخمّة والم البطن

- نقص في مستوى كمية الصوديوم في دمك (يظهر بفحوصات الدم)

مجهول:

يمكن ان يحصل لك مشاكل في نظرك عندما تبدأ علاجك دياميريل. هذا بسبب التغيرات في مستويات السكر في الدم ويجب ان يتحسن قريباً لَلتّزايد

الانزعاجات في الكبد.

احفظ هذا الدواء بعيداً عن متناول ونظر الأطفال.

- لا تستعمل هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المبين على النقطه والغلاف الخارجي.

يشير تاريخ انتهاء الصلاحية الى اليوم الأخير من هذا الشهر.

- احفظه تحت ٣٠ درجة مئوية.

- تخزين في العلبة الأصلية من أجل حماية من الرطوبة

- لا تستعمل دياميريل اذا كان توقيبه متضرراً.

- لا تزم أي أدوية عبر المياة المتبدلة. إستشر الصيدلي الذي تتعامل معه

كيفية التخلص بعيداً من الأدوية التي لم تعد تستعملها. تساعد هذه التدابير على حماية البيئة.

٦. محتوى العلبة ومعلومات أخرى:

ما الذي تحتويه أقراص دياميريل

المادة النشطة في دياميريل هي غليمبريد

- دياميريل ١ ملغ يحتوي كل قرص على ١ ملغ غليمبريد

- دياميريل ٢ ملغ يحتوي كل قرص على ٢ ملغ غليمبريد

- دياميريل ٣ ملغ يحتوي كل قرص على ٣ ملغ غليمبريد

- دياميريل ٤ ملغ يحتوي كل قرص على ٤ ملغ غليمبريد

- دياميريل ٦ ملغ يحتوي كل قرص على ٦ ملغ غليمبريد

المكونات الأخرى هي: ميكروكريستالين سيلوز ، لاکتوز مونوهيدرات، المغنزيوم سترات، صوديوم ستارش جليكولات و بوفيدون.

كيف يبدو شكل أقراص دياميريل ومحتويات العلبة:

دياسميريل ٢ ، ٣، ٤ و ٦ ملغ أقراص بيضاء مستديرة محززة الى اثنين من جهة

واحدة دياميريل ١ ملغ أقراص بيضاء مستديرة

- دياميريل ١ ملغ عليه ٣ قرصاً

- دياميريل ٢ ملغ عليه ٣٠ قرصاً

- دياميريل ٣ ملغ عليه ٣٠ قرصاً

- دياميريل ٤ ملغ عليه ٣٠ قرصاً

- دياميريل ٦ ملغ عليه ٣٠ قرصاً

المرخص لها بالتسويق والمصنّع:

فارمالين ش.م-ل لبنان

ص.ب: ٩٠٢٠١ جديلة-المن- لبنان

اتصلوا بنا: phamaline@mailagroup.com

رقم تسجيل أقراص دياميريل ١ ملغ في لبنان: ٢٠١٤٨٢٢٠

رقم تسجيل أقراص دياميريل ٢ ملغ في لبنان: ٢٠١٤٨٢٢١

رقم تسجيل أقراص دياميريل ٣ ملغ في لبنان: ٢٠١٤٨٢٢٢

رقم تسجيل أقراص دياميريل ٤ ملغ في لبنان: ٢٠١٤٨٢٢٣

رقم تسجيل أقراص دياميريل ٦ ملغ في لبنان: ٠١٦٨١١٩