

Spasfon-Lyoc®

phloroglucinol

IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

Dénomination :

SPASFON-LYOC® 80 mg, lyophilisat oral.

Composition qualitative et quantitative :

Phloroglucinol hydraté 80,00 mg
quantité correspondant en phloroglucinol
anhydre à 62,25 mg
Excipients : dextran 70, mannitol pour un lyophilisat oral.

Forme pharmaceutique :

Lyophilisat oral - boîte de 10.

Classe pharmaco-thérapeutique :

ANTISPASMODIQUE MUSCULOTROPE

(A : Appareil digestif et métabolisme)

(G : Système génito-urinaire).

Nom et adresse de l'exploitant et du fabricant :

Laboratoire L. LAFON - 19, avenue du Professeur Cadiot - B.P. 22 - 94701 MAISONS-ALFORT (FRANCE).

DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

(Indications thérapeutiques)

Ce médicament est indiqué dans le traitement des douleurs spastiques de l'intestin, des voies biliaires, de la vessie et de l'utérus.

ATTENTION !

Dans quel cas ne pas utiliser ce médicament : (Contre-indications)

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ EN CAS D'ALLERGIE À L'UN DES COMPOSANTS.

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi :

EN CAS DE DOUCE NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions médicamenteuses et autres interactions :

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse - Allaitement :

L'utilisation de ce médicament ne doit être envisagée au cours de la grossesse que si nécessaire.
L'administration de ce médicament est déconseillée

chez la femme qui allaite.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSEUR OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

Posologie :

Chez l'adulte : la posologie usuelle est de 2 lyophilisats oraux, à prendre au moment de la crise, à renouveler en cas de spasmes importants.

Chez l'enfant : 1 lyophilisat oral 2 fois par jour.

Mode et voie d'administration :

Voie orale.

Chez l'adulte : les lyophilisats oraux sont à dissoudre dans un verre d'eau ou à laisser fondre sous la langue pour obtenir un effet rapide.

Chez l'enfant : les lyophilisats oraux sont à dissoudre dans un verre d'eau.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÉNANTS

(Effets indésirables)

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÉNANTS :

- quelques très rares réactions cutanées allergiques. En raison de la présence de mannitol, risque de troubles digestifs et de diarrhée.

SIGNALEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÉNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

Précautions particulières de conservation :

Ce médicament doit être conservé à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE

Octobre 1996.

Le Laboratoire L. Lafon participe à CYCLAMED, association chargée de la collecte et de l'élimination des déchets issus de médicaments. Il vous demande en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament vide ou non.

