

Spasfon®

phloroglucinol

IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

Dénomination :

SPASFON®, suppositoire.

Composition qualitative et quantitative :

Phloroglucinol hydraté	150,00 mg
quantité correspondant en phloroglucinol anhydre à	116,70 mg
Triméthylphloroglucinol	150,00 mg
Excipients : glycérides hémisynthétiques solides q.s. pour un suppositoire.	

Forme pharmaceutique :

Suppositoire - boîte de 10.

Classe pharmaco-thérapeutique :

ANTISPASMODIQUE MUSCULOTROPE
(A : Appareil digestif et métabolisme)
(G : Système génito-urinaire)

Nom et adresse de l'exploitant et du fabricant :

Laboratoire L. LAFON - 19, avenue du Professeur Cadiot B.P. 22 - 94701 MAISONS-ALFORT (FRANCE).

DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

(Indications thérapeutiques)

Ce médicament est indiqué dans le traitement des douleurs spastiques de l'intestin, des voies biliaires, de la vessie et de l'utérus.

ATTENTION !

Dans quel cas ne pas utiliser ce médicament : (Contre-indications)

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ en cas d'allergie à l'un des composants.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi :

EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions médicamenteuses et autres interactions :

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse - Allaitement :

L'utilisation de ce médicament ne doit être envisagée au cours de la grossesse que si nécessaire. L'administration de ce médicament est déconseillée chez la femme qui allaité.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

Posologie :

3 suppositoires par jour.

Mode et voie d'administration :

Voie rectale.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS

(Effets indésirables)

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS :

- quelques très rares réactions cutanées allergiques. SIGNALEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

Précautions particulières de conservation :

Ce médicament doit être conservé à l'abri de la chaleur.

DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE

Octobre 1996.



Le Laboratoire L. Lafon participe à CYCLAMED, association chargée de la collecte et de l'élimination des déchets issus de médicaments. Il vous demande en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament vide ou non.