

إيرتال 100 مغ

أقراص مغلفة

أسيكلوفيناك

جرعة الدواء وطريقة التعاطي
الكبار: 200 مغ على مرتبة كل مرتبة 100 مغ، قرص في الصباح قرص آخر في الليل.

الأطفال: لا توجد معلومات سريري حول استعمال أيرتال بالنسبة للأطفال ولهذا لا يُنصح باستعماله بين هذه الفئات.

المقيمين في السن: على طبيك أن يقرر العبرة ويجب أن يقوم بمراجعة دورية.

اضطرابات في الكلى أو في القلب: على طبيك أن يقرر العبرة التي يجب أن تأخذها ويجب أن يقوم بمراجعة دورية.

فشل الكبد: في حالات المرض الصابين باضطرابات في الكبد يجب أن تُنخفض جرعة أيرتال إلى 100 مغ/يوم.

تعليمات للاستعمال السليم للمركب
يجب تعاطي الجبوب عن طريق الفم مع كمية كافية من السائل.
يمكن أن تؤخذ إلى جانب أغذية، درجة امتصاص الأسيكلوفيناك غير قابلة للتغير.

جرعة زائدة
لا توجد معلومات حول نتائج العبرة الزائدة من أيرتال في حالة البشر. في حالة تعاطيها عرضياً بشكل كبير يجب تقدير قدر المكمل امتصاص العقار وذلك بواسطة غسيل المعدة والمعالجة بالكاربون النشط.
وعلى أساس الأعراض ستم محاولة التهاب المعدة والأمعاء والفشل الكلوي وتشنج الجهاز التنفسي واضطرابات التنفس والتشنجات.

ردود فعل سلبية
أيرتال مثله مثل كافة الأدوية يمكن أن تكون له آثار سلبية وإن لم يعانيها كل الأشخاص، التقافية ذات تأثير خفيف وخفيف عند ترك تعاطي الدواء.
الآثار الجانبية التي يمكن أن تظهر مع أيرتال عبارة عن:

متعددة (تصيب ما بين 1 إلى 10 من كل 100 مريض).
• ألم معدة، ألم في منطقة البطن، غثيان و嘔吐.
• الآثار الجانبية الأكثر انتشاراً التي تحدث مع تناول أدوية مثل أيرتال (NSAIDs) تتعلق بالجهاز الهضمي: قرحة، تقويم (تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات)، خاصة في حالة المتقدين في العمر.
• دوار.
• إنزعاجات كبدية عالية.

قليلة الحدوث (تصيب ما بين 1 إلى 10 من كل 1000 مريض).
• غازات، إنتفاخ المعدة، إمساك، تقيؤ وقرحات في الفم.
• حرقة، بزازات في الجلد وإنتفاخ جلدي.
• ارتفاع البويراء، ارتفاع الكرياتين.

نادرة للغاية (تصيب أقل من 1 من بين 10 ألف مريض).
• التهاب الشفاه المخاطي للفم، وزينيف المعدة والأمعاء، والتهاب البنكرياس، وانتفاخ الأمعاء.
• كما لوحظ تفاقم التهاب القولون التقرحي ومرض كرون.
• يقع بنسجية على الجلد، وتفاولات حادة بالجلد.

أدوية مثل أيرتال يمكن أن يصاحبها حالات نادرة للغاية تفاعلات فاعية حادة جدًا مثل مرض سنتسون جونسون وإنفال البرثة التخري السام. قلبية (احتشاء عضلة القلب) أو سكتة دماغية.
• فقر الدم.
• آثار حادة نتيجة للحساسية، حساسيات.
• اضطرابات في الرؤوبة.
• صعوبة في التنفس.

نادرة للغاية (تصيب أقل من 1 من بين 10 ألف مريض).
• التهاب الشفاه المخاطي للفم، وزينيف المعدة والأمعاء، والتهاب البنكرياس، وانتفاخ الأمعاء.
• كما لوحظ تفاقم التهاب القولون التقرحي ومرض كرون.
• يقع بنسجية على الجلد، وتفاولات حادة بالجلد.

أدوية مثل أيرتال يمكن أن يصاحبها حالات حمى مرتفعة أو تورم وحساسية في الجلد والعينين، وفي بعض الحالات حتى مرتفعة توفر كبار السن. إذا حدثت أعراض مثل: اضطراب لون الجلد أو العينين، فتوقف عن تعاطي الدواء وأغير الطبيب في الحال.
• نقص في كرات الدم البيضاء، انتفاخ الصفائح، انتفاخ في النخاع العصبي، فقر دم.
• زيادة في البوتاسيوم في الدم.

حالات اكتئاب، إضراب في النوم، صعوبة التوم، تتميل، نعاس، ألم في الرأس، اضطرابات في المذاق، رعشة.
• دوار.
• صفير في التنفس وتشنجات تنفسية.
• تشنجات في الساقين.

اضطراب في وظيفة الكلى، (احتلال كلوبي متلازمة) اضطراب كلوبي.
• إرهاق، احتباس سوائل (وذمة).
• ارتفاع في الغلوتامات القلوبي، زيادة الوزن.
• إذا اعتبرت أن أحد الآثار الجانبية التي تعانيها شديدة أو إذا ظهر أن تأثير جانبي غير مشار إليه في هذه النشرة، فأخير طبيك أو صيدليك.

انتهاء مدة الصلاحية.
لا يجب استعمال هذا الدواء بعد تارikh انتهاء الصلاحية المشار إليه في العبوة.

شروط الحفظ
يحفظ في درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية.
في النشرة الإنجليزية والغربية فقط:
هذا دواء

إن هذا الدواء مستحضر يؤثر على صحتك وإسهاماته خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.

اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المتصوص عليها وتعليمات الصيدلي التي صرحت لك.

فالطبيب والصيدلي هما الخبران الدارو وبنفعه وضرره.

لا ينفع مدة العلاج المحددة لك من ثلاثة أيام.
لا تكرر مرف الدواء دون وصفة طبية.
لا ترك الأدوية فيتناول أيدي الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب
وأعاد الصيادة العرب.

بيان بوصفة طبيب.
يجب أن تكون الأدوية بعيدة عن متناول ورؤية الأطفال.

الصانع
الميرال للصناعات الدولية، شركة مساهمة
سرا، ناسوبلو 2، الكيلومتر 593
08740، سانت اندره دو بارك - برشلونة (إسبانيا)

حامل التصريح للتسويق
الميرال، شركة مساهمة،
جزرال هيت، 151
08022 برشلونة (إسبانيا)

Almirall, S.A.
General Mitre, 151
08022 - Barcelona (Spain)

تاريخ مراجعة النص: يناير 2010.

تأثير على القدرة على القيادة

إذا كنت تعاني من حالات وهن، دور أو أي غيرها من اضطرابات الجهاز العصبي المركزي، فلا تقدم على القيادة ولا استخدام آية عدة أو مكائن خطيرة وأنت تعاطي أيرتال.

الاستعمال في حالة كبار السن

عليكم أن تتوطوا العذر في معالجة المرضى المتقدين في العمر، فهو يصفة عامة أكثر عرضة للأثار الغير مرغوب فيها ولديهم احتمالات أكبر للتعرض لاضطرابات القلب والأوعية الدموية ووظيفة الكلى أو الكبد وكذلك تلف الأدوية لها في نفس الوقت.

تضاعف أو الصيدلي إذا كنت تعاطي أو تعاطيت في الفترة الأخيرة أدوية أخرى، بما في ذلك التي اشتريتها دون وصفة طبيب.

هناك أدوية يمكن أن تتفاعل مع أيرتال. في هذه الحالات قد يصبح من الضروري تغيير العبرة أو وقف العلاج بأحد الأدوية.

هذا الأمر ذو أهمية خاصة في حالة تعاطي الليثيوم، ديموكсин، مدر للبول.

مضاد للحساسيات، مضادات التخثر، مضادات التصاق الصفائح، هيبوغلسيميدين، ميلوتوكسان، الكورتيزون، الأسيرين أو عقاقير أخرى لهذا المرض.

استرودية ومضادة للإلتهاب، السيلوكوبورين، ميفوروبيرتون، تاكروليموس أو زيدوفودين.

حالات تناول لا وجود لها بعد.

80003966

Almirall