

برازولان ١٠ ملغ - أقراص معوية التغليف**راديبرازول الصوديوم**

اقرأ هذه النشرة كاملة بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة.

- احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج إلى قرأتها مرة أخرى.

- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، ينفي عليك طرحها على الطبيب أو الصيدلي.

- هذا الدواء قد تم وصفه لك فلا تقم بوصفه للأخرين، فإنه قد يلحق الضرر بهم حتى لو كان لديهم نفس الأمراض التي تعاني منها.

- إذا أصبتي بأي من الآثار الجانبية أو إذا لاحظت أي آثار جانبية ليست مدرجة في هذه النشرة، يرجى إبلاغ الطبيب أو الصيدلي في هذه النشرة.

١. ما هو برازولان وما هي دواعي استعماله.

يحتوي برازولان على مادة فعالة هي راديبرازول الصوديوم، هذه المادة تنتهي إلى مجموعة من الأدوية تدعى مثبطات مضخة البروتون. تعمل عن طريق تخفيض كمية الحمض الذي تتجه المعدة.

ستستخدم أقراص برازولان لمعالجة الحالات التالية:

- داء الجزء المعدي المريئي، والذي يمكن أن يتضمن حرقة معدة يحدث هذا الداء عندما يرتجع الحمض والطعام إلى الأنوب الهضمي (المريء).

- فرشادات المعدة أو القسم العلوي من الأمعاء، إذا أصبتي بهذه الترشحات بجرثومة تدعى الملوية البوابية، تفسو بتجنب إعطاء مضاد حيوي.

إن استخدام أقراص برازولان ومضاد حيوي معًا سيسقط على الالتهاب الجرثومي ويؤدي إلى شفاء القرحة، هي أيضاً تمنع من تكرار حدوث الالتهاب الجرثومي والقرحة.

- متلازمة زولينجـرـإيليسون حيث تتفاقم المعدة كمية كبيرة من الحمض.

٢. ماذا يجب أن تعلم قبل أن تتناول برازولان

لا تأخذ برازولان:

- إذا كنت تعاني من الحساسية من راديبرازول الصوديوم، أو من أي من المكونات الأخرى للبرازولان (المبينة في الفقرة ٦).

- في حالة الحمل أو التخطيط للحمل.

- في فترة الإرضاع.

يجب عدم تناول برازولان إذا تطابق أي من الوارد أعلاه مع حالتك. في حال عدم التأكد يستشر الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال الدواء.

راجح أيضًا فقرة الحمل والإرضاع

المحاذير والاحتياطات:

يجب إستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

يجب أخذ الحذر في حال:

- كان لديك حساسية من مثبطات مضخة بروتون أخرى أو بديل البنزimidازول.

- ظهرت إضطرابات كبدية أو دموية عند بعض المرضى وتحسن وضعهم بعد إيقاف برازولان.

- كنت تعاني من سرطان في المعدة.

- كنت مصاباً بشكل كبدية.

- كنت تتناول اناناسافير للمعالجة في المخزون أو عوامل مشجعة لانخفاض إلستريلين فيروس الإيدز.

- إذا كان لديك نقص في المخزون أو عوامل مشجعة لانخفاض إلستريلين فيفيتامين ٦.

الصوديوم إلى تقليل الشخص قد محدد (كمومغرابين ١).

- إذا أصبتي بانخفاض لفظي جلدي، خاصة في المناطق المعرضة للبروتون، أخبر طبيبك بسرعه ما يمكن، إذ قد تحتاج إلى إيقاف العلاج ببرازولان. تذكر أيضًا ذكر أي آثار سيئة أخرى مثل الألم في مفاصلك.

- إذا أصبتي بانخفاض لفظي جلدي، مما ذكر أعلاه بطيء مع حالتك، في حال عدم التأكد يستشر الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام برازولان.

إذا لاحظت إسهال (مائي أو دموي) شديد مع اعراض مثل الحرارة، ألم بطني، يجب إيقاف برازولان واستشارة الطبيب على وجه السرعة.

إن تناول مثبط مضخة بروتون مثل برازولان، خاصة لفترة أكثر من سنة واحدة، يمكن أن يزيد خطر التعرض لكسور في الورك، المفصل أو العمود الفقري.

أخبر طبيبك إذا كان لديك مرض ترقق العظام أو إذا كنت تأخذ ستيرويدات التشربية (والتي يمكن أن تزيد من خطر اصابتك بمرض ترقق العظام).

الأطفال

يجب عدم استخدام هذا الدواء عند الأطفال.

برازولان والأدوية الأخرى

الرجاء إطلاع الطبيب أو الصيدلي في حال كنت تتناول، تناولت حديثًا أو يمكن أن تتناول أدوية أخرى.

هذا يشمل أيضًا الأدوية التي تم الحصول عليها دون وصفة طبية، بما في ذلك الأدوية المشببة.

يشكل حاصل، استشر الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول أي من الأدوية التالية:

- كينتوكونازول أو إيتراكونازول - الذي يستخدم لعلاجالتهابات تسببتها الفطريات.

- أنازانافير - الذي يستخدم لعلاج الحساسية بالإيدز. برازولان يمكن أن يخفض نسبة هذا الدواء في الدم ولذلك يجب عدم تناولهما معاً.

- ميثوتريكتينات - علاج كيميائي يستخدم بجرعات عالية لملاجء السرطان - إذا كنت تتناول جرعة عالية من الميثوتريكتينات، فقد يوقف طبيبك العلاج ببرازولان مؤقتاً.

إذا كنت غير متأكد من مطابقة ما ذكر أعلاه مع حالتك، استشر الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال برازولان.

الحمل والأرضاع

- يجب عدم تناول برازولان في حالة الحمل أو التخطيط للحمل.

- يجب عدم تناول برازولان في حالة الإرضاع أو التخطيط للإرضاع.

استشر الطبيب أو الصيدلي لأخذ النصيحة قبل تناول أي دواء خلال فترة الحمل أو الإرضاع.

القيادة وتشغيل الماكينات

يمكن أن تشعر بالغiddiness خلال استعمال برازولان. إذا لاحظت ذلك، يجب عدم القيادة أو تشغيل الماكينات.

٣. كشف تناول برازولان

تناول هذا الدواء يجب إرشادات الطبيب تماماً. في حال عدم التأكد، يجب مراجعة الطبيب أو الصيدلي.

كيفية تناول هذا الدواء

- يجب نزع الحبة عندما ي Shirley عندما يحين تناول الدواء فقط.

- يجب بلع الحبة كاملاً مع كوب من الماء.

- إن الطبيب هو الذي يحدد عدد الأقراص الذي يجب تناولها وفترة العلاج. وهذا يعتمد على حالتك.

- إذا كنت تتناول هذا الدواء لفترة طويلة، فذلك يستدعي المراقبة من الطبيب.

الكبار والبالغين

لادة الجزء المعدي المريئي

ملاجحة الأعراض المتسرعة والشديدة (حالة عرضية) الجرعة العادلة هي حبة برازولان ١٠ ملغ مرة يومياً لمدة ٤ أسابيع.

تناول الحبة عند الصباح قبل الأكل، إذا تكررت الحالة بعد ٤ أسابيع من العلاج، يمكن أن ينصح بتناول حبة برازولان ١٠ ملغ عند اللزوم.

ملاجحة الأعراض الأكثر شدة (حالة تأكل أو فقر) الجرعة العادلة هي حبة برازولان ٢٠ ملغ مرة يومياً لمدة ٤ أسابيع.

تناول الحبة عند الصباح قبل الأكل.

يجب للطبيب أن ينصحك بتناول برازولان لمدة ٤ أسابيع أخرى إذا لم تحسن حالتك.

لقرحة المعدة (قرحة هضمية)

الجرعة العادلة هي حبة برازولان ٢٠ ملغ مرة يومياً لمدة ٦ أسابيع.

تناول الحبة عند الصباح قبل الأكل.

يمكن للطبيب أن ينصحك بتناول برازولان لمدة ٦ أسابيع أخرى إذا لم تحسن حالتك.

لقرحة الأثنى عشرية (قرحة الأثنى عشرية)

الجرعة العادلة هي حبة برازولان ٢٠ ملغ مرة يومياً لمدة ٦ أسابيع.

تناول الحبة عند الصباح قبل الأكل.

يمكن للطبيب أن ينصحك بتناول برازولان لمدة ٦ أسابيع أخرى إذا لم تحسن حالتك.

الجرعة العادلة هي حبة برازولان ٢٠ ملغ مرة يومياً عند البدء بالعلاج.

يمكن أن يعدل الطبيب الجرعة تبعاً للإحساس بالدواء.

إذا كان العلاج لفترة طويلة فيجب إستشارة الطبيب خلال فترات منتظمة من أجل تقييم الأعراض والجرعة.

الأطفال

يجب عدم إعطاء هذا الدواء للأطفال

المرضى الذين يعانون من مشاكل كبدية

يجب أخذ الحذر عند المرضى الذين يعانون من مشاكل كبدية. يجب إستشارة الطبيب قبل البدء وخلال العلاج ببرازولان.

٤. حال تناول برازولان أكثر من المرة المطلوبة

إذا تناول برازولان أكثر من المرة المطلوبة، يجب إخبار الطبيب أو الذهاب فوراً إلى المستشفى. يجب أخذ علبة الدواء.

في حال تسرب تناول برازولان

إذا نسيت تناول جرعة من الدواء يجب تناولها عندما تذكرها ومن ثم تأخذ الجرعة التالية في موعدها. يجب عدم

تناول جرعة مزدوجة (حيثتان دفعة واحدة) من أجل التوضيح عن الدواء فقط.

إذا نسيت تناول برازولان أكثر عن ٥ أيام، يجب إستشارة الطبيب قبل تناول الدواء.

٥. حال التوقف عن تناول برازولان

سوف تنتهي الأعراض قبل شفاء القرحة بشكل كامل. من الضروري عدم التوقف عن الأقراص حتى يطلب الطبيب ذلك.

إذا كان هناك أي أسئلة أخرى تتعلق باستعمال هذا الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

٤. تأثيرات جانبية محتملة

إن هذه الدواء وجمعي الأدوية يمكن أن يسبب تأثيرات جانبية، بالرغم من أنها لا تصيب جميع الأشخاص.

إن التأثيرات الجانبية عادة خفيفة وتختفي دون المضروبة للتوقف عن تناول هذا الدواء.

يمكن أن تحدث تحسسية يمكن أن يزداد تفاقمها في الحالات التي ينادي إلى الإرغام.

- إصبابات متعددة، مثل احتقان في الحلق أو ارتفاع حرارة، أو تقرحات في الفم أو المخجنة.

- كدمات أو سهولة بالنزيف. (هذه التأثيرات الجانبية نادرة وتصيب أقل من شخص من بين ١٠٠٠ شخص).

تأثيرات جانبية أخرى محتملة

شائعة (تؤثر على أقل من ١ من كل ١٠٠ شخص)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-</div