

**نشرة الدواء : معلومات للمريض**

## بروبيتول ١٠ ملغ أقراص

## بروبيتول ٤٠ ملغ أقراص

بروبر أنولول هيدروكلوريد

**إقرأ هذه النشرة بالكامل بعناية قبل القيام بتناول هذا الدواء حيث أنها تحتوي على معلومات مهمة لك.**

- إحتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج إليها لاحقًا.
- في حال وجود أي تساؤلات لديك، يُفضل استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي.
- لقد وصُف هذا الدواء لك شخصيًا، ولا ينبغي بك أن تعطله لأحد آخر حتى لو ظهرت عليه نفس أعراض مرضك فقد يؤدي ذلك إلى الإضرار به.
- إذا أصبت بأي آثار جانبية غير مذكورة في هذه النشرة، أخبر الطبيب المعالج أو الصيدلي.

**ما الذي تحتويه هذه النشرة**

- ١- ما هو بروبيتول وما هي دواعي استعماله
- ٢- ما الذي يجب عليك معرفته قبل تناول بروبيتول
- ٣- ما هي طريقة تناول بروبيتول
- ٤- الأعراض الجانبية المحتملة
- ٥- طريقة تخزين بروبيتول
- ٦- محتويات العلية ومعلومات إضافية أخرى

**١. ما هو بروبيتول وما هي دواعي استعماله**

يحتوي بروبيتول على المادة الفعالة بروبرإنولول هيدروكلوريد. ينتمي بروبرإنولول هيدروكلوريد إلى مجموعة من الأدوية تُسمى حاصرات مستقبلات بيتا، يتم وصف هذا الدواء لأمراض القلب والدورة الدموية وأجزاء أخرى من الجسم ويستخدم في الحالات التالية:

- لمعالجة ارتفاع ضغط الدم.
- لمعالجة آلام الصدر (الذبحة الصدرية).
- لمعالجة اضطرابات ضربيات القلب (عدم انتظام نظم القلب).
- لحماية القلب بعد التوية القلبية.
- للقاية من الصداع النصفي.
- لمعالجة الرعاش الأساسي (الرعاش مجهول السبب).
- لمعالجة القلق.

- لمعالجة بعض مشاكل الغدة الدرقية (مثل الانسمام الدرقي التاجم عن فرط نشاط الغدة الدرقية).
- لمعالجة ارتفاع ضغط الدم التاجم عن ورم يظهر عادة بالقرب من الكلية (ورم القواتم).
- للقاية من النزيف في المريء التاجم عن ارتفاع ضغط الدم في الكبد.

**٢. ما الذي يجب عليك معرفته قبل تناول بروبيتول**

**لا تتناول بروبيتول :**

- إذا كنت قد عانيت أنت أو أي فرد من أفراد عائلتك من الربو أو صغير الصدر.
- إذا كان لديك حساسية لبروبرإنولول هيدروكلوريد أو لأي من مكونات هذا الدواء الأخرى (المدرجة في القسم ٦).
- إذا كنت قد عانيت سابقًا من أحد أمراض القلب التالية:
- قصور القلب الذي لم تتم معالجته (مما يؤدي إلى ضيق في التنفس وتورم الكاحلين).
- إحصار القلب من الدرجة الثانية أو الثالثة (مرض يمكن معالجته بواسطة جهاز تنظيم ضربيات القلب).
- فقات قلب بطيئة جدًا أو متفاوتة للغاية، انخفاض حاد في ضغط الدم أو ضعف شديد في الدورة الدموية.
- نوع من آلام الصدر (الذبحة الصدرية) يُسمى ذبحة برينزمتال.
- إذا كنت تعاني من ورم يُسمى ورم القواتم الذي لم تتم معالجته. عادة ما يظهر بالقرب من كليتك ويمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم.
- إذا كانت مستويات الأحماض في دمك مرتفعة بشكل غير طبيعي (الحماض الاستقلابي).
- إذا كنت تصوم منذ فترة قريبة.

لا تتناول بروبيتول إذا كانت إحدى الشروط أعلاه تطبق عليك واستشر الطبيب المعالج.

**التحذيرات والإحتياطات**

استشر الطبيب المعالج أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء:

- إذا واجهت ردود فعل تحسسية مثل لدغات الحشرات، من الضروري أن تخبر الطبيب المعالج أنك تتناول بروبيتول قد تكون بحاجة لرد علاج لرد الفعل التحسسي.
- إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية أخرى مثل اضطرابات الدورة الدموية، أمراض القلب، ضيق في التنفس أو تورم الكاحلين.
- إذا كنت تعاني من الذبحة الصدرية غير المستقرة (آلم الصدر الحاد غير التاجم عن التمارين الرياضية)
- إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى، قد تحتاج إلى إجراء بعض الفحوصات أثناء العلاج.
- إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد (مثل تلف الكبد). قد تحتاج إلى إجراء بعض الفحوصات أثناء العلاج.
- إذا كنت تعاني من داء السكري لأن بروبيتول قد يؤثر على مدى استجابتك لانخفاض نسبة السكر في الدم، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل ضربات القلب. قد يسبب بروبيتول انخفاض مستويات السكر في الدم حتى لدى المرضى الذين لا يعانون من داء السكري.
- إذا كنت تعاني من التسمم الدرقي (حالة مرضية ناجمة عن فرط نشاط الغدة الدرقية). قد يحجب هذا الدواء أعراض الانسمام الدرقي.
- إذا لبت متأكدًا مما إذا كانت إحدى الشروط أعلاه تطبق عليك، استشر الطبيب المعالج أو الصيدلي قبل تناول بروبيتول.

**الأدوية الأخرى وبروبيتول**

أبلغ الطبيب المعالج أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا أو قد تتناول أي دواء آخر، خصوصًا إذا كنت تتناول أيًا من الأدوية التالية:

- فيراپاميل
- ديلتيازيم
- نيفيديين
- نيسولدبين
- نيكارديين
- إسرايديين
- لاسيديبين (يُستخدم لمعالجة ارتفاع ضغط الدم أو الذبحة الصدرية)
- ديسويراميد
- ليدوكاين
- كينيدين
- أمبودارون أو بروپافينون (لمعالجة عدم انتظام ضربيات القلب)
- ديجوكسين (لمعالجة قصور القلب)
- أدريثالين (منبه قلبي)
- إيبوبروفين واندوميثاسين (لمعالجة الألم والالتهابات)
- إرغوتامين، شائي الهيدرورأرغوتامين أو ريزانثريتان (لمعالجة الصداع النصفي)
- كلوربرومازين وفوريزادزين (لمعالجة بعض الاضطرابات النفسية)
- سيميتيدين (لمعالجة اضطرابات المعدة)
- ريفامبيسين (لمعالجة السل)
- فيوثيولن (لمعالجة الربو)

وارفازين (لتسليol الدم) وهيدرالازين (لمعالجة ارتفاع ضغط الدم).

إذا كنت تتناول كلونيدين (لمعالجة ارتفاع ضغط الدم أو الصداع النصفي) وبروبيتول في الوقت نفسه، لا يجب أن تتوقف عن تناول الكлонيدين ما لم يطلب منك الطبيب المعالج ذلك، إذا أصبح من الضروري التوقف عن تناول الكلونيدين، سيعطيك الطبيب المعالج تعليمات دقيقة حول كيفية القيام بذلك.

**بروبيتول مع الطعام والشراب**

من الأفضل أن يتم تناول الأقراص قبل وجبات الطعام.

إذا كنت تشرب باستمرار كمية كبيرة من الكحول، أخبر الطبيب المعالج قبل تناول هذا الدواء، وذلك لأن الكحول يمكن أن تؤثر على فعالية هذا الدواء.

**العمليات الجراحية**

إذا ذهبت إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية، أخبر طبيب التخدير أنك تتناول بروبيتول.

**الحمل والرضاعة الطبيعية**

إذا كنت حاملًا أو ترضعين طفلك، أو تعتقدين أنك حاملًا أو تخطلطين لإنجاب طفل، استشيري الطبيب المعالج قبل تناول هذا الدواء.

**القيادة واستخدام الآلات**

من غير المحتمل أن يؤثر هذا الدواء على قدرتك على القيادة أو استخدام أي أدوات أو آلات. ومع ذلك، قد يشعر بعض الناس أحيانًا بالدوار أو التعب عند تناول بروبيتول. إذا واجهت تلك الأعراض، استشر الطبيب المعالج.

**يحتوي بروبيتول على اللاكتوز**

إذا كنت لا تهضم بعض السكريات، اتصل بالطبيب المعالج قبل تناول هذا المنتج الطبي.

**٣. ما هي طريقة تناول بروبيتول**

اتبع بدقة إرشادات الطبيب المعالج عند استخدام هذا الدواء، سيحدد لك الطبيب المعالج عدد الأقراص التي يجب تناولها كل يوم ومتى يجب أن تتناولها. ابتلع أقراص بروبيتول مع كوب من الماء.

**البالغون**

- لارتفاع ضغط الدم: بدايةً تكون الجرعة ٨٠ ملغ مرتين يوميًا، تتراوح الجرعة المعتادة بين ١٦٠ و٢٣٠ ملغ يوميًا.
- لآلام الصدر (الذبحة الصدرية): بدايةً تكون الجرعة ٤٠ ملغ مرتين أو ثلاث مرات يوميًا. عادةً ما يظهر التجاوب كافٍ عند حدود ١٢٠-٢٤٠ ملغ يوميًا.
- اضطرابات ضربيات القلب (عدم انتظام نظم القلب): تتراوح الجرعة المعتادة بين ١٠ و٤٠ ملغ ثلاث أو أربع مرات يوميًا.
- لحماية القلب بعد التوية القلبية: تكون الجرعة المعتادة ١٦٠ ملغ يوميًا.
- الصداع النصفي والرعاش الأساسي: بدايةً تكون الجرعة ٤٠ ملغ مرتين أو ثلاث مرات يوميًا، وعادة ما يظهر التجاوب كافٍ عند حدود ٨٠-١٦٠ ملغ يوميًا.
- للقلق: الجرعة المعتادة هي ٤٠ ملغ مرتين أو ثلاث مرات يوميًا.
- لأمراض الغدة الدرقية (مثل الانسمام الدرقي): تتراوح الجرعة المعتادة بين ١٠ و٤٠ ملغ ثلاث أو أربع مرات يوميًا.
- لاعتلال عضلة القلب الضخامي (تضخم عضلة القلب): تتراوح الجرعة المعتادة بين ٣٠ ملغ و٦٠ ملغ يوميًا.
- لورم القواتم: تتراوح الجرعة المعتادة بين ٣٠ ملغ و٦٠ ملغ في اليوم.
- لنزيف المريء التاجم عن ارتفاع ضغط الدم في الكبد: تتراوح الجرعة المعتادة بين ٨٠ ملغ و١٦٠ ملغ يوميًا.

**الأطفال والمراهقون**

في ظل شروط محددة، يمكن استخدام بروبيتول لمعالجة الأطفال الذين يعانون من هذه الحالات المرضية، يتم تعديل المقدار الدوائي من قبل الطبيب وفقًا لعمر الطفل أو وزنه.

**إذا تناولت بروبيتول بكمية أكبر مما ينبغي عليك**

إن بروبرإنولول شديد السمية إذا تم تناوله بجرعة زائدة. إذا تناولت عن طريق الخطأ جرعة أكبر من الجرعة الموصوفة أو إذا كنت تواجه أعراض الجرعة الزائدة، يجب أن تطلب الرعاية الطبية فورًا.

إذا تناولت عن طريق الخطأ جرعة زائدة من دوائك، اتصل بالطبيب المعالج على الفور أو اذهب إلى قسم الطوارئ في أقرب مستشفى. خذ دائمًا الأقراص المتبقية والعلية والملصق معك لكي يتم التعرف على الدواء.

**إذا نسيت تناول بروبيتول**

إذا نسيت أن تتناول جرعة من هذا الدواء، تناولها عندما تتذكرها ثم تناول الجرعة التالية في وقتها المعتاد. إذا كان قد حان وقت الجرعة التالية، تناول فقط القرص التالي في الوقت المعتاد. لا تتناول جرعة مضاعفة (قرصين في وقت واحد) للتعويض عن الجرعة الفائتة.

**إذا توقفت عن تناول بروبيتول**

لا تتوقف عن تناول بروبيتول من دون استشارة الطبيب المعالج أولًا. في بعض الحالات، قد تضطر إلى التوقف تدريجيًا عن تناول هذا الدواء.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى حول طريقة تناول هذا الدواء، استشر الطبيب المعالج أو الصيدلي.

**٤. الأعراض الجانبية المحتملة**

قد ينتج عن بروبيتول وكذلك باقي الأدوية، آثارًا جانبية إلا أنها قد لا تصيب الجميع. قد تحدث الآثار الجانبية التالية عند تناول هذا الدواء:

**الآثار الجانبية الشائعة** (قد تصيب شخصًا من بين ١٠ أشخاص)

- برودة اليدين والقدمين
- تباطؤ ضربيات القلب
- تتميل وتشنج الأصابع بالإضافة إلى حرارة وآلم (مرض رينود)
- اضطرابات في النوم أو كوابيس
- إرهاق

**الآثار الجانبية غير الشائعة** (قد تصيب شخصًا من بين ١٠٠ أشخاص)

- الإسهال
- الغثيان
- القيء

**الآثار الجانبية النادرة** (قد تصيب شخصًا من بين ١٠٠٠ أشخاص)

- تفاقم صعوبات التنفس، إذا كنت تعاني من الربو أو عانيت منه سابقًا
- ضيق في التنفس و/أو تورم الكاحلين، إذا كنت تعاني أيضًا من قصور القلب
- احصار اذيني بطيئي الذي قد يؤدي إلى ضربات قلب غير طبيعية، دوار، تعب أو إغماء
- الدوخة (خاصة عند الوقوف)
- تدهور الدورة الدموية إذا كنت تعاني بالفعل من ضعف الدورة الدموية

- ساقط شع
- تغيرات في المزاج
- ارتباك
- فقدان الذاكرة
- الذهان أو الهلوسة (اضطرابات نفسية)
- تتميل اليدين
- اضطرابات الرؤية
- جفاف العينين

- طفح جلدي، بما في ذلك تفاقم الصدفية
- يصبح أكثر عرضة للكدمات (نقص الصفائح الدموية)
- ظهور بقع أرجوانية على الجلد (فرقرية)

**الآثار الجانبية النادرة جدًا** (قد تصيب شخصًا من بين ١٠.٠٠٠ أشخاص)

ضعف حدث في العضلات (الوهن العضلي الوبيل)

قد تحدث تغيرات في بعض خلايا الدم أو أجزاء أخرى من الدم، من الممكن أن يأخذ الطبيب المعالج من حين لآخر عينات من الدم للتأكد مما إذا كان بروبيتول يؤثر على دمك.

**مدى تواتر هذه الآثار غير معروف (لا يمكن تقدير مدى تواترها وفقًا للبيانات المتاحة)**

- انخفاض مستويات السكر في الدم، يمكن أن يحدث ذلك لدى الأشخاص الذين يعانون أو لا يعانون من داء السكري، بما في ذلك الأطفال حديثي الولادة، الأطفال الصغار، الأطفال، كبار السن، المرضى الذين لديهم كلي اصطناعية (يخضعون لتسليol الكلى) أو المرضى الذين يتناولون أدوية لمرض السكري. قد يواجه ذلك أيضًا المرضى الصائمين أو الذين صاموا مؤخرًا أو الذين يعانون من مرض الكبد طويل المدى.
- التويات المرتبطة بانخفاض مستويات السكر في الدم.

لا تقلق بسبب قائمة الآثار الجانبية المحتملة هذه، قد لا تواجه أيًا منها.

إذا واجهت أي آثار جانبية غير مرغوب فيها، يمكنك المساعدة في توفير مزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.

**التبليغ عن الأعراض الجانبية**

إذا واجهت أي آثار جانبية بما في ذلك الآثار الجانبية المحتملة غير المذكورة في هذه النشرة، استشر الطبيب المعالج أو الصيدلي.

من خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية، يمكنك المساعدة في توفير مزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.

**٥. طريقة تخزين بروبيتول**

- قم بتخزين هذا الدواء بعيدًا عن مرآى ومتناول الأطفال.
- لا تستخدم هذا الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية والمذكور على العبوة والغلاف الخارجي. يشير انتهاء تاريخ الصلاحية إلى آخر يوم من الشهر.
- لا تقم بتخزين هذا الدواء في درجة حرارة تزيد عن ٣٠ درجة مئوية. إحتفظه بعيدًا عن الرطوبة.
- لا تستخدم هذا الدواء إذا لاحظت علامات تدهور واضحة عليه.
- لا تتخلص من أي أدوية عبر مياه الصرف الصحي. أسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد بحاجة إليها. ستساعد هذه الإجراءات على حماية البيئة.

**٦. محتويات العلية ومعلومات إضافية أخرى**

**على ماذا يحتوي بروبيتول**

المادة الفعالة هي بروبرإنولول هيدروكلوريد.

يحتوي كل قرص من بروبيتول ١٠ ملغ على ١٠ ملغ من بروبرإنولول هيدروكلوريد.

يحتوي كل قرص من بروبيتول ٤٠ ملغ على ٤٠ ملغ من بروبرإنولول هيدروكلوريد.

المكونات الأخرى لبروبيتول ١٠ ملغ و٤٠ ملغ هي: اللاكتوز أحادي الهيدرات، السليلوز دقيق التيلور، كروسكارميلوز الصوديوم، السيليكات الغروية اللامائية، ستيرات المغنيسيوم.

**كيف يبدو شكل بروبيتول ومحتويات العبوة**

إن أقراص بروبيتول ١٠ ملغ هي أقراص دائرية بيضاء اللون.

إن أقراص بروبيتول ٤٠ ملغ هي أقراص دائرية بيضاء اللون محززة على جانب واحد.

يتوفر بروبيتول ١٠ ملغ و٤٠ ملغ في علب تحتوي على ٥٠ قرص.

**الشركة المصنعة ومالكة حق التسويق**

فارمالين ش.م.ل – لبنان

الصندوق البريدي ٩٠٢٠١ جديدة المتن، لبنان

البريد الإلكتروني: pharmaline@maliagroup.com

الموقع الإلكتروني: www.pharmaline.com.lb

رقم تسجيل بروبيتول ١٠ ملغ في لبنان: ٩٤/٢٧٥٩١

رقم تسجيل بروبيتول ٤٠ ملغ في لبنان: ٩٤/٢٧٥٩٢

**إن هذا الدواء :**

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافًا للتعليمات يعرضك للخطر.
- أتبِع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفه لك.
- الطبيب والصيدلي هما الخبيران في الدواء ويجب نفعه وضروه.
- لا تتعلم مدة العلاج المحددة لك من لقاء طبي.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
- إحتفظ جميع الأدوية بعيدًا عن متناول الأطفال.

**مجلس وزراء الصحة العرب**

**واتحاد الصيدالة العرب**

تتم مراجعة هذه النشرة في آذار/مارس ٢٠٢٢.