

# تانسيوبريل

## كابتوبريل (وفقاً لدستور الأدوية الأميركي)

### لمعالجة وإرتفاع ضغط الدم

المواصفات: تانسسيوبريل يحتوي على مادة الكابتوبريل وهو عامل فعّال في معالجة إرتفاع ضغط الدم. المفاعيل: التانسسيوبريل يكتب جهاز "الرين - أنجيوتنسين - إلدوستيرون" وذلك عبر كبحه الأثرية المسؤولة عن تحويل "أنجيوتنسين ١" إلى "أنجيوتنسين ٢". كما أنه يحد أيضاً من تحلل "البراديكينين". كل هذه المفاعيل تؤدي إلى إنخفاض في مقاومة الشرايين المحيطية وبالتالي إلى إنخفاض في ضغط الدم. في حالات قصور القلب الاحتقاني، يؤدي التانسسيوبريل إلى إنخفاض في ضغط الدم العائد إلى القلب وتدني في مقاومة الشرايين للدم المضغ منه. يمتص مباشرة عبر الجهاز الهضمي بعد تناوله بواسطة الفم ويصل أعلى تركيز له في البلازما بعد ساعة تقريباً، مع العلم أن نتيجة المفعولة الكاملة قد لا تتبلور في العلاجات الطويلة الأمد إلا بعد بضعة أسابيع من العلاج. يلتصق بروتينيات البلازما بنسبة ٢٠٪. يتأبض في الكبد ويفرز خاصة في البول. دواعي الإستعمال: يستعمل التانسسيوبريل في معالجة إرتفاع ضغط الدم وفي معالجة قصور القلب الاحتقاني، وعقب الإحتشاء العضلي القلبي لدى المرضى الذين يعانون من عسر في وظيفة البطيني الأيسر، وفي حالات الإعتلال الكلوي لدى المصابين بالسكري المتجاوب مع الأنسولين، كما يستعمل في الطور الحاد للإحتشاء القلبي. موانع الإستعمال: يوصى بعدم إستعمال التانسسيوبريل لدى المرضى الذين يظهرن حساسية على مادة الكابتوبريل والمواد الشبيهة لها.

إحتياطات: يوصى بأخذ الحذر في حالات القصور الكلوي ويطلب معاينة عمل الكلي قبل البدء بالعلاج. كما يوصى بأخذ الحذر في حالات الإضطرابات الكولاجينية على مستوى الشرايين. ينصح بعدم استعماله لدى الحوامل (خاصة في الشهر الثالث حتى التاسع) ولدى من لهن نية الحمل إلا عند الضرورة القصوى وذلك لوجود خطر على الجنين. كما ينصح بتوقيف الرضاعة أثناء العلاج. قد يحصل إنخفاض عابر في ضغط الدم عند بدء العلاج، ويمكن تفاديه ببدء العلاج بجرعة خفيفة قبل النوم. أعراض جانبية: طفق جلدي، حكاك، سعال ناشف وإرتفاع في الحرارة، إضطرابات في الطعم، إنخفاض في الوزن، وجود بروتينيات في البول، إرتفاع نسبة البوتاسيوم في الدم، قلة الصفائح الدموية، فقر الدم، سرعة في نبضات القلب، تهيج في الجهاز الهضمي، وأوجاع في البطن وإصابات كبدية خفيفة. المقادير: - إرتفاع بسيط إلى متوسط في ضغط الدم: ٢٥ ملغ مرتين في اليوم. يمكن زيادتها عند الحاجة على أن تتعدى ٥٠ ملغ مرتين يومياً كحد أقصى.

- إرتفاع حاد في ضغط الدم: ٥٠ ملغ ثلاث مرات يومياً كحد أقصى.  
- قصور قلبي إحتقاني: ٢٥ ملغ ثلاث مرات يومياً. يمكن زيادتها عند الحاجة على أن لا تتعدى ٥٠ ملغ ثلاث مرات يومياً كحد أقصى.

- إحتشاء عضلة القلب: البدء في أسرع وقت ممكن بجرعة أولية قدرها ٦.٢٥ ملغ. يزداد المقدار تدريجياً خلال عدة أسابيع حتى بلوغ كمية ١٥٠ ملغ يومياً مقسمة على عدة جرعات. إعتلال كلوي سكري: المقدار اليومي المقترح ٧٥ - ١٠٠ ملغ مقسم على عدة جرعات.

الأشكال الصيدلانية المتوفرة: - أقراص: عبوة تحتوي على ٢٠ قرصاً ويحتوي كل قرص على كابتوبريل ٢٥ ملغ، سواغ كمية كافية للقرص الواحد. رقم التسجيل لبنان ٢٧٥٤٤

- عبوة تحتوي على ٢٠ قرصاً ويحتوي كل قرص على كابتوبريل ٥٠ ملغ، سواغ كمية كافية للقرص الواحد. رقم التسجيل لبنان ٢٧٥٤٥

- عبوة تحتوي على ٣٠ قرصاً ويحتوي كل قرص على كابتوبريل ٢٥ ملغ، سواغ كمية كافية للقرص الواحد. رقم التسجيل لبنان ٤٠٥٩٣٤

- عبوة تحتوي على ٣٠ قرصاً ويحتوي كل قرص على كابتوبريل ٥٠ ملغ، سواغ كمية كافية للقرص الواحد. رقم التسجيل لبنان ٤٠٥٩٣٣

- عبوة تحتوي على ١٠٠٠ قرص (١٠ أقراص) مسحوبة) ويحتوي كل قرص على كابتوبريل ٢٥ ملغ، سواغ كمية كافية للقرص الواحد. رقم التسجيل لبنان ٢٧٥٤٦

- عبوة تحتوي على ١٠٠٠ قرص (١٠ أقراص) مسحوبة) ويحتوي كل قرص على كابتوبريل ٥٠ ملغ، سواغ كمية كافية للقرص الواحد. رقم التسجيل لبنان ٢٧٥٤٧

إن هذا دواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك وإستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- إتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وينفعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

× إن إسم تانسسيوبريل هو ماركة مسجلة.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.