

# ديرمازون

## كلوبيتازول بروبيونات (وفقاً لدستور الأدوية الأميركي)

### ستيرويد قشري موضعي

**المواصفات:** الديرمازون هو هرمون قشري سكري موضعي فعال جداً ومضاد للإلتهاب وللحكة ومضيق للأوعية.

**المفاعيل:** يؤثر الديرمازون سريعاً على أمراض الجلد المتهبة التي تتجانب مع علاج الستيرويد القشري الموضعي. كما يخفّف الحكاك والإنزعاج المرافقين لتهدّج الجلد ويساعد على تخفيض التبيّغ والتورم. وهو ذو أهمية خاصة عندما يستعمل كعلاج قصير الأمد للإلتهابات الجلدية المقاومة التي تتجانب بشكل ملائم مع الستيرويدات الأقل فعالية.

**دواعي الإستعمال:** يُستعمل الديرمازون كعلاج موضعي للأكزيما والصدف المقاومة والحزاز البسيط والمنبسط والذئب الحُمامي القرصاني وغيرها من الأمراض الجلدية الإلتهابية.

**موانع الإستعمال:** يوصى بعدم إستعمال الديرمازون في حالات الإخماجات الجلدية الناجمة عن الحلاء البسيط والحماق والمبيضات أو البكتيريا (قوياء) ويمنع إستعماله في حال وجود حساسية مفرطة على الكلوبيتازول.

**أعراض جانبية:** أفيد عن ظهور إحساس بحرق وحقاك وتهيج وطفح عدي الشكل وإخماج ثانوي وضمور جلدي وإلتهاب جلدي إلتهاسي خطي وأرجي خاصة عند إستعمال التضعيد المطبق.

**إحتياطات:** إن الإستعمال الموضعي المتواصل والطويل الأمد قد يؤدي الى تغيرات ضرورية خاصة في الوجه. يجب تقادي إحتكاكه بالعينين والتوقف عن إستعماله فوراً لدى ظهور تهيج جلدي.

**حالات الحمل:** لا يجب استعمال الديرمازون أثناء الحمل إلا إذا كانت الفائدة منه تُبرّر الخطر على الجنين. لا يجب إستخدام الأدوية التي تنتمي إلى هذا الصنف عند النساء الحوامل بإفراط، أو بكميات كبيرة، أو لمدة طويلة.

**حالات الإرضاع:** لم يعرف بعد إذا كان الإستعمال الموضعي للديرمازون يؤدي إلى امتصاص بكميات كافية ليظهر الدواء في الحليب، وفي كل الأحوال، يجب أخذ الحذر عند إعطاء الديرمازون للأمهات المرضعات.

**الأطفال:** يجب إعطاء الديرمازون للأطفال بأقل كمية تؤمن نتيجة علاجية، إن استعمال هذا الدواء لمدة طويلة قد يؤثر على نمو الطفل. للإستعمال الخارجي فقط.

**المقادير وكيفية الإستعمال:** إدهن الموضع المتضرر بكمية قليلة مرّة أو مرتين في اليوم.

### الأشكال الصيدلانية المتوفرة:

**مرهم ٠.٠٥٪:** أنابيب سعة ١٥ غراماً، تحتوي في كل غرام على كلوبيتازول بروبيونات ٠.٥ ملغ، وسواغ بكمية كافية للغرام الواحد. رقم التسجيل لبنان ٢٦٦٩٤

**كريم ٠.٠٥٪:** أنابيب سعة ١٥ غراماً، تحتوي في كل غرام على كلوبيتازول بروبيونات ٠.٥ ملغ، وسواغ بكمية كافية للغرام الواحد. رقم التسجيل لبنان ٢٦٦٩٣

**غسول ٠.٠٥٪:** عبوات سعة ٣٠ مللتر تحتوي في كل مللتر على كلوبيتازول بروبيونات ٠.٥ ملغ، وسواغ بكمية كافية للملتر الواحد. رقم التسجيل لبنان ٢٦٦٩٥

إن هذا دواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك وإستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- أتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وينغمه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

\* إن اسم ديرمازون هو ماركة مسجلة.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.