

دليل استخدام الدواء: معلومات مخصصة للمريض أقراص أوريلك ١٠٠ ملجم ٣٠٠ ملجم الليوبيرونول

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل البدء باستخدام هذا الدواء لأنه يحتوي على معلومات هامة بالنسبة إليك.

- على المريض الاحتياط بهذا الدليل إذ قد يحتاج إلى قرائته مرة أخرى.
- إذا كانت لدى المريض أي أستئنات إضافية، ينبغي عليه أن يطرحها على الطبيب أو الصيدلي.
- تم وصف هذا الدواء للمرضى فقط، لذا عليه الأيفيحة للأخرين لأنه قد يؤذنهم حتى وإن كانوا يعانون من الأعراض عينها التي يعاني منها.
- في حال أصيب المريض بأثار جانبية، يرجى إبلاغ الطبيب أو الصيدلي عنها ويشمل ذلك أي اثار جانبية لم تذكر في هذا الدليل.

في هذا الدليل:

١. ما هو أوريلك ولماذا يستخدم.
٢. ما عليك معرفته قبل استخدام أقراص أوريلك.
٣. كيفية استخدام أقراص أوريلك.
٤. الآثار الجانبية المحتملة.
٥. كيفية حفظ أقراص أوريلك.

٦. محتويات العلبة وغيرها من المعلومات.

٧. ما هو أوريلك وماذا يستخدم.

- تحتوي أقراص أوريلك على دواء يدعى الليوبيرونول، هو يعمل عبر تخفيف سرعة بعض التفاعلات الكيميائية في جسم المريض. يستخدم أوريلك للأغراض التالية:
- منع الاصابة بالقرصس وهو مرض يُؤثر في الجسم الكبير من مادة تدعى حمض البوبيونيك. يترافق حمض البوبيونيك في المفاصل والأوتار مثل الملوارات. هذه الملوارات تتسبب بالإلتهاب كردة فعل، والإلتهاب يزيد من تورم الجلد حول المفاصل و يجعله رقيقاً وحساساً بحيث يشعر المريض بالألم بمجرد لمسة سبطة. كما قد يشعر المريض بألم شديد لدى تحريك المفصل.
- منع حالات أخرى يتم فيها تراكم حمض البوبيونيك في الجسم، يشمل ذلك الحمى في الكل ونوع آخر من مشاكل الكل ولدى الخضم لعلاج ضد السرطان.

٨. ما عليك معرفته قبل استخدام أقراص أوريلك.

لا تستخدم أقراص أوريلك:

- إذا كنت تعاني من الحساسية (الحساسية المفرطة) على الليوبيرونول أو أي من مكونات هذا الدواء الأخرى (المدرجة في القسم ٦).
- إذا كان ما تناوله ينطوي عليك. لا تتناول أوريلك وتحدث إلى طبيبك أو الصيدلي.

٩. التحذيرات والاحتياطات:

عليك استشارة طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

عليك توخي الحذر الشديد مع أوريلك:

- إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد أو الكل. قد يُؤثر الطبيب الجرعة أو يطلب منك عدم تناول الجرعة يومياً. كما سيقوم بالإشراف عليك عن كتاب.
- إذا كنت تعاني من مشاكل في القلب أو من ارتفاع في ضغط الدم.
- إذا كنت تتعرّض حالياً لارتفاع في ضغط الدم.
- إذا علمت من طبيبك بأنك تعاني من حساسية على اللاكتوز إذ تحتوي أقراص أوريلك على كمية قليلة من اللاكتوز. وإذا علمت من طبيبك بأنك تعاني من حساسية على بعض السكريات،

يُنصح بطيبيك قبل تناول هذا الدواء.

في حال كان أي مما تناوله ينطوي عليك، إنصل بطيبيك المعالج أو الصيدلي.

١٠. أدوية أخرى وأوريلك:

ينبغي على المريض إطلاع الطبيب أو الصيدلي إذا كان يتناول أي من الأدوية التالية:

١١. أسيتيل ساليسيليك أسيد.

١٢. ثيوغليتين المستخدم لعلاج مشاكل التنفس.

١٣. أدوية تستخدم لعلاج التهابات (نوبات المصرع)

١٤. المضادات الحيوية

١٥. ديدانوزين المستخدم لعلاج الإصابة بغيروس نقص المناعة البشرية

١٦. أدوية علاج مرض السرطان

١٧. الأدوية المستخدمة للحد من استجابة الجهاز المناعي (المثبطة للمناعة)

١٨. الأدوية المستخدمة لعلاج آلام السكري

١٩. الأدوية المستخدمة لعلاج مشاكل القلب أو إرتفاع ضغط الدم مثل مثبطات إنزيم محول الإنгиوتنتسين أو مدمرات البول

٢٠. الأدوية المستخدمة لتسهيل المراء (الأدوية المضادة للتشنج) مثل الوارفارين

٢١. أي أدوية أخرى مستخدمة لعلاج النقوس أو داء المفاصل

يرجى من المريض إعلام الطبيب أو الصيدلي في حال كان يتناول أو تناول مؤخراً أو قد يتناول أي أدوية أخرى.

أوريلك مع الطعام والشراب

على المريض تناول هذا الدواء مع الطعام والماء.

الحمل والرضاخة

قبل تناول هذا الدواء، استشيري طبيبك أو الصيدلي إذا كنت حاملاً، تقومين بالارضاع، تعتقدين أنك حامل، أو تخاطلين لإنجاب طفل.

القيادة وتشغيل المركبات

قد يتسبب هذا الدواء بالنعاس أو الدوخة وقد يؤدي إلى مشاكل في تنسيق الحركات. فإذا حصل ذلك، إحرص على عدم قيادة السيارة أو استخدام أي أدوات أو مركبات.

٣. كيفية تناول أوريلك

يتعين على المريض دائمًا أن يتناول هذا الدواء تماماً حسب وصفة الطبيب وعليه استشارته في حال لم يكن متاكداً.

تناول هذا الدواء

يتم إبتلاع القرص مع كوب من الماء.

يتم تناول القرص مع الطعام أو مباشرة بعده.

الأولاد (ما دون ١٥ سنة من العمر):

تناول الجرعة المحددة ما بين ١٠٠ و٤٠ ملجم يومياً.

البالغون (فوق ١٨ سنة من العمر):

تناول الجرعة المحددة ما بين ١٠٠ و٩٠٠ ملجم يومياً. عادةً يبدأ العلاج بجرعة ١٠٠ إلى ٣٠٠ ملجم يومياً.

يصف الطبيب أقل جرعة يمكن أن تضبط العوارض.

إذا كان المريض يعاني من مشكلة خطيرة في الكلى

قد يطلب منه أن يتناول جرعة تقل عن ١٠٠ ملجم يومياً أو أن يتناول جرعة الـ ١٠٠ ملجم على فترة زمنية أطول من يوم واحد.

إذا كان المريض يعاني من مشكلة خطيرة في الكلى مرتين أو ثلاثة مرات أسبوعياً، يمكن أن يصف الطبيب له جرعة تراوح ما بين ٢٠٠ و٤٠٠ ملجم يومياً.

في حال تناول المريض جرارات من أوريلك أكثر مما يجب

في حال تناول المريض عرضياً جرارات من أوريلك أكثر مما ينبغي، عليه الاتصال بالطبيب أو التوجه إلى المستشفى مباشرةً آخذةً عليه الدواء معه.

في حال تناول المريض تناول أوريلك

في حال تناول المريض تناول إحدى جرارات الدواء، عليه تناولها حاماً يتدبر وأن يُبعدها بالجرعة التالية، على المريض أن ينسى أمر الجرعة التي

لم يتناولها ويتناول جرارات الماء. في حال حان موعد الجرعة التالية، لا يجب تناول جرعة مضاعفة (جرعتان في الوقت نفسه) للتوسيع عن القرص الذي لم يتم تناوله.

في حال التوقف عن تناول أوريلك

يتعين على المريض عدم التوقف عن تناول هذا الدواء إلا بإيعاز من الطبيب. إذا كانت لدى المريض أي أستئنات إضافية حول كيفية استخدام الدواء، عليه طرحها على الطبيب أو الصيدلي.

٤. الآثار الجانبية المحتملة

شأن أوريلك شأن كافة الأدوية، فقد يتسبب بأثار جانبية على الرغم من أنها لا تحصل للجميع. وبالتالي، يمكن للأثار الجانبية التالية أن تحصل للمريض:

الحساسية

إذا أصيب المريض بالحساسية، عليه التوقف عن تناول هذا الدواء واستشارة الطبيب مباشرةً. علامات الحساسية تشمل:

- الطفح الجلدي، تقرح الجلد، حمام أو تقرح في الشاهن والفنم.

- العلامات النادرة شاملة الآلام المفاجئ، تغص أو ضيق في الصدر، وأنهيار.

على المريض عدم تناول أقراص إضافية إلا بموافقة الطبيب.

في حال اشتراك المريض من أي من الحالات التالية، عليه التوقف عن تناول الدواء والإتصال بطبيبه في أقرب فرصة ممكنة:

نادرًا:

- ألم في المفاصل أو تورم مول في الفخذ، الأباطل أو العنق

- مشاكل في الكبد أو الكل

- الشعور بالتعب (غثيان) أو الإصابة بالمرض (قيء) مع تقيؤه من وقت إلى آخر

- تغيرات في البشرة ظهور البثور أو تقرح البشرة مثلاً

- حمى متقطعة، ألم في العضلات والشعور بعدم الارتفاع عاماً

- نزف الشفتين، العين، الأنف، الأذن أو الأعضاء التناسلية.

نادرًا جداً:

- ظهور كدمات بسوبر أوسلو من المعتاد، أو احتقان الحلق أو علامات أخرى تشير إلى المعدوى. على المريض في هذه الحالة الإتصال بالطبيب مباشرةً. في بعض الأحيان، يمكن لهذا الدواء أن

يؤثر على الدم أو الجهاز المخاطي. تظهر هذه الأعراض عامةً لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكبد أو الكل.

- ارتفاع حرارة الجسم

- ارتفاع ضغط الدم

- شعور عام بعدم الارتياح

- تعب، خدر، عدم ثبات في القدمين، الشعور بعدم القدرة على تحريك العضلات (شلل) أو فقدان الوعي

- ألم في الصدر، ارتفاع ضغط الدم، أو تباطؤ النبض

- عسرة النשימה لدى الرجال والنساء على السواء

- تغير في عادات الأمعاء

- تغير في حاسة الذوق

- إلتهاب عدسة العين

- تساقط الشعر أو تغير لونه

- نوبات (تشنج)

- اكتئاب

- تراكم السوائل مما يؤدي إلى التورم (وذمة) لا سيما في الكاحلين

- الشعور بالعطش، التعب وفقدان الوزن. قد تكون هذه أعراض مرض السكري. قد يطلب الطبيب فحص مستوى السكر في الدم للتحقق من ذلك.

في حال شعر المريض بأي من هذه الآثار الجانبية عليه الإتصال بالطبيب أو الصيدلي. يشمل ذلك أي أثار جانبية غير مذكورة في هذا الدليل.

٥. كيفية حفظ أوريلك

يجب إبقاء هذا الدواء بعيداً عن متناول الأطفال وعن مرآهم.

يجب أن يحفظ الأقراص في درجة حرارة تقل عن ٢٠ درجة مئوية.

يجب أن تحفظ الدواء في علبة الأصلية.

لا تست Undo

لا يتم تناول أوريلك المتضرر.

لأن هذه الإجراءات سوف تساعد في حماية البيئة.

٦. محتويات العلبة وغيرها من المعلومات

ماذا تحتوي أقراص أوريلك.

المادة الناشطة في أوريلك هي الليوبيرونول.

- أوريلك ١٠٠ ملجم: علبة مقدمة بـ ٥٠ قرص.

- أوريلك ٣٠٠ ملجم: علبة مقدمة بـ ٣٠ قرص.

فاريماين ش.م.ل. - لبنان

صنفون بريد ٢٠٢١ جديدة المتن، لبنان

pharmaline@mailagroup.com

رقم التسجيل بالنسبة إلى أوريلك ١٠٠ ملجم في لبنان: ٢٧٥٦٦

رقم التسجيل بالنسبة إلى أوريلك ٣٠٠ ملجم في لبنان: ٣٧٥٦٧

٢٠١٥

إن هذا المنتج هو دواء

• إن الدواء منتج يوثق على صحتكم ويمكن أن يشكل خطراً عليكم عند استعماله عكس التعليمات.

• يجب أتباع وصفة الطبيب وتعليماته بشكل صارم ودقيق، وكذلك يجب اتباع طريقة الاستعمال وتعليمات الصيدلاني الذي باعكم الدواء.

• إن الأطباء والصيدلانية هم خبراء في الأدوية ومنافعها ومخاطرها.

• لا توقف فترة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.

• لا تقم بتكرار الوصفة الطبية من دون استشارة الطبيب.