

Farlutal, médroxyprogesterone acétate ou MAP, est un stéroïde synthétique actif par voie orale, dérivé de la progesterone et mis au point dans les Laboratoires de Recherche de Farmitalia Carlo Erba.

Il possède la même structure que la progesterone naturelle dont il diffère par la présence d'un méthyl en 6-alpha et du radical 17-OH estérifié. Ce produit possède des propriétés progestatives et une action antioestrogène et antigonadotrophique.

À des doses appropriées l'action du MAP se manifeste aussi bien au niveau du système endocrinien qu'à celui de l'activité cellulaire.

INDICATIONS - Carcinome du sein, de l'endomètre, de la prostate, du rein. Adénome prostatique.

CONTRE-INDICATIONS - Thrombophlébites, troubles de nature thromboembolique, insuffisance hépatique grave, avortement, hypercalcémie de patients porteurs de métastases osseuses, mètrorragie de nature inconnue, hypersensibilité envers le produit.

POSOLOGIE - Généralement la posologie varie entre 100 et 1000 mg/jour (les doses plus élevées peuvent être fractionnées en deux ou trois administrations quotidiennes).

En général les dosages les plus bas sont prescrits en cas de carcinome de l'endomètre, ceux plus élevés dans le carcinome du sein en phase avancée et métastatique.

Farlutal peut être avantageusement associé à d'autres formes de traitement antinéoplasique (chimiothérapie, radiothérapie).

EFFETS SECONDAIRES - Comme avec d'autres produits contenant des dérivés de la progesterone on a observé des cas de mastodynies, de galactorrhée, de saignements vaginaux, de modification du flux menstruel, d'aménorrhée, d'oedème, de variation de poids, de modification des cellules cervicales ou des sécrétions cervicales, d'ictère cholestatique, d'érythème avec ou sans prurit, de dépression psychique.

PRECAUTIONS D'EMPLOI - Une éventuelle relation entre l'administration de dérivés de la progesterone dans les premiers mois de la grossesse et la présence de malformations cardiaques congénitales du nouveau-né a été évoquée. Par précaution on déconseille donc l'emploi du produit pendant la grossesse.

Si des troubles d'origine thromboembolique, une soudaine perte de la vue, partielle ou totale, une diplopie, un oedème de la papille, des lésions vasculaires de la rétine, des céphalées importantes, devaient survenir, il faudrait immédiatement arrêter le traitement.

En cas de saignements vaginaux Farlutal ne sera prescrit qu'après exclusion de toute cause ne relevant pas de la thérapeutique progestative. Si un examen histologique devait être nécessaire, il serait opportun de signaler que la patiente est sous traitement par progestatif.

L'âge ne représente pas un facteur limitant la thérapie; toutefois le traitement à base de dérivés de la progesterone peut retarder l'apparition de la ménopause. Un contrôle médical attentif doit être instauré en présence de diabète ou de graves dépressions psychiques. On signale enfin que des études effectuées sur des chiens de la race Beagle, qui ont été traités avec le MAP, ont révélé le développement de nodules mammaires, dont certains à caractère évolutif.

Ne pas laisser ce médicament à la portée des enfants.

PRESENTATIONS - Flacon de 30 comprimés dosés à 100 mg de médroxyprogesterone acétate. Flacon de 30 comprimés dosés à 250 mg de médroxyprogesterone acétate. Flacon de 30 comprimés dosés à 500 mg de médroxyprogesterone acétate.



FARMITALIA CARLO ERBA