

باركنسول

بنزكسول هيدروكلوريد (وفقاً لدستور الأدوية البريطاني)

لمعالجة داء الباركنسون

المواصفات: يحتوي الباركنسول على بنزكسول هيدروكلوريد وهو عامل فعال في معالجة الباركنسون.

المفاعيل: الباركنسول يكبح فعل الأستيتيل كولين المركزي، كما أنه يمنع قبط الدوبامين مرة ثانية وتخزينها في الأعصاب المركزية ممدداً بذلك فترة فعاليتها.

نتيجة لأنعاله هذه، يخفف الباركنسول احتمال تكرار وحدة فقدان الحركات الإختيارية، والتصلت والرعش. كما أنه يخفف أيضاً من عوارض داء بركنسون الثانوية. يمتص جيداً من الجهاز الهضمي ويظهر مفعوله خلال ساعة من تناول الجرعة الشفوية.

دواعي الإستعمال: يستعمل الباركنسول كعلاج مساعد مع مادة الليفودوبا في مختلف حالات داء الباركنسون. كما يستعمل في ضبط الإضطرابات الخارجة عن الجهاز الهرمي والناجمة عن بعض العقاقير.

موانع الإستعمال: حالات فرط الحساسية على مادة البنزكسول. يمنع إستعماله لدى المصابين بالغلوكوما أو بإنسداد بوابي أو عفجي، ولدى المصابين بقرحة هضمية تضيقية أو تورم في البروستات أو بإنسداد في عنق المثانة، لدى المصابين بقصور إسترخاء عضلات الجهاز المعدي المعوي، ولدى المصابين بوهن عضلي وخيم.

إحتياطات:

- قد يؤدي الباركنسول إلى تطور حالات الغلوكوما ذات الزاوية الضيقة البائدة.
- حالات حساسية وإرتباك ذهني أو إضطرابات قد تحدث لدى المسنين.
- يجب توخي الحذر أثناء معالجة المرضى الذين يعانون من إضطرابات في الجهاز البولي التناسلي.
- قد يتسبب بإضعاف الطاقة الجسدية والفكرية لذلك يجب توخي الحذر في حال القيادة أو التعاطي مع الآت خطرة تتطلب وعياً كاملاً.
- حالات الحمل: لا يجب استعمال باركنسول أثناء الحمل إلا إذا كانت الفائدة منه تبرّر الخطر على الجنين.
- حالات الإرضاع: لا يوصى بالإرضاع أثناء استعمال الباركنسول.

أعراض جانبية: إضطرابات جلدية، نعاس، تعب، غشاوة في الرؤية، سرعة في نبضات القلب، انخفاض ضغط الدم، جفاف في الفم، غثيان، إمساك، حصر بول.

المقادير: الجرعة البدائية: ١ - ٢ ملغ موزعة على ٣ أو ٤ جرعات تؤخذ مع الطعام. يضاف عليها ٢ ملغ كل ٣ إلى ٥ أيام لغاية ٦ - ١٠ ملغ يومياً حسب تجاوب المريض.
للحالات الأكثر حدة، قد يستعمل ١٢ إلى ١٥ ملغ أو حتى أكثر يومياً.
ملاحظة هامة: يجب أن لا يقطع العلاج بصورة مفاجئة.

الأشكال الصيدلانية المتوفرة: - أقراص:

- عبوة تحتوي على ١٠٠ قرصاً ويحتوي كل قرص على بنزكسول هيدروكلوريد ٥ ملغ، سواغ كمية كافية للقرص الواحد.
رقم التسجيل لبنان ٢٧٥٦٨

إن هذا دواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك وإستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- إتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وينفعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

* إن اسم باركنسول هو ماركة مسجلة.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.