

CODOPALM® EXPECTORANT

En dehors de son action antihistaminique (l'histamine favorise la contraction des fibres lisses de la musculature bronchique et intervenant plus particulièrement dans la toux d'origine allergique), le prométhazine HCL diminue la perméabilité capillaire et réduit ainsi l'état congestif oedémateux et sécrétoire des muqueuses.

Il possède, de plus, une action centrale qui contribue à rompre le réflexe de la toux; il calme la dyspnée, supprime l'angoisse et favorise le sommeil grâce à ses propriétés hypnogènes.

L'excipient sirop rend possible l'action anesthésique locale à effet immédiat. Il n'est donc pas uniquement destiné à agrémenter l'absorption, détaill toutefois d'importance quand il s'agit de jeunes enfants.

IPECACUANHA - ESTER DE GAIACOL

Les qualités expectorantes de l'ipecacuanha sont reconnues de longue date; cette drogue étant toutefois susceptible de provoquer à forte doses des réactions nauséeuses, les quantités ont donc été choisies volontairement faibles tout en étant suffisantes pour être actives.

L'ester de gaiacol, médicament mucolytique, intervient efficacement en fluidifiant les sécrétions bronchiques et en facilitant ainsi leur expectoration.

La formule du Codopalm® Expectorant est ainsi remarquablement équilibrée, permettant une action efficace sur la toux et réduisant les conséquences défavorables tout en favorisant l'expectoration qu'il est, la plupart du temps, utile de conserver.

PRÉSENTATION

Le Codopalm® Expectorant est présenté en flacons de 100 ml. Une cuillerée à café de sirop (5 ml) renferme:

5 milligrammes de prométhazine HCL,
45 milligrammes sulfoguaïacolate de Potassium,
3 milligrammes d'extrait d'ipecacuanha.

INDICATIONS

Le Codopalm® Expectorant est indiqué dans toutes les affections s'accompagnant de toux:

- bronchites et trachéo-bronchites aigües émétisantes;
- coqueluche;
- toux coqueluchoides nocturnes et toux émétisantes;
- toux des asthmatiques;
- toux d'irritation, toux des fumeurs, toux provoquant de l'insomnie;
- toux post-grippales;
- infections des organes respiratoires supérieurs, rhume commun.
- toux d'origine allergique.

DOSAGE

Adultes: 1 - 3 cuillerées à soupe par jour.

Enfants de plus de 5 ans: 1 - 3 cuillerées à café par jour.

Enfants entre 1 et 5 ans: 1 cuillerée à café / 10 kg / jour.