

التريكية
تحتوي القارورة من المحلول الفموي على حديد بروتاين وسوكسينيلت 800 ملج (أي ما يعادل 40 ملج من الحديد ثلاثي الكافؤ). الصواع: سوريبتول E420، برويلين جليكول، مثيل - ب - هيدروكسيبنزوات الصوديوم، برويل - ب - هيدروكسيبنزوات الصوديوم، نكهة موزيلا، سكارين الصوديوم، ماء مطهر.

الشكل الصيدلاني

محلول فموي

فيربلكس 40 ملج/15 مليلتر من المحلول الفموي - 10 قارورات (عبوات أحادية الجرعة) سعة 15 مليلتر.

التصنيف الصيدلاني

مضاد الشحاب (مضاد الأنيميا) يحتوي على حديد ثلاثي الكافؤ. لعلاج حالات النقص في الحديد.

دواعي الإستعمال

معالجة حالات النقص في الحديد المولدة والتسببية، نقص مستر أو واضع في الشحاب (أو الأنيميا) عند الأولاد وال كبار، على أثر نزف مزمن لدم أو على أثر الحمل أو الترضيع بالسندي.

النواهي عن الإستعمال

حساسية مفرطة على المستخضر أو على أحد صواغه.

تكاثر الحديد في الدم، ثلوث الدم، شحاب لاموي وزفني، شحاب سببه اختلال إستعمال الحديد (شحاب ناتج عن عدم إستعمال الحديد)، التهاب المتكدة الزمن، تشمع الكبد بسبب ثلوث الدم.

الاحترازا عن الاستعمال

لا توجد مخاطر معينة بخصوص تولد إبطاء أو إدمان. ينبغي أن لا يدمر العلاج أكثر من ستة أشهر ما لم يكن هناك إستمرار النزف، طمث وافر أو حمل.

التفاعلات مع أدوية أخرى

من شأن الحديد تعريض إمتصاص أو التوافر الحيوي للمواد التالية للنظر: التيتراسيكلين ثاني الفوسفونات، العوامل القارمة للالتهابات المحتوية على الكينولون، نيسيلامين، تيروكسين، ليفودوبا، كاربيدوبا - ألغا - منتلوبا، بيني تناول فيربلكس بعد مرور حوالي ساعتين إثنين من تناول كل هذه الأدوية.

بالإمكان زيادة إمتصاص الحديد نتيجة الفياج في نفس الوقت بتناول أكثر من ٢٠٠ ملج من حمض الأسكوربيك. كما بالإمكان خفض الإمتصاص عن طريق القيام في نفس الوقت بتناول مضادات الحمض.

لم يتم الأبحاث عن حصول أي تفاعل أثناء القيام في نفس الوقت بالعلاج بواسطة مضادات ال H2.

من شأن مركات الحديد (مثل الفوسفات والفيلات والأوكسالات) التي تحتويها البقل والطبيب والقهوة والشاي كبح إمتصاص الحديد. ينبغي تناول فيربلكس بعد مرور حوالي ساعتين إثنين من تناول كل هذه المكونات والمشروبات.

تحذيرات خاصة

ينبغي التحقق من ومعالجة أي مرض شوكه عند نقص في الدم أو شحاب ناتج عن نقص في الدم بشكل مناسب.

وإذا كان المستخضر يشتمل على بروتاين الحليب ينبغي إستعماله بحذر من قبل المرضى الذين لا يتحملون بروتاين الحليب الذين قد تتوّد عندهم ردات فعل حساسية.

تحتوي قارورات فيربلكس على سوريبتول. لذلك على الأشخاص الذين لا يتحملون الفروكتوز النادرين أن لا يتناولوا هذا الدواء.

تحتوي قارورات فيربلكس على بارابن (مثيل - ب - هيدروكسيبنزوات الصوديوم، برويل - ب - هيدروكسيبنزوات الصوديوم). الأمر الذي يؤدّد ردات فعل حساسية متأخرة.

الجرعات

الكبار: من 2-1 قارورة في اليوم (أي ما يعادل 80-40 ملج من الحديد ثلاثي الكافؤ) بحسب رأي الطبيب، موزعين على مرحلتين إثنين، من الأفضل أن يكون ذلك قبل وجبات الطعام.

الأولاد: عن طريق أخذ نحو 1.5 مليلتر عن كل كلج واحد من وزن الواد في اليوم (أي نحو 4 ملج/كلج/يوم) من الحديد ثلاثي الكافؤ حسب رأي الطبيب، موزعين على مرحلتين إثنين، من الأفضل أن يكون ذلك قبل وجبات الطعام.

أشرب المحلول مباشرة من القارورة أو حلّه في الماء الطبيعي.

مدة العلاج

ينبغي متابعة العلاج إلى أن يكتمل الإحتياطي الإعتيادي للحديد (مدة شهرين إثنين أو ثلاثة أشهر عادة)

الدراسات الوبائية الفموية

الدراسات السورية التي أجريت من أجل إختبار فعالية المستخضر إستخدمت الجرعات المشار إليها أعلاه للكبار: 1600 ملج/يوم - للأولاد: 1.5 ملج/كلج/يوم من الحديد - بروتاين - سوكسينيلت. لا توجد أية معطيات حول الفعالية السريعة للدواء وحول القدرة على تحمّل جرعات أعلى.

الإفراط بالجرعة

في حال تناول جرعات مفرطة من الحديد يتعرض المريض لأوجاع شرسوفية وغثيان وفيه وإسهال وفيه دم، يرافقه غالباً نعاس وشحوب وإزرقاق وصدمة حتى الغيبوبة. ينبغي أن يكون العلاج أسرع ما يمكن ويكمن في تناول مقيء، على أن يليه غسل المعدة في حال كان ذلك لازماً، يرافقه علاج داعم مناسب. في حال لزوم الأمر يمكن تناول عامل إستخلاب الحديد مثل السيفيروكسامين.

ردود فعل غير مرغوبة

نادراً ما تحصل مشاكل معدية معينة (إسهال، إكتام، غثيان، أوجاع شرسوفية) تتراجع بعد وقف العلاج أو تخفيض الجرعة. من شأن المنتجات المحتوية على الحديد أن تؤدي إلى تغيير لون البراز من الأسود حتى الرمادي الداكن.

بالإمكان جذب كافة المؤثرات الجانبية غير المرغوبة عن طريق مراعاة هذه الإرشادات بدقة.

في حال بروز ردات فعل غير مرغوبة بعد تناول هذا المستخضر لم ترد في هذه الإرشادات ينبغي اعلام الطبيب المعالج بها.

إنتباه! اللدنة والحفظ

إنتباه! اللدنة: راجع التاريخ المكتوب على العبوة، يصلح هذا التاريخ فقط في حال حفظ المستخضر بشكل صحيح.

الحفظ: لا حاجة لإجراءات معينة.

تحذير

ينبغي عدم إستعمال الدواء بعد إنتهاء مدته المطبوعة على العبوة.

ينبغي إبقاء الدواء بعيداً عن متناول الأولاد.

المصنع: شركة إيتلفارماكو - شارع فولفو تيستي 330- ميلان 20126- إيطاليا