

Ovumix®

Centella asiatique 15 mg
Métronidazole 300 mg
Nitrate de Miconazole 100 mg
Sulfate de néomycine 48.80 mg
Sulfate de polymyxine 4.40 mg



Suppositoires Vaginaux

Fabriqué en Argentine

Vente sur ordonnance

Composition qualitative/quantitative:

Chaque suppositoire vaginal contient: centella asiatique 15 mg; Nitrate de Miconazole 100 mg; Métronidazole 300 mg; Sulfate de néomycine 48.80 mg; Sulfate de polymyxine 4.40 mg. Excipients: base pour les suppositoires (Witepsol H15) c.s.p. 2 g.

Action thérapeutique:

Ovumix® a combiné l'action thérapeutique, régénératrice et protectrice des tissus, appartenant à la centella asiatique, avec l'efficacité anti-infectieuse d'autres principes actifs à niveau de la muqueuse vulvo-vaginale. La centella asiatique favorise le processus de granulation et produit une formation adéquate de l'épithélium, la néomycine et la polymyxine couvrant un large spectre antibactérien, elles agissent sur les germes gram positifs et gram négatifs. Le Miconazole apporte son action antifongique et enfin le Métronidazole favorise l'action contre les trichomonas, les giardias et les amibes.

Indications:

Traitement local des vulvo-vaginites spécifiques et non spécifiques, notamment liées à des lésions de la paroi vaginale; vulvite, vaginite, vaginite cervicale irritative ou bactérienne, par candida, trichomonas, ou des leucorrhées de toute étiologie.

Posologie et mode d'administration:

Le traitement doit être commencé avec 1-2 suppositoires par jour. Si les symptômes sont atténusés, continuer avec 1 suppositoire par jour, ou coucher, jusqu'à la disparition complète des signes.

Placer le suppositoire au fond du vagin.
Appliquer pendant 5 à 10 jours au minimum.

D'autres actions collatérales et secondaires:

L'ardeur vulvo-vaginale, l'irritation et le prurit sont rares.
Le niveau d'absorption des substances au niveau de la muqueuse est méconnu, il n'est pas à exclure la possibilité de l'existence de réactions systémiques. Le risque étant plus élevé chez des patients avec insuffisance rénale.

Contre-indications:

- * Hypersensibilité aux substances composant la formule qualitative du produit ou à des dérivés imidazoliques
- * Premier trimestre de grossesse
- * Allaitement
- * Patients ayant des dyscrasies sanguines
- * Maladies actives du SNC

Précautions et avertissements:

Administrer avec précaution aux patients ayant une insuffisance hépatique sévère.
Ne pas utiliser ce produit avant le coït, il peut rendre difficile la fécondation.
L'emploi de ce médicament ne prévient pas le contagion des maladies de transmission sexuelle.

Le produit de base des suppositoires vaginaux peut altérer le latex des préservatifs ou des diaphragmes.

Interactions médicamenteuses:

- Eviter le lavage vaginal avec des produits alcalins.
- À cause de la basse absorption des drogues par la voie topique, il ne peut être exclu la possibilité des interactions systémiques, il est déconseillé la consommation d'alcool (effet antabuse), de la warfarine, la courmarine (il peut rendre plus puissant son effet anti coagulant) et le disulfiram.

Surdosage:

Si le médicament est administré par la voie sus indiqué, il n'existe pas de risque de surdosage.

En cas d'un éventuel surdosage, prière de s'adresser au Centre Hospitalier le plus proche.

Présentation:

Boîtes contenant 6 suppositoires vaginaux.

Conservation et stockage:

A Conserver entre 15 et 30 °C, éviter l'exposition à une température supérieure à 30 °C.

CONSERVER CE ET TOUT MÉDICAMENT HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Médicament Autorisé par le Ministère de la Santé. Certification N°: 51.684. Exploitant: Laboratoire ELEA S.A.C.I.F. et A.
Directeur Technique: Isaac J. Nisenbaum, Pharmacien.
Elaboré à: 2353 Rue «Sanabrio», BP (1417) Buenos Aires.

Date de la dernière révision de la notice: SEPTEMBRE 2004

53686-00

1-vu-g

ELEA