

بروستافين^١

تامسولوسين هيدروكلورايد

تتضمن التأثيرات الجانبية الأكثر شيوعاً ما يلي:
الدفق غير العادي للسائل المنوي، الآلام في الظهر، الآلام في الصدر، السعال،
الإسهال، الدوخة، الصداع، الحمى، الغثيان، ارتفاع الألف، مشاكل في جيوب
الألف، التهاب الحلق، وتلاشي القوى.
قد تتضمن التأثيرات الجانبية، مشاكل في الأسنان، الأرق، ومشاكل بصرية.
انخفاض في الشهوة الجنسية، انخفاض ضغط الدم عند الإستعداد للوقوف، انتصاب
الإمساك، الإغماء، انخفاض ضغط الدم عند الإستعداد للوقوف، انتصاب
مستمر ومؤلم، خفakan القلب، الدوار والقيء.

الاحتياطات الواجب اتخاذها عند تناول بروستافين
قد يسبب بروستافين، في حالات نادرة، ارتفاعاً في ضغط الدم عند الإستعداد
للوقوف، الأمر الذي قد يؤدي إلى الإصابة بالدوخة أو الإغماء. يجب تلافي
قيادة المركبات أو القيام بمهام خطيرة أخرى بعد مرور ١٢ ساعة على
تناول أول جرعة أو عند زيادة الجرعات. كما يجب الحرص على الإستعداد
للوقوف ببطء لحين تتأكد من أن هذا المغار لا يسبب لك الدوخة. في حال
شعرت بالدوخة، اجلس وإنظر زوالها. يتعذر الفساح من التأثيرات الجانبية
النادرة جداً (التي يصيب شخصاً واحداً من بين ٥٠٠٠)، وهو كنائة عن
انتصاب مستمر ومؤلم في القضيب ولا علاقة له بأي نشاط جنسي. يجب إعلام
طبيبك فوراً في حال تعرضت لها التأثير الجانبي.

في أي حالات عليك الامتناع عن تناول بروستافين؟
امتنع عن تناول بروستافين في حال كنت تعاني من تفاعلات حساسية ضد
الدواء أو ضد أي من مكوناته.

كيف يحفظ بروستافين؟
يحفظ بروستافين في مكان لا تتعدي الحرارة فيه ٣٠ درجة مئوية.
يحفظ في العبوة الأصلية بحالة سلامة.

تاريخ مراجعة النشرة: شباط ٢٠١٦.

هذا دواء:	إن الدواء مستحضر يؤثر على صحتك، واستهلاكه خلافاً للتوجيهات يعرضك للخطر.
-	- أتبع وصفة الطبيب بدقة، وارشادات الإستعمال، وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
-	- إن الطبيب والصيدلاني هما الخبران في الأدوية، فوازدتها ومخاترها.
-	- لا تقطع فترة العلاج المحددة لك من تأثيرك نفسك.
-	- لا تكرر نفس الوصفة دون استشارة طبيبك.
-	- احفظ الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال.

موزع وزراء الصحة العرب
والجهة المسئولة العرب

بنتا ش.م.ب.
صبيبه - لبنان.

الاشكال والعبوات

بروستافين: كبسولات معدلة التحرر: ٣٠ كبسولة في العبوة.

التركيب

بروستافين: تحتوي كل كبسولة معدلة التحرر على ٣٠ ملг من العامل الفعال
تامسولوسين هيدروكلورايد.
المادة غير الفعالة: هيدروكسي بروبيل ميثيل سيلولوز، سكروز، نشا،
مانيتون، أيبيل سيلولور، كوبوليمر حمض الميناكاريليك، هيدروكسيد
الصوديوم، بولي سوربات، بروبيلين غليكول، أكسيد الحديد الأسود، أزرق
لام، إريثروزين، ثاني أكسيد النيتريوم، أكسيد الحديد الأصفر، جيلاتين.

لماذا يجب أن تتناول بروستافين؟
الفئة العلاجية: طرت الجهاز البولي.

الرمز الكيميائي العلاجي التشارجي (ATC): G04CA02.
يستخدم بروستافين لمعالجة أعراض فرط النسخ البروستاتي الحميد. تتميز
هذه الحالة بتوسيع البروستاتة (الموئة) التي يسبب صعوبة في مباشرة عملية
التبول، تدفق ضيقاً للبول، والشعور بحاجة إلى التبول بشكل ملح أو بشكل
أكثر تواتراً. يؤدي دواء بروستافين إلى إسترخاء العضلة المحاطة بالبروستاتة
فيتدفق البول وتخف حدة الأعراض التي تطرأ على عملية التبول.

مماذا يجب أن تعلم عن بروستافين؟
قد يسبب دواء بروستافين الدوخة، خاصة عندما تستعد للوقوف. يجب توخي
الحذر عند قيادة المركبات، أو تشغيل الآلات، أو عند القيام بمهام خطيرة،
وذلك لحين تتحقق من كيفية استجابة جسمك للدواء.

ما هي جرعة بروستافين المعتمدة؟
للبالغين

تبلغ الجرعة اليومية الموصى بها في بداية العلاج كبسولة واحدة، ٣٠ ملг مرة
يومياً، ويتناولها بعد مضي نصف ساعة على وجهة الطعام في المساء ذاته
من كل يوم. يجوز أن يزيد الطبيب الجرعة إلى كبسولتين، ٦٠ ملг مرة يومياً،
عند الحاجة. امتنع عن هرس الكبسولة أو مضنهها أو فتحها.

ما العمل عند تناول جرعة مفرطة؟
إن تناول جرعة مفرطة من أي دواء قد يؤدي إلى عواقب خطيرة. في حال
شكك بأنك تناولتها بعد مضي جرعة مفرطة، استشر طبيبك فوراً.
قد تشمل الأعراض الناتجة من تناول جرعة مفرطة من بروستافين ما يلي:
الدوخة، الإغماء والصداع.

هل من تداخل بين بروستافين وأي طعام أو دواء؟
يجوز تناول بروستافين مع معظم الأدوية، لكن يجب استشارة طبيبك قبل
تناول بروستافين بالتزامن مع أي من الأدوية التالية: محضرات آلفا، كليندينين
هيدروكلورايد، سيميتدين ووارفارين.

ما هي التأثيرات الجانبية لبروستافين؟