

HÉLICIDINE®

SIROP 10 pour cent

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

HELICIDINE 10 ml.

pour 100 ml de sirop.

Excipients: saccharose, glycérol, arôme framboise, parahydroxybenzoate de méthyle, parahydroxybenzoate de propyle sodé, eau purifiée.

1 cuillère à café contient 3,4 g de saccharose.

1 cuillère à soupe contient 10,3 g de saccharose.

FORME PHARMACEUTIQUE

Sirop, flacon de 125 ml ou 250 ml.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Antitussif d'action périphérique

(R: système respiratoire)

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est préconisé pour calmer les toux sèches et les toux d'irritation.

ATTENTION DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Allergie à l'un des constituants.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES

- Ne pas traiter par ce médicament une toux grasse. Dans ce cas, la toux est un moyen de défense naturelle nécessaire à l'évacuation des sécrétions bronchiques.
- Si la toux devient grasse, s'accompagne d'encombrement, de crachats, de fièvre, demandez l'avis de votre médecin.
- En cas de maladie chronique (au long cours) des bronches ou des poumons s'accompagnant de toux avec crachats, un avis médical est indispensable.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

En cas de diabète ou de régime pauvre en sucre, tenir compte de l'apport de 3,4 g de saccharose par cuillère à café et de 10,3 g par cuillère à soupe.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NECESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS

- Saccharose
- Parahydroxybenzoate de méthyle
- Parahydroxybenzoate de propyle sodé
- Glycérol

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

Posologie

En l'absence d'efficacité, ne pas augmenter les doses au-delà de ce qui est préconisé, ne pas prendre conjointement un autre antitussif, mais consulter un médecin.

La posologie habituelle est de:

Adultes: 2 cuillères à soupe 3 fois par jour.

Enfants de 25 à 50 Kg (environ de 8 à 15 ans): 3 à 5 cuillères à soupe par jour.

Enfants de 15 à 25 Kg (environ de 4 à 8 ans): 1 cuillère à soupe 3 fois par jour.

En-dessous de 4 ans: se conformer à l'avis de votre médecin.

CE MEDICAMENT VOUS A ETE PERSONNELLEMENT DELIVRE DANS UNE SITUATION PRECISE:

- IL PEUT NE PAS ETRE ADAPTE A UN AUTRE CAS

- NE PAS LE CONSEILLER A UNE AUTRE PERSONNE

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale

DUREE DU TRAITEMENT

Ne pas dépasser 5 à 6 jours de traitement sans avis médical.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS.

Possibilité de réactions allergiques.

NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION: NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

SIGNEZ A VOTRE PHARMACIEN TOUT SIGNE VISIBLE DE DETERIORATION.

NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

Exploitant :

THERABEL LUCIEN PHARMA

123, rue Jules Guesde

92309 LEVALLOIS-PERRET cedex

France

DATE DE REVISION DE LA NOTICE

11/97

125 ml Médicament autorisé n° 304 765-7

250 ml Médicament autorisé n° 340 316-4

Fabricant :

Laboratoires THISSEN

B-1420 Braine-l'Alleud

Les Laboratoires THERABEL LUCIEN PHARMA participent à CYCLAMED, association chargée de la collecte et de l'élimination des déchets issus de médicaments vendus en France métropolitaine. Ils vous demandent en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament vide ou non.