

لا تتم بتغيير جرعة الدواء قبل أن تستشير الطبيب أولاً.  
استمر فيأخذ سيراليكس حسب توصية الطبيب. إذا توقف عنأخذ الدواء قبل المدة الموصى بها فإن أعراض مرضك قد تعود مرة أخرى. يوصى بإستماراة العلاج لمدة 6 شهور على الأقل بعد شعورك بالتحسن. في حالة أخذت سيراليكس بجرعة أكبر من اللازم إذا أخذت كمية أكبر من الجرعة الموصى بها من سيراليكس، فاتصل بالطبيب أو أقرب قسم طوارئ في المستشفى مباشراً. قد يذلك حتى لو لم تظهر عليك أي علامات مُزعجة. قد يكون من علامات الجرعة الزائدة الدوخة، الرجفان، النهيف، التشنج، الغيبوبة، الغثيان، القيء، تغير انتظام نبض القلب، إنفاس ضغط الدم وأختال توزن الألام والسوائل في الدم. خذ علبة سيراليكس معك عند ذهابك إلى الطبيب أو المستشفى.

إذا نسيت أن تأخذ سيراليكس لا تأخذ جرعة إضافية. قد يذلك حتى لو لم تظهر عليك أي علامات مُزعجة. قد يذلك حتى لو لم تنتبه إلى جرعة إضافية. قد يذلك حتى لو لم تنتبه إلى جرعة إضافية. إذا نسيت أن تأخذ سيراليكس.

لا تأخذ جرعة إضافية تتجاوز الجرعة التي نسيتها إذا نسيت أن تأخذ الجرعة. وتدبرت قبل هابك النوم خذها مباشراً. ثم خذ جرعة اليوم التالي المعتاد. إذا نذرت أثناء الليل أو في اليوم التالي، أترك الجرعة التي نسيتها خذ الجرعة العادة نفس اليوم.

إذا توقفت عن استخدام سيراليكس لا توقف عنأخذ سيراليكس حتى يطلب منك الطبيب ذلك. وعند إكمالك للمرة العلاجية، فإنه يُنصح بتحليل الجرعة تدريجياً لعدة أسابيع.

إذا توقفت عن استخدام سيراليكس وخاصة إذا كان ذلك يشكل مُفاجيء فقد تشعر بزوال أعراض المرض. وهذا معتاد عند التوقف عن العلاج بسيراليكس. ولكن مخاطر ذلك تزداد في حالة استخدام سيراليكس مدة طويلة أو بجرعات عالية أو تم تقليل الجرعة بصورة سريعة. معظم المرضى يشعرون بأن الأعراض المرضية قد خفت وذلت خلال أسبوعين، والبعض الآخر قد تكون لديهم الأعراض شديدة أو قد تطول المدة إلى (٣-٦) أشهر. في حالة شعورك بأعراض التوقف عن العلاج بسيراليكس فاتصل بالطبيب. قد ينصحك الطبيب بالعودة إلى أحد الأطباء مرة ثانية وإيقافها ببطء.

من أعراض التوقف عن العلاج: الشعور بالدوران (عدم الشات وفقدان التوازن) الشعور بوخز الدibus أو البرد، الإحساس باندراك عرق (وهذا غير شائع) أو صدمة كهربائية، اضطرابات النوم (الأحلام المزعجة، الكوابيس، عدم المقدرة على النوم)، الشعور بالقلق، الصداع، الشعور بالغثيان، التعرق (ويشمل التعرق البليي، عدم الشعور بالراحة أو الهيجان، الرجفان، الارتجاع أو فقدان الاتجاه، الشعور بالعاطفة أو سرعة الغضب، الإسهال، اضطرابات الرؤية، الرجفان أو خففان القلب).

إذا كان لديك أي إستفسارات إضافية عن استخدام هذا المستحضر فيرجي الاتصال بالطبيب أو الصيدلي.

#### ٤. الآثار الجانبية المحتملة

مثل جميع الأدوية، قد يُسبب هذا الدواء بعض الآثار الجانبية ولا يحصل ذلك مع كل المرضى. هذه الآثار الجانبية عادةً تتلاشي بعد أسبوعين قليلة من العلاج. ويجب أن تعلم بأن الكثيرون من هذه الآثار قد تكون من أعراض مرضك وسوف تتحسن مع العلاج.

راجع طبيبك في حالة ظهور أيٍ من الآثار الجانبية التالية عليك خلال فترة العلاج:

غير شائعة (قد يُؤثر في ١ من كل ٠٠٠ مستخدم):  
• تزيف غير معتاد، وفشل التزيف المعايير أو المعاو.

نادرة (قد يُؤثر في ١ من كل ٠٠٠٠٠ مستخدم):  
• إذا حدث لك تزور في الجلد أو اللسان أو الشفاه أو الوجه أو شعرت بصعوبات في التنفس أو البلع ، فاتصل بالطبيب أو توجه إلى المستشفى مباشراً.

• إذا شعرت بالغثيان أو سرعة القلب أو الارتجاع أو إرتعاش أو تقلصات للعضلات، فإن ذلك قد يكون علامة لحالة تسمى متلازمة السيروتونين. إذا شعرت بذلك فعليك الاتصال بالطبيب أو الذهاب إلى المستشفى مباشراً.

• صعوبة التبول.

• نوبات الصرع، إفراز الجزء الخاص بالاحتياطات والمخابرات.

• اصرار الجلد وابضاض العين هي علامات على احتلال وظائف الكبد أو إلتهاب الكبد الوبائي.

• بالإضافة إلى الآثار الجانبية المذكورة بالأعلى فقد تم رصد بعض الآثار الجانبية الإضافية كالتالي:

شائعة جداً (قد يُؤثر في أكثر من ١ في كل ١٠ مستخدم):  
• الشعور بالإعياء (الغثيان)

شائعة (قد يُؤثر في ١ من كل ٠٠٠ مستخدم):  
• إسداد أو سيلان الأنف (التهاب الجيوب الأنفية).

• زيادة أو نقصان الشهية.

• القلق، عدم الراحة، الأحلام المزعجة، الدوخة، صعوبات في النوم، الدوخة، التثاؤب، الرُّعاش، الشعور بالغثيان في الجلد.

• الإسهال ، الإمساك، القيء، جفاف الفم.

• زيادة التعرق.  
• أم في الخفافات وأمراض العين.

• اضطرابات الجنسية (تأخر القذف، مشاكل الانتصاب، قلة الرغبة الجنسية وقد يحصل صعوبة في التهيج الجنسي لدى النساء).

• الوجه، الوجه، المهم، زيادة الوزن.

غير شائعة (قد يُؤثر في ١ من كل ٠٠٠٠٠ مستخدم):  
• العدوانية، فقدان الشخصية، الهالوسة.

• بُطء خفقان القلب.

غير معروفة (لا يمكن توقع تكرار ذلك من المعلومات المتوفرة):  
• التفكير في إذاء النفس أو الاتجار "إقرأ الجزء الخاص بالاحتياطات والمخابرات".

• انخفاض مستوى الصوديوم في الدم (من أعراض ذلك الشعور بالإعياء مع وهن العضلات أو الارتجاع).

• الدوخة عند الارتفاع يسبب اضطرابات الرؤية، جريان الدموع.

• تساقط الشعر.

• ازدياد التزف خلال الدورة الشهرية.

• عدم انتظام مدة الدورة الشهرية.

• نقصان الوزن.

• سرعة خفافن القلب.

• تورم الذراعين أو الساقين.

• تزيف الأنف.

نادرة (قد يُؤثر في ١ من كل ٠٠٠٠٠ مستخدم):  
• العدوانية، فقدان الشخصية، الهالوسة.

• بُطء خفقان القلب.

غير معروفة (لا يمكن توقع تكرار ذلك من المعلومات المتوفرة):  
• التفكير في إذاء النفس أو الاتجار "إقرأ الجزء الخاص بالاحتياطات والمخابرات".

• انخفاض مستوى الصوديوم في الدم (من أعراض ذلك الشعور بالإعياء مع وهن العضلات أو الارتجاع).

• الدوخة عند الارتفاع يسبب اضطرابات الرؤية، جريان الدموع.

• تساقط الشعر.

• ازدياد احتمامات مخاطر كسور العظام لدى المرضى الذين يأخذون مثل هذا النوع من الأدوية.

يضاف إلى ذلك، عدد من الآثار الجانبية المعلوم حدوثها مع الأدوية التي تعلم بنفس الطريقة التي يعمل بها سيراليبرام (المادة الفعالة في العلاج المزمعة، الدوخة، صعوبات في النوم، الدوخة، التثاؤب، الرُّعاش، الشعور بالغثيان في الجلد).

• فقدان الشهية.

• تدفق البول عند الرجال والنساء العين مرضعات.

• زيادة الوزن.

غير شائعة (قد يُؤثر في ١ من كل ٠٠٠٠٠٠ مستخدم):  
• اضطرابات النزف ويشمل النزف في المخاطي ونقص مستوى الصفائح الدموية.

• التورم الفوجالي للجلد أو الغشاء المخاطي.

• زيادة كمية البول.

• تدفق البول عند الرجال والنساء العين مرضعات.

• اضطرابات الأمعاء.

• أم عند الانتصاب (الفسخ).

• اضطرابات النزف ويشمل النزف في المخاطي ونقص مستوى الصفائح الدموية.

• التورم الفوجالي للجلد أو الغشاء المخاطي.

• زيادة كمية البول.

• اضطرابات الأمعاء.

• اض