

بروسميد[®]

بيكلوتاميد

إصفار الجلد أو العينين، إسوداد البول، وألم في الصدر.

الاحتياطات الواجب اتخاذها عند تناول بروسميد

يجب تخفيض дозу بروسميد للأطفال لأنهم لم يتم التحقق بعد من أمانة استعماله وفعاليته. ينتشر طبیبک في حال كنت مصاباً بأحد أمراض اللدغ قبل تناول بروسميد.
ما هي الحالات التي يجب الامتناع فيها عن تناول بروسميد؟
امتنع عن تناول بروسميد في حال كنت تعاني من حساسية لهذا العقار أو لأي من مكوناته.

ما العمل في حالات الحمل والرضاعة؟

توصف الأدوية المضادة لهرمونات الذكورة غير الستيرويدية للرجال عادة، لكن، في حال احتاجت المرأة إليها، من المهم جداً اعتماد طريقة علاج تمنع الحمل في خلال فترة تناول هذا العلاج. وبما أن مضادات هرمونات الذكورة غير الستيرويدية تكتسب تأثيراً مماثلاً للستيرويدات، فقد تؤثر على نمو الجنين الذكري الطبيعي.

كيف يحفظ بروسميد؟

يُحفظ بروسميد في مكان لا تتعدى الحرارة فيه 30 درجة مئوية.
يُحفظ في العبوة الأصلية بحالة سلامة.

تاريخ مراجعة النشرة: شباط ٢٠١٥

الأشكال والعبوات

بروسميد، أقراص ملتبسة بالفيلم، ٣٠ قرص في العبوة.

التراكب

بروسميد، بحتوي كل قرص ملتبس بالفيلم على ٥٠ ملغ من العامل الفعال بيكلوتاميد.

المواد غير الفعالة: لاكتوز، كروسيوفيتون، بوفيدون، ماغنيزيوم ستيرات، هيرموز، ثياني أكسيد النيتانيوم، مكروغول.

لماذا يجب أن تتناول بروسميد؟

الفئة العلاجية: معالجة صحاوية.

الرمز الكيميائي للعلمي التشريحي (ATC): L02BB03: 1.

يوصى بروسميد معالجة سلطان البروستاتة (الموث)، إما لوحده أو بالتزامن مع أدوية أخرى. يمكن استخدام بروسميد أيضاً لمعالجة حالات أخرى يحدّث عنها طبیبک. إن بروسميد هو مضاد لهرمونات الذكورة غير ستيرويدي، يقوم بكتاب مفعول هرمون الشستوستيرون.

ما هي المعلومات الضرورية حول بروسميد؟

قد يسبب دواء بروسميد التلوّخة، لذا يجب أن تلتافي قيادة المركبات، أو تشغيل الآلات، حين تتحقّق من كيّمية إستجابة جسدك للدواء.

ما هي الجرعات الموصى بها من بروسميد؟

للبالغين

المعالجة سلطان البروستاتة (الموث)، قرص واحد يومياً.

كيف يتم تناول بروسميد؟

تقد بارشادات طبیبک بتحذيرها وتناول بروسميد في الموعد ذاته من كل يوم. يمكن تناول بروسميد مع الطعام أو من دونه.

ما العمل عند تفويت موعد إحدى الجرعات؟

تناول القرحة التي فوتها حالما تدرك أنك نسيتها. في حال تذكرت ذلك في وقت قريب من موعد القرحة التالية، أهل القرحة التي فوتها واستأنفت برنامج العلاج المعتاد. لا تتناول جرعتين في الوقت نفسه.

ما العمل عند تناول جرعة مفرطة؟

في حال شُكّت في أنك تناولت جرعة مفرطة، إستشير طبیبک فوراً.
هل من تداخل بين بروسميد وآي دواء أو طعام؟

يجوز تناول بروسميد مع معظم الأدوية الأخرى، لكن يجب إستشارة طبیبک قبل تناول بروسميد بالتزامن مع الأدوية المضادة للتختثر المقوية مثل الوارفارلين (Warfarin). أعلم طبیبک في حال كنت تتناول أدوية أخرى، أكملت موصفة أو غير موصفة، أو مستحضرات عشبية، أو مكمّلات غذائية.

يجب تلافي تناول بروسميد بالتزامن مع المشروبات الكحولية لأن من شأن ذلك أن يقلص قدرتك على القيادة أو على القيام بمهام خطيرة.

ما هي التأثيرات الجانبية لبروسميد؟

تتضمن التأثيرات الجانبية الأكثر شيوعاً ما يلي:

القلق، الاكتئاب، الارق، التلوّخة، تلاشي القوى، الألم في الظهر، الألم في العظام، ضعف في العضلات، الغثيان، عسر الهضم، الغازات، الألم في الحوض، تبول متواتر، عدم القدرة على التحكم بالملائكة، حصص البول، العانة، انخفاض لقمة الحسنية، التهاب القصبات الهوائية، الشعال، التهاب الحلق، هبات حرارة، أحاسيس حلدية غير عاديّة، التعرق، تغير في الوزن.

احرص على إستشارة طبیبک في حال تعرضت لأيٍ من التأثيرات الجانبية الخيمية التالية: رذات فعل حساسية مادة (الطفح الجلدي، صعوبة في التنفس، ضيق في الصدر، ظهور ونمطٍ في الفم، والوجه، والشظف، والسان)، أعراض شبيهة بعارض الإنفلونزا (الزلة الواقف)، صعوبة في التنفس، التهاب رئوي، الألم في المعدة، فقدان الشهية، الغثيان، القيء، الألم في العضلات، حساسية مؤلمة في نصف قوس الفك الأعلى من جهة اليمين،

هذا دواء:

- الدواء يستحضر بورث على صحتك، واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتّبع وصفة الطبيب بدقة، وارشادات الاستعمال، وتعليمات الصيدلاني الذي صرّفها لك.
- إن الطبيب والصيدلاني هما الخبراء في الأدوية، فوادها ومحظّتها.
- لا تقطع فترات العلاج المحددة لك من تناول نفسك.
- لا تكرر نفس الوصفة دون استشارة طبیبک.

حافظ على الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال.

بيان شرعي.
متصرف ملتبس العبوة
وأحد المسئولية العرب