

## نشرة العبوة: معلومات للمريض

إيربيوس 0.5 ملغم/مل محلول فموي

بيسولوراتدين

يُرجى قراءة هذه النشرة كاملةً بعناية قبل أن تبدأ في تناول هذا الدواء، لأنها تحتوي على معلومات هامةٍ بالنسبة لك.

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج إلى قرائتها مرةً أخرى.

- إذا كانت لديك أيامٌ إضافيةٌ أخرى، فاستشر طبيبك، أو الصيدلي، أو الممرض الخاص بك.

- تم وصف هذا الدواء لك وحده، فلا تطهله لآخرين؛ فقد يضر بهم، حتى إذا كانوا يُعانون من نفس علامات المرض التي تعاني منها.

- إذا أصبت بأية أعراض جانبية، فتحثث إلى طبيبك أو الصيدلي أو الممرض. يشمل ذلك أيامٌ إضافيةٌ مُحتملة، غير المدرجة في هذه النشرة. انظر قسم: 4.

محتويات هذه النشرة:

1. ما هو عقار إيربيوس محلول فموي؟ وفيما يستخدم؟

2. ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل تناول عقار إيربيوس محلول فموي؟ وفيما يستخدم؟

3. كيفية تناول عقار إيربيوس محلول فموي

4. الأعراض الجانبية المُحتملة

5. كيفية تخزين عقار إيربيوس محلول فموي

6. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

1. ما هو عقار إيربيوس محلول فموي؟ وفيما يستخدم؟

ما هو عقار إيربيوس؟

يحتوي عقار إيربيوس على مادة بيسولوراتدين المضادة للميستامين.

كيف يُعمل عقار إيربيوس؟

عقار إيربيوس محلول فموي هو دواء مضاد للحساسية لا يسبب التهاب، وهو يُساعد على التحكم في تفاعلات الحساسية وأعراضها لديك.

من يُجب استخدام عقار إيربيوس؟

يُخفف عقار إيربيوس محلول فموي من الأعراض المصاحبة لالتهاب الأنف التحسسي (التهاب في المرات الأنفية تسببه الحساسية، على سبيل المثال: حُمُّى القش أو حساسية تجاه عُث الغبار) في البالغين والمرأهقين والأطفال الذين يُعانون من العمر عاماً واحداً فما فوق. تشمل هذه الأعراض: عطسًا وسيلانًا أو حكة بالأنف وحكة في الحلق وحكة أو أحمرار أو إدماع العينين.

يُستخدم أيضًا عقار إيربيوس محلول فموي لخفيف الأعراض المصاحبة لمرض الارتكاريا (حالة جاذبة تسببها الحساسية). تشمل هذه الأعراض: حكة وشُرى (ارتكاريا).

يسترم تخفيف هذه الأعراض لمدة يوم كامل، مما يُساعدك على استئناف نشاطاتك اليومية المعتادة ويساعدك على النوم.

2. ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل تناول عقار إيربيوس محلول فموي؟

لا تتناول عقار إيربيوس محلول فموي في الحالات التالية:

- إذا كنت تعاني من حساسية تجاه بيسولوراتدين أو أيٍ من مكونات الدواء الأخرى (المدرجة في قسم: 6) أو تجاه اللوراتدين.

تحذيرات واحتياطات

تحثث إلى طبيبك أو الصيدلي أو الممرض (أ) قبل تناول عقار إيربيوس:

- إذا كنت تعاني من قصور بوظائف الكلى.

- إذا كان لديك تاريخ طبي أو عائلي من الإصابة ببنوبات.

الاستعمال في الأطفال والمرأهقين

لا تُنصح هذه الدواء للأطفال دون سن عام واحد.

تناول أدوية أخرى مع عقار إيربيوس

لا تُنصح تناولات دوائية معروفة لعقار إيربيوس مع أدوية أخرى.

يرجى إبلاغ طبيبك أو الصيدلي الخاص بك إذا كنت تتناول أو تتناول مؤخرًا أو قد تتناول أيةً أخرى.

تناول عقار إيربيوس محلول فموي مع الأطعمة والمشروبات والكحوليات يمكن تناول عقار إيربيوس مع الطعام أو بدونه.

يرجى توخي الحذر عند تناول عقار إيربيوس مع الكحوليات.

الحمل والرضاعة الطبيعية والخصوصية

إذا كنت حاملاً أو مرضعاً، أو تعقين أنك قد تكون حاملاً أو تخططن لذلك، فاستشيري طبيبك أو الصيدلي الخاص بك قبل تناول هذا الدواء.

لا يوصى بتناول عقار إيربيوس محلول فموي إذا كنت حاملاً أو مرضعاً.

الخصوصية

لا تُوجد بيانات متحركة حول الخصوصية في الذكور/ الإناث.

القيادة واستخدام الآلات

عند تناول الجرارات المُوصى بها، من غير المتوقع أن يؤثر استخدام هذا الدواء في القدرة على القيادة أو استخدام الآلات. على الرغم من أن معظم الأشخاص لا يُعانون من التهاب.

يُوصى بعدم الشروع في الأنشطة التي تتطلب بيقظة ذهنية، مثل قيادة السيارات أو تشغيل الآلات حتى تتأكد من كافية استجابتكم للتأثير الذري.

يحتوي عقار إيربيوس محلول فموي على سوربيتون (E420) بكل مللي لتر من المحلول الفموي.

السوربيتون هو أحد مصادر الفركتوز. إذا كان طبيبك قد أخبرك أنه لا يتحمل (أو أن طفلك لا يتحمل) بعض أنواع السكريات أو إذا كان قد تم تشخيصك بعدم التحمل الوراثي للفركتوز، وهو اضطراب جيني نادر يعزر الشخص بسببه عن حل الفركتوز، فتحثث إلى طبيبك قبل أن تتناول أو تلقي (أو يتناول أو يلقي طفلك) هذا الدواء.

يحتوي عقار إيربيوس محلول فموي على جليكول البروبيلين (E1520) بكل مللي لتر من المحلول الفموي.

يحتوي عقار إيربيوس محلول فموي على الصوديوم بشكل أساسي.

يحتوي عقار إيربيوس محلول فموي على الكحول البنزيلي.

يحتوي هذا الدواء على 0,75 مجم من الكحول البنزيلي بكل مللي لتر من المحلول الفموي.

قد يُسبب الكحول البنزيلي تفاعلات حساسية.

لا تُنصح للأطفال لتناوله دون طرق الفم.

اطلب المشورة من الطبيب أو الصيدلي الخاص بك إذا كنت تعاني من مرض بالكبد أو الكلى. ذلك لأنه قد تراكم كميات كبيرة من الكحول البنزيلي في جسمك ما قد يسبب آثارًا جانبية (تسمى "الحملان الاستقلالي").

اطلب المشورة من الطبيب أو الصيدلي الخاص بك إذا كنت حاملاً أو مرضعاً. ذلك لأنه قد تراكم كميات كبيرة من الكحول البنزيلي في جسمك ما قد يسبب آثارًا جانبية (تسمى "الحملان الاستقلالي").

3. كيفية تناول عقار إيربيوس محلول فموي على السوربيتون (E420)

تناول دائمًا هذا الدواء بالضبط كما أخبرك طبيبك أو الصيدلي الخاص بك. راجع طبيبك أو الصيدلي الخاص بك إذا لم تكن متأكداً من كيفية الاستخدام.

الأطفال

الأطفال بعمر 1 إلى 5 أعوام:

الجرعة الموصى بها هي 2.5 مل (نصف ملعقة قدرها 5 مل) من المحلول الفموي مرة واحدة يومياً.

الأطفال بعمر 6 إلى 11 عاماً:

الجرعة الموصى بها هي 5 مل (ملعقة واحدة قدرها 5 مل) من المحلول الفموي مرة واحدة يومياً.

البالغون والمرأهقون الذين يُعانون من العمر 12 عاماً فأكثر:

الجرعة الموصى بها هي 10 مل (ملحقان قدرهما 5 مل) من المحلول الفموي مرة واحدة يومياً.

في حال كانت زجاجة المحلول الفموي مُزودة بسربنجة قياس فموية، يمكنك استخدامها لتناول الكمية المناسبة من المحلول الفموي.

هذا الدواء للتناول عن طريق الفم.

ابلع جرعة المحلول الفموي ثم اشرب بعض الماء. يمكنك تناول هذا الدواء مع الطعام أو بدونه.

في حالة ظهور التهاب الأنف التحسسي لديك على فترات متقطعة (وجود أعراض لأقل من 4 أيام في الأسبوع أو أقل من 4 أسابيع)، فسيقترح عليك طبيبك جدولًا للعلاج يعتمد على تقييم تاريخ مرضك.

في حالة ظهور التهاب الأنف التحسسي لديك بشكل مستمر (وجود أعراض لمدة 4 أيام في الأسبوع وأكثر من 4 أسابيع)، فقد يقترح عليك طبيبك فترة علاج أطول.

بالنسبة للأرتكاري، قد تناولت فترات علاج من مريض لآخر؛ ولذلك يجب عليك اتباع تعليمات طبيبك.

إذا تناولت كمية أكثر مما يجب من عقار إيربيوس محلول فموي

تناول عقار إيربيوس محلول فموي فقط كما تم وصفه لك. من غير المتوقع حدوث مشاكل خطيرة عند التناول العارض لجرعة زائدة. مع ذلك، إذا تناولت كمية من عقار إيربيوس محلول فموي أكثر من التي أخبرك بها طبيبك، فإبلغ طبيبك أو الصيدلي أو الممرض جدولًا للعلاج يعتمد على تقييم تاريخ مرضك.

إذا أغفلت تناول جرعة في الوقت المحدد، فتناولها في أسرع وقت ممكن ثم عاود الاستمرار في جدول جرعة المعتاد. لا تتناول جرعة مضاعفة لتعويض جرعة أغفلتها.

إذا توقفت عن تناول عقار إيربيوس محلول فموي إذا كانت لديك أيام إضافية حول استخدام هذا الدواء، فاستشير طبيبك أو الصيدلي أو الممرض الخاص بك.

إرهاق

جفاف الفم

صداع

الأطفال

شائعة لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين: قد تُسبب هذه الأعراض أعراضًا جانبية، على الرغم من عدم حدوثها لدى الجميع.

الاعراض الجانبية الشديدة (صعوبة في التنفس وأزيز بالصدر وحكة وشُرى [ارتکاريا] وتورُّم). إذا لاحظت أيًّا من هذه الأعراض الجانبية الخطيرة، توفر علاجًا مُناسبًا.

في الدراسات السريرية التي تم إجراؤها، كانت الأعراض الجانبية التي تمت ملاحظتها لدى الأطفال والبالغين الذين تقل أعمارهم عن عامين شديدة (صعوبة في التنفس وأزيز بالصدر وحكة وشُرى [ارتکاريا] وتورُّم). إذا لاحظت أيًّا من هذه الأعراض، توفر علاجًا مُناسبًا.

عند تقييم محلول أو فرض، وخفاف الصناعية.

تغيرات بالطريقة التي ينبع منها القلب

سلوك غير طبيعي

دوافع

زيادة الوزن، زيادة الشهية

مزاج مكتسب

جفاف العينين

الإفراط

غير معروفة: لا يمكن تقدير معدل التكرار من واقع البيانات المتاحة

ضعف غير مُعترد

ارتفاع ضربات القلب

تغيرات بالطريقة التي ينبع منها القلب

عوانية غير طبيعي

الإفراط عن الأعراض الجانبية

إذا أصبت بأية أعراض جانبية، فتحثث إلى طبيبك أو الصيدلي أو المرض. يشمل ذلك أيام إضافية حول المعلومات حول المرض.

يمكنك المساعدة في توفير المزيد من المعلومات حول المرض.

4. الأعراض الجانبية المُحتملة

مثله مثل كافه الأدوية، قد تُسبب هذه الأدواء أعراضًا جانبية، على الرغم من عدم حدوثها لدى الجميع.

الاعراض الجانبية الشديدة (صعوبة في التنفس وأزيز بالصدر وحكة وشُرى [ارتکاريا] وتورُّم).

في الدراسات السريرية على عقار إيربيوس، تم الإبلاغ عن الأعراض الجانبية التالية:

شائعة: قد يُؤثر على شخص واحد من كل 10 أشخاص

أرقة

إفراط

جفاف الفم

صداع

الأطفال

شائعة لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين: قد تُسبب الأعراض الجانبية التالية:

إسهال

حكة

أرقة

أثناء تناول عقار إيربيوس، تم الإبلاغ عن الأعراض الجانبية التالية:

نادرة جدًا: قد يُؤثر في ما يصل إلى شخص واحد من كل 10000 شخص

نادرة جدًا: قد يُؤثر في ما يصل إلى شخص واحد من كل 1000 شخص

نادرة جدًا: قد يُؤثر في ما يصل إلى شخص واحد من كل 100 شخص

نادرة جدًا: قد يُؤثر في ما يصل إلى شخص واحد من كل 10 شخص

نادرة جدًا: قد يُؤثر في ما يصل إلى شخص واحد من كل 1000 شخص

نادرة جدًا: قد يُؤثر في ما يصل إلى شخص واحد من كل 10000 شخص

نادرة جدًا: قد يُؤثر في ما يصل إلى شخص واحد من كل 100000 شخص

نادرة جدًا: قد يُؤثر في ما يصل إلى شخص واحد من كل 1000000 شخص

غير معروفة: لا يمكن تقدير معدل التكرار من واقع البيانات المتاحة

ارتفاع ضربات القلب

التشنج

التشنج