

فينتولين إيفوهيلر ١٠٠ ميكروجرام سالبوباتامول (على هيئة كريات)

يرجى قراءة هذه النشرة الطبية كاملة بعناية قبل البدء في استخدام هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لك.
• لاحظ بهذه النشرة الطبية. فقد تحتاج إلى قرائتها مرة أخرى.
• إذا كانت لديك أية استفسارات أخرى حول مرضك أو دوائك يجب سؤال طبيبك أو الممرضة أو الصيدلاني.
• تم وصف هذا الدواء لك أنت فقط. فلا يجوز إعطاؤه للأخرين. فقد يؤذنهم حتى لو كانت لديهم نفس العلامات المرضية الموجودة لديك.
• يجب استشارة الطبيب أو الممرضة أو الصيدلاني إذا تعرضت لأي من الآثار الجانبية ويشمل ذلك أية آثار جانبية محتملة غير واردة في هذه النشرة. انظر القسم ٤.

- ١ معلومات عن بخاخة فينتولين إيفوهيلر و دواعي استعمالها
- ٢ معلومات يجب معرفتها قبل استخدام بخاخة فينتولين إيفوهيلر
- ٣ كيفية استخدام بخاخة فينتولين إيفوهيلر
- ٤ الآثار الجانبية المحتملة
- ٥ كيفية تخزين بخاخة فينتولين إيفوهيلر
- ٦ محتويات العبوة ومعلومات أخرى

٣ كيفية استخدام فينتولين إيفوهيلر

- يجب دائمًا استخدام هذا الدواء بدقة وفقًا لتعليمات الطبيب، كما يجب استشارة طبيبك أو الممرضة أو الصيدلي في حالة عدم التأكد.
- البالغين والمرأهقين الذين تتجاوز أعمارهم بين ١٢ سنة وما فوق • لخفيف الربو - بخاخة واحدة أو اثنان.
- للوقاية من الربو - بخاخ قبل ١٠ إلى ١٥ دقيقة من التمارين أو التعرض لأية "محفز".
- للعلاج المتناظرة - بخاخ يصلان إلى ٤ مرات في اليوم.
- الحد الأقصى للجرعة هو ٨ بخاخات في فترة ٢٤ ساعة.
- الأطفال دون سن ١٢ سنة
- لخفيف الربو - بخاخة واحدة. بخاخ اثنان إذا لزم الأمر.
- للوقاية من الربو - بخاخة واحدة قبل ١٠ إلى ١٥ دقيقة من التمارين أو التعرض لأية "محفز". بخاخ اثنان إذا لزم الأمر.
- للعلاج المتناظرة - بخاخ يصلان إلى ٤ مرات في اليوم.
- الحد الأقصى للجرعة هو ٨ بخاخات في فترة ٢٤ ساعة.

تعليمات الاستخدام

- بخاخة فينتولين إيفوهيلر تنتج رذاذاً بسيطاً، تستنشق عن طريق الفم في رئتيك. يجب أن يوضح لك طبيبك أو الممرضة أو الصيدلي كيفية استخدام جهاز Haleraid ربما يجعل الأمر أكثر سهولة.
- المرضة أو الصيدلاني.
- توفر كل علبة بخاخة إيفوهيلر ٢٠٠ بخاخة.

- لا تستخدم جهاز الاستنشاق أكثر مما وصفه لك الطبيب. أخبر طبيبك إذا انخفضت فاعلية العلاج على غير المعتاد، قد تكون مشكلة مصدرك تزداد سوءاً وقد تحتاج لدواء مختلف. قد يوصي طبيبك أن تأخذ أكثر من هذا كعلاح في حالات الطوارئ إذا صار الأزيز أو التنسس سيناً للغاية. من المهم جداً أن تحافظ على تعليمات الطبيب فيما يتعلق بعدد البخاخات التي يجب أخذها وعدد مرات استخدام جهاز الاستنشاق الخاص بك.

اختبار البخاخة

- عند استخدام البخاخة لأول مرة، يجب اختباره للتأكد من أنها تعمل.
- قم ب Zarahle الطعام من على جزء الفم بالضغط برفق على جانبي الغطاء بالإبهام والسبابة وسحبه للخارج.
- للتأكد من أنها تعمل، قم برجها جيداً، وقم بتجويه جزء الفم بعيداً عنه، واضغط على العبوة لإخراج بخاخة في الهواء. إذا لم تكن قد استخدمنا البخاخة لمدة ٥ أيام أو أكثر، قم برجها جيداً وإخراج بخاخين من الدواء في الهواء.

- استخدم البخاخة من المهم بدء التنفس ببطء قدر المستطاع قبل استخدام البخاخة مباشرة.

- قف أو اجلس في وضع مستقيم عند استخدام البخاخة.
- قم ب Zarahle غطاء جزء الفم (كما هو موضح في الصورة الأولى).
- افحص داخل وخارج جزء الفم للتأكد من أنه نظيف وخالي من أي شيء.

- ٣ برج البخاخة ٤ أو ٥ مرات للتخلص من أي آثاء غير محكمة و للتأكد من اختلال محتويات البخاخة بالتساوي.

- ٤ امسك البخاخة في وضع مستقيم مع وضع الإبهام على القاعدة أسفل جزء الفم. قم بالزفير لأطول فترة ممكنة بالقدر الذي لا يضايقك. لا تقم بالشهيق مرة أخرى.

- ٥ ضع جزء الفم في فمك بين أسنانك. اطبق شفتيك حوله. لا تعض.

- ٦ قم بالشهيق عن طريق الفم. بمجرد بدء الشهيق، اضغط للأعلى على الجزء العلوي من العبوة لإخراج بخاخة من الدواء. قم بذلك أثناء الشهيق بشكل ثابت وبعمق.

- ٧ احبس شفتيك وأخرج البخاخة من الفم وبعد إبعادك من على أعلى البخاخة، استمر في حبس نفسك لبعض ثوانٍ لأطول فترة ممكنة بالقدر الذي لا يضايقك.

- آثار جانبية نادرة جداً (قد تصيب حتى شخص واحد من بين كل ١٠٠٠ شخص)
 - تغيرات في أنماط النوم وفي السلوك، على سبيل المثال التأمل والاستثنائية.
- يمكن أن تحدث الآثار الجانبية التالية أيضاً ولكن معدل تكرارها غير معروف:
 - ألم في الصدر، ناشئ عن مشكلات في القلب مثل النوبة. في حالة حدوث أي من هذه الآثار، أخبر طبيبك أو الممرضة أو الصيدلي. لا تتوارد عن استخدام هذا الدواء ما لم يطلب منك ذلك.

٤ كيفية تخزين فينتولين إيفوهيلر

- يجب حفظه بعيداً عن مرأى وتناول الأطفال.
- قم بتخزينه في درجة حرارة أقل من ٣٠ درجة مئوية. قم بحملته من الصقوع وشاشة الشمس المباشرة.
- إذا أصبحت البخاخة باردة للغاية، قم بإخراج العبوة المعدنية من العلبة البلاستيكية وت BXSHINها حتى يدك ليوضع دفائق قبل الاستخدام.
- لا تستخدم أي شيء آخر لت BXSHINها.
- العلبة المعدنية ضخمة. لا تقم بت BXSHINها أو كسرها أو حرقها حتى لو كان فارغاً على ما يدور.
- لا تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، وهو مذكور على الملصق والكرتون بعد كلمة "EXP".
- لا تخلص من أي دوامة عن طريق مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. أسلال الصيدلاني عن الطريقة المناسبة للتخلص من الأدوية التي لم تعد تستخدمها. هذه الإجراءات من شأنها المساعدة في حماية البيئة.

٥ محتويات العبوة ومعلومات أخرى

- ما يحتوي فينتولين إيفوهيلر
 - المادة الفعالة هي سالبوباتامول (على هيئة كريات).
 - المكون الآخر هو HFA 134a.
- ما هو شكل فينتولين إيفوهيلر و محتويات العبوة
 - يشمل فينتولين إيفوهيلر على سبيكة المنيوم يمكن إغلاقها بضم قياس ومحرك وفتحة غبار.
 - تحتوي كل علبة على ٢٠٠ جرعة من ١٠٠ ميكروجرام من السالبوباتامول (على هيئة كريات).

إنتاج:

- Glaxo Wellcome Production*, Evreux, France.
* شركة تتبع إلى مجموعة شركات GSK العلامات التجارية المملوكة أو مُؤَرِّخة لجموعة شركات GSK.
© حقوق الطبع محفوظة لمجموعة شركات GSK أو الجهات الترخيص لها.
- يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني التالي:
gulf.safety@gsk.com
بالمنتجات أو الآثار الجانبية المرتبطة باستخدام منتجات شركة GSK تمت آخر مراجعة لهذه النشرة في نوفمبر ٢٠١٩.

ان هذا الدواء:

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- فالطبيب والصيدلاني هما الخبران بالدواء وبنفعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.
- لا ترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيادة العرب

٤ الآثار الجانبية المحتملة

- إذا أصبحت تنفسك أو الأزيز الذي تعاني منه أسوأ بعد استخدام هذا الدواء مباشرة، فتوقف عن استخدام فينتولين إيفوهيلر و استشر طبيبك على الفور. تشمل علامات التفاعل التحسسي ما يلي: تورم الوجه أو الشفتين أو الفم أو اللسان أو الحلق، مما قد يسبب صعوبة في البلع أو التنفس، وطفح جاهي حاد، وشعور بالإغماء والدوار، والهبوط. يجب استشارة الطبيب على الفور في الحالات التالية:
 - عندما تشعر بضربات قلب أسرع أو أقوى من المعتاد (حالات الخفف). عادةً ما يكون ذلك غير مضر، وعادةً ما يزول هذا الشعور بعد استخدام الدواء لفترة من الوقت.
 - قد تشعر بضربات قلبك غير متوقعة أو زانة.
 - قد تصيب هذه الآثار حتى شخص واحد من بين ١٠ أشخاص.
- إذا حدثت لك أي من هذه الآثار، فتحذر إلى طبيبك بأسرع ما يمكن. لا تتوارد عن استخدام هذا الدواء ما لم يطلب منك ذلك.
- أخير طبيبك إذا حدثت لك أي من الآثار الجانبية التالية، أيضًا مع استخدام هذا الدواء:
 - آثار جانبية شائعة (قد تصيب حتى شخص واحد من بين كل ١٠٠ شخص)
 - الشعور بالارتباك.
 - الصداع.
 - آثار جانبية غير شائعة (قد تصيب حتى شخص واحد من بين كل ١٠٠ شخص)
 - تبيّح الفم والحلق.
 - التشنجات العضلية.
 - آثار جانبية نادرة (قد تصيب حتى شخص واحد من بين كل ١٠٠٠ شخص)
 - انخفاض مستوى البوتاسيوم في الدم.
 - زيادة تدفق الدم في أطراف الجسم (توسيع الأوعية الدموية المحيطية)

- ١ لا تستخدم بخاخة فينتولين إيفوهيلر في الحالات التالية:
 - إذا كنت لديك حساسية لأدوية سالبوباتامول أو أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء (المذكورة في القسم ٦).
 - إذا كنت على شæk الولادة قبل الولادة (الولادة المبكرة) أو معرضة للجلطات بشكل مفاجئ.

تحذيرات واحتياطات

- تحدث إلى طبيبك أو الممرضة أو الصيدلاني قبل استخدام فينتولين إيفوهيلر في الحالات الآتية:
 - إذا كان مرض الرئو لديك نشط (على سبيل المثال، تعاني من أعراض متكررة أو نوبات احتدام أو قرحة جسدية محدودة). قد يبدأ طبيبك في وصف دواء أو يزيد من جرعة دواء لعلاجك من مرض الرئو، على سبيل المثال كورتيكosteroid للاستنشاق.
 - إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم
 - إذا كنت تتناول أدوية لارتفاع ضغط الدم أو أحد أمراض القلب.
 - إذا كنت تتناول أدوية أخرى تتناولها لارتفاع ضغط الدم أو وجود ذبحة.
 - إذا كنت تتناول مشقات الزانين (مثل ثيوفيليلين) أو السيتيروبود للارتفاع.
 - إذا كنت تتناول أدوية أخرى تتناولها لارتفاع ضغط الدم أو أحد أمراض القلب.

فينتولين إيفوهيلر والأدوية الأخرى

- آخر طبيبك أو الممرضة أو الصيدلاني إذا كنت تتناول، أو قد تتناول، مؤخرًا، أو قد تتناول أي أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية التي يتم الحصول عليها دون وصفة طبية. ويشمل ذلك الأدوية العشبية. وتحذر أخذ هذا الدواء معك إذا كنت ستشهد إلى المستشفى. ينبغي إخبار طبيبك أو الممرضة أو الصيدلاني في حالة استخدام أي من الأدوية التالية على وجه الخصوص:
 - أدوية لعلاج عدم انتظام أو سرعة ضربات القلب.
 - أدوية أخرى تتناولها لعلاج احتدام أو قرحة جسدية.
 - استخدام فينتولين إيفوهيلر مع الطعام والشراب.
 - يمكنك استخدام فينتولين إيفوهيلر في أي وقت أثناء اليوم، مع الطعام أو بدونه.
- إذا كنت حاملًا أو ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، أو تعتقدين أنك حامل أو تحظين بإنجاب، فاستشيري طبيبك أو الممرضة أو الصيدلاني قبل استخدام هذا الدواء.
- القيادة واستخدام الآلات
 - لا يؤثر فينتولين على قدرتك على القيادة أو استخدام أي أدوات أو آلات.