

بيزوكور®

بيزوكور لول فومارات

الأشكال والعبوات

بيزوكور ٢٥: أقراص ملصبة بالفilm: علبة من ٣٠ قرصا.

بيزوكور ٥: أقراص ملصبة بالفilm: علبة من ٣٠ قرصا.

التركيب: بيزيوكور ٥: أقراص ملصبة بالfiml: علبة من ٣٠ قرصا.

بيزوكور ٢٥: يحتوي كل قرص ملصب بالfilm على ٢٥ مل من العامل الفعال

بيزوكور لول فومارات.

السواغات: لاكتور، سلولوز بولي مكروي، فسفاط ثنائية الكالسيوم، كروسيوفيدون،

ثاني أكسيد السيليكون الغرواني، ماغنيزيوم ستارات، هيدروكسي بروبيل ميثيل

السلولوز، غليوكول بولي إيتيلين، تالك، ثانوي أكسيد النيتريوم.

بيزوكور ٥: يحتوي كل قرص ملصب بالfilm على ٥ مل من العامل الفعال بيزيوكور لول

فومارات.

السواغات: لاكتور، سلولوز بولي مكروي، فسفاط ثنائية الكالسيوم، كروسيوفيدون،

ثاني أكسيد السيليكون الغرواني، ماغنيزيوم ستارات، كحول البولي فينيل، صمغ

الزانثان، لسيتين، غليوكول بولي إيتيلين، تالك، ثانوي أكسيد النيتريوم، تارترازين.

بيزوكور ١٠: يحتوي كل قرص ملصب بالfilm على ١٠ مل من العامل الفعال بيزيوكور لول

فومارات.

السواغات: لاكتور، سلولوز بولي مكروي، فسفاط ثنائية الكالسيوم، كروسيوفيدون،

ثاني أكسيد السيليكون الغرواني، ماغنيزيوم ستارات، كحول البولي فينيل، البولي إيتيلين

جلوكول، بيكربونات الصوديوم، حمض ميتاكربيليك وإيتيل إكريليت كربوليمر، تالك

ثاني أكسيد النيتريوم، أكسيد الحديد الأحمر، أكسيد الحديد الأصفر.

لما يحب تناول بيزوكور؟

الفئة العلاجية: مصدر للمستقبلات - البيتا.

الرمز الكيميائي العلاجي التشريري (ATC): C07AB07.

إن بيزوكور محسر بيتاً ويوصف للتحكم بارتفاع ضغط الدم. فهو يعمل على تحفيض قوة إيقاضات القلب ومعدلها، مما يؤدي إلى تحفيض طلب القلب لمادة الأوكسيجين.

يجوز تناول بيزوكور لوجهه أو بالتزامن مع غيره من الأدوية المخفضة لضغط الدم.

ما هي المعلومات العلاجية المترافق مع بيزوكور؟

يساعد بيزوكور على التحكم بضغط الدم المرتفع، مثل غيره من الأدوية المخفضة لضغط الدم، هو ليس علاجاً لارتفاع ضغط الدم الأولي. إن التوقف فجأة عن تناول بيزوكور قد

يسبب مشكل في القلب، لذلك عليك الالتزام بشادات طبيبك وعدم التوقف عن تناول الدواء حتى ولو شعرت بذلك في حالة صحية جيدة. هذا الأمر مهم للغاية خاصة إذا كنت مصاباً بمرض في شرايين القلب التاجية.

ما هي العوائد الموصى بها من بيزوكور؟

للبالغين

يجب تغيير جرعة بيزوكور بحسب حاجات كل فرد. تبلغ الجرعة اليومية المعتادة في بداية العلاج ٥ مل. يمكن زيادة الجرعة اليومية إلى ١٠ أو ٢٠ مل بحسب استجابة المريض للدواء. أما الجرعة الموصى بها في بداية العلاج فهي ٢٥ مل يومياً للمرضى المصابين بباربي أو للمرضى المصابين بأمراض كلوية أو كبدية.

للأولاد

لم تكن دراسات وافية حول استعمال بيزوكور عند الأولاد.

ما العمل عند تقوية جرعة بيزوكور عند إحدى القراء؟
تناول جرعة القراء التي فوتها حالما تدرك أنك نسيتها. في حال تذكرت ذلك عندما يحين موعد الجرعة التالية، أهمل الجرعة التي فوتها واستأنف برنامج العلاج المعتاد. لا تتناول جرعين في الوقت نفسه.

ما العمل عند تناول جرعة مفرطة؟

إن تناول جرعة مفرطة من أي دواء ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. في حال شككت بأنك تناولت جرعة مفرطة، استشير طبيبك فوراً.

قد تشمل الأعراض الناتجة عن تناول جرعة مفرطة من بيزوكور ما يلي:

فشل القلب الاحتقاني (الذى يتجلى فى الشعور بالتعب وكما يتجلى فى ظهور وذمات فى الأطراف السفلية، ومن ضمنها الساقان، والقدمان، والكاحلان)، الشعور بصعوبة في التنفس، تدلى عدل دقات القلب، إيقاضات فى ضغط الدم وفي مستوى السكر في الدم.

هل من تناول بين بيزوكور وأى طعام أو دواء؟

يمكن تناول بيزوكور مع معظم الأدوية، لكن يجب أن تستشير طبيبك قبل تناول بيزوكور بالتزامن مع أي من الأدوية التالية:

محصرات بيتا (مثل أنتوكولول، ميتوبرولول، وبروبرانولول)، ومحصرات الكالسيوم

(مثل فيراميل وديتاريزم)، وكلوتريدين، وديزوبيراميد (وغيرها من الأدوية المماثلة التي

تعالج مشكلة عدم انتظام دقات القلب)، وإيبينيفرين، وريفامبين، وغلوتريدين وريسيرين.

ما هي التأثيرات الجانبية لبيزوكور؟

قد تتضمن التأثيرات الجانبية الأكثر شيوعاً ما يلي:
الدوخة، التعب، الصداع، الإلتهابات في المسالك التنفسية العليا، ارتفاع الأنف، التورم، والإسهال.

الإحتياطات الواجب اتخاذها عند تناول بيزوكور

يجب عدم توقف العلاج بدواء بيزوكور فجأة إلا أوصى الطبيب بذلك.

يجب توخي الحذر عند تناول بيزوكور للمسابين بالربو أو الذين يعانون مشاكل في القصبات الهوائية، والمسابين بأمراض في الكلى والكبد، وبأمراض في شرايين القلب التاجية، وبأمراض في الأوعية الدموية المحيطة. إشتر طبيبك في حال يعتقد لك أن تعرضت لفشل القلب الاحتقاني أو تعرضت لأية مشكل في النفس أو في حال صارت

ذفات طبل طنبية في خلال خضوعك لعلاج بدواء بيزوكور.

من المحتمل أن يجبر بيزوكور أعراض ارتفاع مستويات السكر في الدم، أو قد يؤثر على مستويات السكر في الدم، كما المحتمل أن يجبر الأعراض الناتجة عن ارتفاع نشاط الغدة الدرقية.

من المحتمل أن يؤثر بيزوكور على الاستجابة لمادة إيبينيفرين عند المرضى الذين يسعون لهم أن يخوضوا مشاكل حساسية حادة تتطلب علاجاً ملائمة لـ إيبينيفرين.

من المحتمل أن يخوض بيزوكور مستويات التيقظ أو أن يسبب النعاس عند البعض، لذلك يجب الانتباه إلى قيمة الحرارات أو عن المشاركة في نشاطات خطيرة لحين تناوله.

أخيراً، يجب إعلام طبيبك المعالج أو طبيب الأسنان بأنك تتناول بيزوكور قبل الخضوع لأى عملية في الأسنان أو أى عملية جراحية بخلاف العمليات الطوارئ.

ما هي الحالات التي يجب انتباع فيها عن تناول بيزوكور؟

يجب إعلام طبيبك في حال كنت تعاني من اضطرابات الدم الذي يروع الدورة الدموية أو أي مشكل قلبي مثل فشل القلب الاحتقاني، وتأبطه دقات القلب أو عدم انتظامها، وعلى ضوء ذلك، يفترط الطبيب ما إذا كان تناول بيزوكور مأموناً لك أم لا.

ما العمل في حالات الحمل والرضاعة؟

نظراً إلى غياب أي دراسة وافية حول وصف بيزوكور خلال فترة الحمل، عليك بالتالي إعلام طبيبك في حال كنت حاملاً أو تخطيطن للحمل، إذا كنت تخضعين لعلاج بدواء بيزوكور.

كما لم يتم التتحقق من أن بيزوكور يُفترط في حليب الأم، وبالتالي على طبيبك أن يطلع على التدابير الواجب اتخاذها إذا كنت ترضعين طفلك خلال فترة العلاج بدواء بيزوكور.

في حال كان دواء بيزوكور ضرورياً ضمناً سلامة صحتك، قد ينصحك طبيبك بتوقفه.

الرضاعة لحين يتغير العلاج بدواء بيزوكور.

كيف يُحْفَظ بيزوكور؟

يُحْفَظ بيزوكور في مكان لا تتعدي الحرارة فيه ٣٠ درجة مئوية.

يجب حفظه في العبوة الأصلية بحالة سليمة.

تاريخ المراجعة: آذار ٢٠١٦.

هذا دواء:

- الدواء يستحضر يوثر على صحتك، واستهلاكه خلاف التسليات يعرضك للخطر.
- ابتعد وصفة الطبيب بدقة، وارشادات الإستعمال، وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- إن الطبيب والمصيلاني هما الخبرتان في الأدوية، فوادها ومخاطرها.
- لا تقطع فترة العلاج المحددة لك من ثلاثة نسق.
- لا تكرر نفس الوصفة دون استشارة طبيبك.
- احفظ الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال.

مؤمن وزارء الصحة العرب
وأحمد الشبلانة العرب

بناتاش. م.ل.
ضبيه - لبنان