

**نشرة الدواء : معلومات للمريض**

## لوزانت - هـ ٥٠ ملغ / ١٢,٥ ملغ أقراص

## لوزانت - هـ فورت ١٠٠ ملغ / ١٢,٥ ملغ أقراص

## لوزانت - هـ فورت ١٠٠ ملغ / ٢٥ ملغ أقراص

لوزرتان بوتاسيوم/ هيدروكلوروثيازيد

**إقرأ هذه النشرة بالكامل بعناية قبل القيام بتناول هذا الدواء حيث أنها تحتوي على معلومات مهمة لك.**

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج إليها لاحقًا.

- في حال وجود أي تساؤلات لديك، يُفضل استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي.

- لقد وُصف هذا الدواء لك شخصيًا، ولا ينبغي بك أن تعمله لأحد آخر حتى لو ظهرت عليه نفس أعراض مرضك فقد يؤدي ذلك إلى الإضرار به.

- إذا أصبت بأي آثار جانبية غير مذكورة في هذه النشرة، أخبر الطبيب المعالج أو الصيدلي.

**ما الذي تحتويه هذه النشرة**

- ما هما لوزانت-هـ ولوزانت-هـ فورت وما هي دواعي استعمالهما
- ما الذي يجب عليك معرفته قبل تناول لوزانت-هـ ولوزانت-هـ فورت
- ما هي طريقة تناول لوزانت-هـ ولوزانت-هـ فورت
- الأعراض الجانبية المحتملة
- طريقة تخزين لوزانت-هـ ولوزانت-هـ فورت
- محتويات العلبة ومعلومات إضافية أخرى
- ما هما لوزانت-هـ ولوزانت-هـ فورت وما هي دواعي استعمالهما**

يُعتبر لوزانت-هـ ولوزانت-هـ فورت مزيًا من مضادات مستقبلات الأنجيوتنسين آ (للولزتان) ومدر للبول (هيدروكلوروثيازيد).

ينتج الجسم مادة الأنجيوتنسين آ التي ترتبط بالمستقبلات في الأوعية الدموية، مما يسبب تضيق هذه الأوعية وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. يساعد اللوزرتان ارتباط الأنجيوتنسين آ بهذه المستقبلات مسبقًا ارتخاء الأوعية الدموية مما يؤدي بدوره إلى انخفاض ضغط الدم. يجعل الهيدروكلوروثيازيد الكلى تفرز المزيد من الماء والملح، مما يساعد أيضًا في خفض ضغط الدم.

يتم وصف لوزانت-هـ ولوزانت-هـ فورت لمعالجة ارتفاع ضغط الدم الأساسي (ارتفاع ضغط الدم).

**٢ ما الذي يجب عليك معرفته قبل تناول لوزانت-هـ ولوزانت-هـ فورت**

**لا تتناول لوزانت-هـ ولوزانت-هـ فورت**

- إذا كان لديك حساسية (حساسية مفرطة) للوزرتان البوتاسيوم، لهيدروكلوروثيازيد أو لأي من مكونات هذا الدواء الأخرى (الدرجة في القسم ٦)

- إذا كان لديك حساسية (حساسية مفرطة) للمواد الأخرى المشتقة من السلفوناميد (مثل أنواع الثيازيد الأخرى، بعض الأدوية المضادة للبكتيريا مثل الكوتريموكسازول، استشر الطبيب المعالج إذا لست متأكدًا)

- إذا كنت تعاني من ضعف حاد في وظائف الكبد

- إذا كانت مستويات البوتاسيوم أو الصوديوم منخفضة أو إذا كانت مستويات الكالسيوم مرتفعة والتي لا يمكن ضبطها عن طريق العلاج

- إذا كنت تعاني من النقرس

- إذا كنت حاملًا لأكثر من ٣ أشهر (من الأفضل تجنب لوزانت-هـ ولوزانت-هـ فورت في بداية الحمل - مراجعة قسم الحمل)

- إذا كنت تعاني من ضعف حاد في وظائف الكلى أو إذا كانت كيتيك لا تفرز البول

- إذا كنت تعاني من مرض السكري أو ضعف وظائف الكلى وتعالجها بواسطة دواء خافض لضغط الدم يحتوي على أيسكيريين

- إذا كانت إحدى الشروط أعلاه تنطبق عليك، لا تتناول لوزانت-هـ ولوزانت-هـ فورت واستشر الطبيب المعالج.

**التحذيرات والإحتياطات**

استشر الطبيب المعالج أو الصيدلي قبل تناول لوزانت-هـ ولوزانت-هـ فورت.

إذا كنت تواجه صعوبات في البرؤية أو الألم في العين، قد تكون هذه الأعراض علامة على تراكم السوائل في الطبقة العوائية للعين (الانصباب المشيمي) أو ارتفاع ضغط العين ويمكن أن تحدث في غضون ساعات إلى أسابيع بعد تناول لوزانت-هـ ولوزانت-هـ فورت. قد يؤدي ذلك إلى فقدان دائم للبصر ما لم تتم معالجته. إذا كنت قد عانيت سابقًا من حساسية تجاه البنسلين أو السلفوناميد، قد تكون أكثر عرضة لتلك الأعراض.

يجب أن تخبري الطبيب المعالج إذا كنت تتعديين أنك (أو قد تصابين) حاملًا. لا يُصح بتناول هذا الدواء في بداية الحمل ولا يجب تناوله إذا كنت حاملًا لأكثر من ٣ أشهر، لأنه قد يسبب ضررًا خطيرًا لطفلك إذا تم استخدامه في تلك المرحلة من الحمل (مراجعة قسم الحمل).

من الضروري أن تخبر الطبيب المعالج قبل تناول لوزانت-هـ أو لوزانت-هـ فورت:

- إذا كنت قد عانيت سابقًا من تورم في الوجه، الشفتين، الحلق أو اللسان

- إذا كنت تتناول مدرات البول (حبوب الماء)

- إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا قليل الملح

- إذا كنت تعاني أو قد عانيت من القيء و/أو الإسهال الحاد

- إذا كنت تعاني من قصور القلب

- إذا كانت وظيفة الكبد لديك ضعيفة (مراجعة القسم ٢ "لا تتناول لوزانت-هـ ولوزانت-هـ فورت")

- إذا كنت تعاني من ضيق في الشرايين المؤدية إلى كيتيك (تضيق الشريان الكلوي) أو إذا كان لديك كلية واحدة تعمل فقط، أو إذا خضعت مؤخرًا لعملية زرع كلية

- إذا كنت تعاني من تضيق الشرايين (تصلب الشرايين)، الذبحة الصدرية (ألم في الصدر بسبب ضعف وظائف القلب)

- إذا كنت تعاني من "تضيق الأهر أو الصمام المترالي" (تضيق صمامات القلب) أو "اعتلال عضلة القلب الضخامي" (مرض يسبب سماكة عضلة القلب)

- إذا كنت تعاني من داء السكري

- إذا كنت تعاني من مرض النقرس

- إذا كنت تعاني من عدائيت من حساسية، ربو أو مرض يسبب آلام المفاصل، طفق جلدي وحمي (الذئبة الحمامية الشاملة)

- إذا كنت تعاني من ارتفاع مستويات البوتاسيوم أو إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا قليل الصوديوم

- إذا كنت بحاجة إلى التخدير (حتى عند تخفيض الأسنان) أو قبل إجراء جراحة، أو إذا كنت ستجري فحوصات للتتحقق من وظيفة الغدة الجار درقية، يجب أن تخبر الطبيب أو الطاقم الطبي أنك تتناول أقراص لوزرتان البوتاسيوم وهيدروكلوروثيازيد

- إذا كنت تعاني من فرط الألدوستيرونية الأولي (متلازمة تتعلق بزيادة إفراز الغدة الكظرية لهرمون الألدوستيرون بسبب خلل في الغدة)

- إذا كنت تتناول أيًا من الأدوية التالية المستخدمة لمعالجة ارتفاع ضغط الدم:

• أحد مضطبات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (على سبيل المثال إنالابريل، ليزينابريل، رامبيرييل)، خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى تتعلق بمرض السكري

• أيسكيريين

- إذا كنت قد عانيت من سرطان الجلد أو إذا ظهرت فرحة جلدية غير متوقعة أثناء العلاج. قد يؤدي العلاج بهيدروكلوروثيازيد، وخاصة إذا تم تناوله لفترة طويلة وبجرعات عالية، إلى زيادة خطر الإصابة ببصق أنواع سرطان الجلد والشفثين (سرطان الجلد غير الميلانيني). إحم بشرتك من التعرض لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية أثناء تناول لوزانت-هـ ولوزانت-هـ فورت.

- إذا كنت تتناول أدوية أخرى ترفع مستوى البوتاسيوم في الدم (مراجعة القسم ٢ "الأدوية الأخرى **ولوزانت-هـ ولوزانت-هـ فورت**")

قد يقوم الطبيب المعالج بفحص وظائف الكلى وضغط الدم ونسبة الكهارل (مثل البوتاسيوم) في الدم بشكل دائم.

مراجعة أيضًا المعلومات الواردة تحت العنوان **"لا تتناول لوزانت-هـ ولوزانت-هـ فورت"**.

إذا كانت إحدى الشروط أعلاه تنطبق عليك، استشر الطبيب المعالج.

**الأطفال والمراهقون**

لا تتوفر بيانات حول استخدام لوزانت-هـ ولوزانت-هـ فورت للأطفال. لذلك، لا ينبغي إعطاء لوزانت-هـ ولوزانت-هـ فورت للأطفال.

**الأدوية الأخرى ولوزانت-هـ ولوزانت-هـ فورت**

أبلغ الطبيب المعالج أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا أو قد تتناول أي أدوية أخرى.

أبلغ الطبيب المعالج إذا كنت تتناول مكملات البوتاسيوم، بدائل الملح التي تحتوي على البوتاسيوم، الأدوية الحافظة للبوتاسيوم أو أدوية أخرى قد تزيد من مستوى البوتاسيوم في الدم (على سبيل المثال الأدوية التي تحتوي على تريميثوبريم)، لأنه لا يُصح بتناولها إلى جانب لوزانت-هـ ولوزانت-هـ فورت.

قد تتفاعل الأدوية المدرة للبول مثل هيدروكلوروثيازيد الموجودة في لوزانت-هـ ولوزانت-هـ فورت مع أدوية أخرى.

لا ينبغي أن تتناول المستحضرات التي تحتوي على الليثيوم إلى جانب لوزانت-هـ ولوزانت-هـ فورت من دون أن يتابع الطبيب المعالج حالتك بشكل دقيق.

قد تكون التدابير الوقائية الخاصة (مثل إجراء اختبارات الدم) لازمة إذا كنت تتناول مكملات البوتاسيوم، بدائل الملح التي تحتوي على البوتاسيوم، الأدوية الحافظة للبوتاسيوم أو مدرات البول الأخرى ("حبوب الماء") وبعض المسهبات، (على سبيل المثال، الأدوية المستخدمة لضبط ضربات القلب أو لمعالجة السكري (الأدوية التي يتم تناولها عن طريق الفم أو الأنسولين).

من الضروري أيضًا أن تخبر الطبيب المعالج إذا كنت تتناول:

- أدوية أخرى خافضة لضغط الدم

- منشطات

- أدوية لمعالجة مرض السرطان

- مسكنات الآلام

- الأدوية المستخدمة لمعالجة التهابات المفترية

- أدوية الارتفاع المستخدمة لمعالجة ارتفاع الكوليسترول مثل كوليسترامين

- مرخيات العضلات

- الحبوب المنومة

- المسكنات الأفيونية مثل المورفين

- الأمينات الراجعة لضغط الدم مثل الأدرينالين أو أدوية أخرى تنتمي إلى المجموعة نفسها

- الأدوية التي يتم تناولها عن طريق الفم لمعالجة مرض السكري أو الأنسولين

قد يضطر الطبيب المعالج إلى تغيير مقدار جرعتك و/أو اتخاذ احتياطات أخرى:

إذا كنت تتناول أحد مضطبات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين أو أيسكيريين (مراجعة أيضًا المعلومات الواردة تحت العناوين **"لا تتناول لوزانت-هـ ولوزانت-هـ فورت"** و**"التحذيرات والإحتياطات"**)

يرجى أيضًا إبلاغ الطبيب المعالج إذا كنت تتناول لوزانت-هـ ولوزانت-هـ فورت وإذا كنت ستجري تصوير إشعاعي وسيتم إعطاؤك وسائل التباين اليودية.

**لوزانت-هـ ولوزانت-هـ فورت مع الطعام والشراب والكحول**

لا يمكنك تناول لوزانت-هـ ولوزانت-هـ فورت مع الطعام أو بدونه.

لا يُصح بشرب الكحول أثناء تناول هذه الأقراص: قد تؤثر الكحول على فعالية لوزانت-هـ ولوزانت-هـ فورت والعكس بالعكس.

قد يبطل تناول ملح المائدة بكمية كبيرة تأثير أقراص لوزانت-هـ ولوزانت-هـ فورت.

**الحمل والرضاعة الطبيعية**

**الحمل**

يجب أن تبلمي الطبيب المعالج إذا كنت تعديين أنك (أو قد تصابين) حاملًا. ينصح الطبيب المعالج عادة بالتوقف عن تناول هذا الدواء قبل الحمل أو حالما تدرك المرأة بأنها حامل وسوف ينصحك بتناول دواء آخر بدلاً من لوزانت-هـ ولوزانت-هـ فورت.

لا يُصح بتناول هذا الدواء في بداية الحمل ولا يجب تناوله إذا كنتِ حاملًا لأكثر من ٣ أشهر لأنه قد يسبب ضررًا خطيرًا لطفلك إذا تم استخدامه بعد الشهر الثالث من الحمل.

**الرضاعة الطبيعية**

لا ينبغي الطبيب المعالج إذا كنت ترضعين طفلك أو على وشك البدء في الرضاعة الطبيعية. لا يُصح بهذا الدواء للأמהات المرضعات، وقد يصف لك الطبيب المعالج علاجًا آخر إذا كنتِ ترغبين في الرضاعة الطبيعية.

**كبار السن**

يتفاعل لوزانت-هـ ولوزانت-هـ فورت بالطريقة نفسها مع معظم المرضى البالغين الأكبر سنًا والشباب ويتحملون تأثيرهما بشكل جيد. يحتاج معظم المرضى الأكبر سنًا إلى الجرعة نفسها التي يتناولها المرضى الأصغر سنًا.

**القيادة واستخدام الآلات**

عندما تبدأ العلاج بهذا الدواء، لا يجب أن تؤدي المهام التي تتطلب جهدًا خاصًا (على سبيل المثال، قيادة السيارة أو تشغيل الآلات الخطرة) قبل معرفة كيفية تجاوبك مع هذا الدواء.

**يحتوي لوزانت-هـ ولوزانت-هـ فورت على اللاكوز**

إذا كنت لا تهضم بعض السكريات، اتصل بالطبيب المعالج قبل تناول هذا الدواء.

**٣ ما هي طريقة تناول لوزانت-هـ ولوزانت-هـ فورت**

تتبع بدقة إرشادات الطبيب المعالج أو الصيدلي عند تناول هذا الدواء، واستشر الطبيب المعالج أو الصيدلي إذا لست متأكدًا. سيحدد الطبيب المعالج الجرعة المناسبة من لوزانت-هـ ولوزانت-هـ فورت، وذلك بناءً على حالتك الصحية وما إذا كنت تتناول أدوية أخرى. من الضروري أن تتناول لوزانت-هـ ولوزانت-هـ فورت طيلة الفترة التي يصفها لك الطبيب المعالج من أجل ضبط ضغط الدم لديك بالشكل المناسب.

**طريقة تناول الدواء**

يجب بلع الأقراص مع كوب من الماء.

**لاارتفاع ضغط الدم**

سكنو الجرعة المعتادة من لوزانت-هـ ولوزانت-هـ فورت قرص واحد من لوزانت-هـ ٥٠ ملغ / ١٢,٥ ملغ يوميًا للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وذلك لضبط ضغط الدم خلال فترة ٢٤ ساعة. يمكن زيادتها إلى قرصين مرة واحدة يوميًا من لوزانت-هـ ٥٠ ملغ / ١٢,٥ ملغ أو تغييرها إلى قرص واحد يوميًا من لوزانت-هـ فورت ١٠٠ ملغ / ٢٥ ملغ (مقدار أكبر) يوميًا. الجرعة اليومية القصوى هي قرصين (٢) يوميًا من لوزانت-هـ ٥٠ ملغ / ١٢,٥ ملغ أو قرص واحد يوميًا من لوزانت-هـ فورت ١٠٠ ملغ / ٢٥ ملغ.

يُعطى لوزانت-هـ فورت ١٠٠ ملغ / ٢٥,٥ ملغ للمرضى الذين وُصف لهم ١٠٠ ملغ من لوزانت والأكثر حاجة إلى ضبط مستويات ضغط الدم لديهم.

**إذا تناولت لوزانت-هـ ولوزانت-هـ فورت بكمية أكبر مما ينبغي عليك**

في حال تناولت جرعة زائدة، اتصل بالطبيب المعالج على الفور لتتلقى العناية الطبية على الفور.

قد تؤدي الجرعة الزائدة إلى انخفاض ضغط الدم، خفقان القلب، بطء نبضات القلب، تغيرات في تكوين الدم والجفاف.

إذا نسيت أن تتناول لوزانت-هـ ولوزانت-هـ فورت

حاول أن تتناول لوزانت-هـ ولوزانت-هـ فورت يوميًا وفقًا لإرشادات الطبيب، ومع ذلك، إذا نسيت أن تتناول جرعة ما، لا تتناول جرعة إضافية. استأنف جدولك المعتاد.

**٤. الأعراض الجانبية المحتملة**

قد ينتج عن هذا الدواء وكذلك باقي الأدوية، آثارًا جانبية إلا أنها قد لا تصيب الجميع.

إذا واجهت أيًا من الآثار التالية، توقف عن تناول أقراص لوزانت-هـ ولوزانت-هـ فورت وأخبر الطبيب المعالج على الفور أو أذهب إلى أقرب مستشفى:

- رد فعل تحسسي شديد (طفح جلدي، حكة، تورم الوجه، الشفتين، الفم أو الحلق الذي قد يسبب صعوبة في البلع أو التنفس).

هذا الأثر الجانبي خطير لكنه نادر. قد تحتاج إلى عناية طبية عاجلة أو دخول المستشفى.

**تم الإبلاغ عن الآثار الجانبية التالية :**

الآثار الجانبية الشائعة (قد تصيب شخصًا من بين ١٠٠شخص)

- سعال، التهاب الجهاز التنفسي العلوي، احتقان بالأنف، التهابات الجيوب الأنفية

- إسهال، آلام البطن، غثيان وعسر الهضم

- آلام أو تقلصات العضلات، آلام الساق، آلام الظهر

- آرق، صداع، دوام

- ضعف، تعب، آلام في الصدر

- ارتفاع مستويات البوتاسيوم (التي قد تسبب اضطرابات في نظم القلب)، وانخفاض مستويات الهيموجلوبين

- تغيرات في وظائف الكلى بما في ذلك الفشل الكلوي

- انخفاض حاد لنسبة السكر في الدم (تنص سكر الدم)

- فقر الدم، ظهور بخرع حمراء أو بنية على السجل (تظهر أحيانًا على القدمين، الساقين، الذراعين والأرداف، مصحوبة بالألم في المفاصل، تورم اليدين والقدمين وآلام في المعدة)، كدمات، انخفاض نسبة خلايا الدم البيضاء، اضطرابات تخرثر الدم، انخفاض عدد الصفائح الدموية

الآثار الجانبية غير الشائعة (قد تصيب شخصًا من بين ١٠٠شخص)

- فقدان الشهية للطعام، ارتفاع مستويات اليوريك أو البوتاسيوم، ارتفاع مستويات السكر في الدم، مستويات غير طبيعية للكهارل في الدم

- قلق، تورم، اضطراب الهلع (نوبات هلع متكررة)، ارتباك، اكتئاب، أحلام غير طبيعية، اضطرابات النوم، غماس، وضعف الذاكرة

- وخز أو أحاسيس مشابهة، ألم في الأطراف، رجفة، صداع نصفي، إغماء

- اضطراب الرؤية، إحساس حارق أو وخز في العين، التهاب المتحممة، تدهور الرؤية، رؤية صفراء

- رنين، أنين أو زفير في الأذنين، دوام

- انخفاض ضغط الدم عند تغيير الوضعية (الشعور بالدوخة أو الإغماء عند الوقوف)، ذبحة صدرية (ألم الصدر)، ضربات القلب غير طبيعية، سكتة دماغية (نوبة إقفارية عابرة، "سكتة دماغية صغيرة")، نوبة قلبية، خفقان

- التهاب الأوعية الدموية الذي غالبًا ما يتراق مع طفح جلدي أو كدمات

- التهاب الحلق، تضيق التنفس، التهاب الشعب الهوائية، التهابات الجهاز الليمفاوي، وذمة رئوية (مما يسبب صعوبة في التنفس)، تضيق في الأنف، سيلان الأنف،

- إمساك، إمساك حاد، انتفاخ البطن، اضطرابات في المعدة، تقلصات في المعدة، قيء، جفاف الفم، التهاب الغدد اللعابية، ألم في الأسنان

- اليرقان (اصفرار العينين والجلد)، التهاب البنكرياس

- شرى، حكة، التهاب الجلد، طفح جلدي، احمرار الجلد، حساسية للضوء، جفاف الجلد، تعرق، تساقط الشعر

- ألم في الكتف، التهاب، الكنتين، الوركين، الركبتين أو المفاصل الأخرى، تورم المفاصل، تصبب العضلات

- زيادة نسبة البروتين وكذلك في اللبيل، اضطراب في وظائف الكلى بما في ذلك التهاب الكلى، التهاب المسالك البولية، زيادة نسبة السكر في البول

- فقدان الرغبة الجنسية، ضعف جنسي

- تورم الوجه، تورم موضعي (وذمة)، حمى

الآثار الجانبية النادرة (قد تصيب شخصًا من بين ١٠٠٠شخص)

- التهاب الكبد، نتائج غير طبيعية لاختبارات وظائف الكبد

- مدى تواتر هذه الآثار غير معروف (لا يمكن تقدير معدل تواترها بناءً على البيانات المتاحة).

- أعراض تشبه أعراض الانفلونزا

- ألم عضلي غير مبرر مصحوبًا ببول داكن اللون (بولون الشاي) (انحلال البريدات)

- انخفاض مستويات الصوديوم في الدم (نقص صوديوم الدم)

- الشعور بتوعل بشكل عام

- اضطراب حاسة التذوق (خلل التذوق)

- سرطان الجلد والشفثين (سرطان غير الميلانيني)

- ضعف الرؤية أو ألم في عينيك بسبب ارتفاع ضغط العين (علامات محتملة لتراكم السوائل في الطبقة العوائية للعين (الانصباب المشيمي) أو الزرق معلق الزاوية الحاد).

**التبليغ عن الأعراض الجانبية**

إذا واجهت أي آثار جانبية بما في ذلك الآثار الجانبية المحتملة في هذه النشرة، استشر الطبيب المعالج أو الصيدلي، من خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية، يمكنك المساعدة في توفير مزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.

**٥. طريقة تخزين لوزانت-هـ ولوزانت-هـ فورت**

- قم بتخزين هذا الدواء بعيدًا عن مرآى ومتناول الأطفال.

- لا تستعمل هذا الدواء بعد انتهاء الصلاحية والمكروز على الشريط الخارجي، يشير انتهاء تاريخ الصلاحية إلى آخر يوم من الشهر.

- لا تقم بتخزين هذا الدواء في درجة حرارة تزيد عن ٣٠ درجة مئوية.

- احتفظ هذا الدواء بعيدًا عن الرطوبة.

- لا تستخدم هذا الدواء إذا لاحظت علامات تدهور واضحة عليه.

- لا تتخلص من أي أدوية عبر مياه الصرف الصحي. إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد بحاجة إليها. ستساعد هذه الإجراءات على حماية البيئة.

**٦. محتويات العلبة ومعلومات إضافية أخرى**

**على ماذا يحتوي لوزانت-هـ ولوزانت-هـ فورت**

المواد الفعالة في لوزانت-هـ ولوزانت-هـ فورت هي لوزرتان البوتاسيوم وهيدروكلوروثيازيد.

لوزانت-هـ ٥٠ ملغ / ١٢,٥ ملغ: كل قرص يحتوي على ٥٠ ملغ من لوزرتان البوتاسيوم و١٢,٥ ملغ من هيدروكلوروثيازيد.

لوزانت-هـ فورت ١٠٠ ملغ / ١٢,٥ ملغ: كل قرص يحتوي على ١٠٠ ملغ من لوزرتان البوتاسيوم و١٢,٥ ملغ من هيدروكلوروثيازيد.

لوزانت-هـ فورت ١٠٠ ملغ / ٢٥ ملغ: كل قرص يحتوي على ١٠٠ ملغ من لوزرتان البوتاسيوم و٢٥ ملغ من هيدروكلوروثيازيد.

المكونات الأخرى هي: السليلوز دقيق التبلور، أحادي هيدرات اللاكوز، نشأ الذرة الهلامي، ستيرات المغنسيوم.

**كيف يبدو شكل لوزانت-هـ ولوزانت-هـ فورت ومحتويات الشكل، لونها وأبيض مائل إلى الصفرة.**

- يتوفر لوزانت-هـ ٥٠ ملغ / ١٢,٥ ملغ في عبوات تحتوي على ٣٠ قرص.

- يتوفر لوزانت-هـ فورت ١٠٠ ملغ / ١٢,٥ ملغ في عبوات تحتوي على ٣٠ قرص.

- يتوفر لوزانت-هـ فورت ١٠٠ ملغ / ٢٥ ملغ في عبوات تحتوي على ٣٠ قرص.

قد لا يتم تسويق جميع أحجام العبوات.

**الشركة الصنعة ومالكة حق التسويق**

فارماليين ش.م.ل - لبنان

الصندوق البريدي ٩٠٢٠١ جديدة المتن، لبنان

للتواصل معنا: [pharmaline@pharmaline.com.lb](mailto:pharmaline@pharmaline.com.lb)

الموقع الإلكتروني: [www.pharmaline.com](http://www.pharmaline.com)

رقم تسجيل لوزانت-هـ ٥٠ ملغ / ١٢,٥ ملغ في لبنان: ٠٤/١٩٥٠١٩

رقم تسجيل لوزانت-هـ فورت ١٠٠ ملغ / ١٢,٥ ملغ في لبنان: ٠٨/٢٢٢٤٨٩

رقم تسجيل لوزانت-هـ فورت ١٠٠ ملغ / ٢٥ ملغ في لبنان: ٠٦/٢٤٣٧٢

**إن هذا الدواء،**

- لا يذوق مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات بمرضك للخطر.

- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال الموصوف لتعليمات الصيدلي الذي صرفه لك.

- الطبيب والصيدلي هما الخبيران في الدواء ونقعه وضرره.

- لا تطبق مدة العلاج المجددة من نقاء نفسك.

- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.

- احتفظ جميع الأدوية بعيدًا عن متناول الأطفال.

**مجلس وزراء الصحة العرب**

**واتحاد الصيدالة العرب**

تمت مراجعة هذه النشرة في آذار/مارس ٢٠٢٢.

</