

# sirop histalix

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Si vous vous posez des questions quelconques, ou si vous avez des doutes quelconques, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

## 5 ml de Sirop Histalix contiennent :

Chlorhydrate de diphénhydramine BP	14 mg
Chlorure d'ammonium BP	135 mg
Menthol BP	1,1 mg

En plus des ingrédients ci-dessus, le sirop contient aussi du saccharose, de la saccharine de sodium, du ponceau 4R (E124), du propylène glycol, un arôme framboise, des préservateurs (E218, E215, E216 et hydroxybenzoate de butyle), du citrate de sodium, de la glycérine et de l'eau.

Le Sirop Histalix est disponible en bouteilles de 150 ml.

Le chlorhydrate de diphénhydramine est un antihistaminique qui produit un soulagement subjectif des effets des stimulus allergiques. Le chlorure d'ammonium est un expectorant qui aide à évacuer le flegme et le catarrhe des voies respiratoires. Le menthol produit un soulagement subjectif de la congestion, et produit aussi un effet rafraîchissant dans la bouche et la gorge.

Histalix est utilisé pour le soulagement symptomatique des toux gênantes associées à la congestion des voies respiratoires supérieures.

N'utilisez pas ce médicament si vous êtes sensible à l'un des ingrédients, quel qu'il soit, ou si vous prenez ou avez pris des inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO) au cours des 14 jours précédents.

Informez votre médecin ou votre pharmacien que vous prenez ce médicament si une ou plusieurs des conditions ci-dessous vous concerne :

- ❖ Vous souffrez d'un glaucome.
- ❖ Vous avez une obstruction intestinale quelconque.
- ❖ Vous souffrez d'une hypertrophie prostatique.
- ❖ Vous souffrez d'asthme, d'hypertension ou d'hypertthyroïdie.
- ❖ Vous souffrez d'une maladie sévère des artères coronaires.
- ❖ Vous souffrez de troubles hépatiques ou rénaux.

## Avertissements particuliers :

- ❖ Ne prenez pas ce médicament avec de l'alcool.
- ❖ Peut entraîner une somnolence. Dans ce cas, vous ne devez pas conduire ni utiliser des machines.
- ❖ Ne dépassez pas la dose prescrite.
- ❖ Tenez tous les médicaments hors de la vue et de la portée des enfants.

## Posologie du Sirop Histalix

Enfants de 2 à 5 ans :

Une demi-cuillerée de 5 ml toutes les 4 heures.

Enfants de 6 à 12 ans :

Une cuillerée de 5 ml toutes les 4 heures.

Adultes et personnes âgées :

Une à deux cuillerées de 5 ml toutes les 4 heures.

## Ne pas administrer aux enfants de moins de 24 mois.

### Surdose

Si vous avez pris une dose excessive de Sirop Histalix, consultez un médecin dans les plus brefs délais. Nous vous conseillons d'apporter cette notice pour montrer aux médecins ce que vous avez pris.

### Effets secondaires

Ce médicament peut causer des effets secondaires indésirables peu importants. Ces effets peuvent compter :

- ❖ Etourdissements, sédation, manque de coordination et confusion.
- ❖ Réactions allergiques.
- ❖ Vision troublee, bouche sèche, accélération du pouls.
- ❖ Miction difficile.
- ❖ Dessèchement de la bouche et diminution des autres sécrétions.
- ❖ Constipation.
- ❖ Sensibilité à la lumière.
- ❖ Excitabilité (en général seulement chez les enfants) et tremblements.

Si ces effets sont sévères ou s'ils se prolongent pendant plus de quelques jours, suspendez l'utilisation du médicament et consultez votre médecin. Si vous notez des effets secondaires inattendus ne figurant pas ci-dessus, ou si les effets sont plus que mineurs, consultez votre médecin.

Conservez à une température ne dépassant pas 30°C. Ne pas utiliser après la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage.