٣٠/١ قرص مغلفة بطبقة رقيقة

١ ملغ من الاسترادیول ومثبط من ١ ملغ من الاسترادیول و ١٠ ملغ من الدوبیجیتوین

Abbott

إذا كان هذه النشرة بمثابة قبل البدء باستعمال هذا الدواء

إحتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج إلى نظرها مجددا. إذا كانت لديك أية أسئلة لا تتردد بتوجيهها لطبيبك أو الصيدلي. إذا ظهرت لديك أعراض جانبية، بما فيها الغير مذكورة في هذه النشرة، فراجع طبيبك أو الصيدلي. لا تعطِ هذا الدواء لشخص آخر لأن هذا الدواء قد يسبب لهم أضرار حتى وإن كانت أعراض المرض التي يشعرون بها مشابهة لعوارضك.

ماذا تحتوي هذه النشرة

١. ما هو الدوفيستون؟ وما هي الأمراض التي يستخدم من أجلها؟
٢. ما هي الأمور التي يجب عليك معرفتها قبل تناول الدوفيستون؟
٣. كيف تتناول الدوفيستون؟
٤. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟
٥. كيف يتم تخزين الدوفيستون؟
٦. معلومات إضافية

١. ما هو الدوفيستون؟ وما هي الأمراض التي يستخدم من أجلها؟

الدوفيستون ١٠/١ عبارة عن أقراص مدورة ومغلفة بطبقة رقيقة، يتم تناولها من خلال الفم.

يحتوي الدوفيستون ١٠/١ على ٤ أقراص أبيض اللون يحتوي كل منها على ١ ملغ من الاسترادیول، بالإضافة إلى ٨ أقراص بنفسجية اللون يحتوي كل منها على ١ ملغ من الاسترادیول و ١٠ ملغ من الدوبیجیتوین.

تحمل كل الأقراص نقطة ٣٧٢ على إحدى الجهتين، ونقطة "S" على الجهة الثانية.

المواد الفعالة (المكونات غير الطبية):

أن القرص (بعبوة الأقراص) مدوفيستون الاسترادیول: هيبروميلوز، نشا الذرة، السيليكا الدوبنية الثانية، سيلوزات الصوديوم.

محتوى القرص المغلف بطبقة رقيقة بيضاء اللون: ثاني أكسيد التيتانيوم (E171)، هيبروميلوز، ماكروغول ٤٠٠.

محتوى القرص المغلف بطبقة رقيقة وردية اللون: ثاني أكسيد التيتانيوم (E171)، أكسيد الحديد الأحمر (E172)، بوليل فينيل كحول، ماكروغول ٣٣٥٠، التلق.

دواعي الاستعمال

الدوفيستون ١٠/١ كناية عن مثبط هرمون الغدة النخامية (HRT) المعتمد عوارض التقلص في الأسبوعين التي تعاني منها النساء في السنوات التي تلي انقطاع الطمث. تعتقد بعض النساء أن من أسرار أخرى وقوع الهبات الساخنة، التعرق في الليل، شلل في الوجه، جفاف الجلد، جفاف المهبل، مشاكل في النوم.

كما يستخدم الدوفيستون ١٠/١ لمنع الحقن في الغدة الثدية التي تجاوزت سن الإياس، والمعروفة تكبر في الحقن. إن كانت لا تتحمل أو تمنع طبيعة استعمال أي دواء آخر مخدد للهرمون من نوع الحقن الطويلة.

الجرعة وطريقة الاستعمال

تناولي دوما بوصفة الطبيب. تناولي الدوفيستون ١٠/١ ، وإذا كانت لديك أية أسئلة، إسألي طبيبك أو بالصيدلي.

لا تتدلي بتناول الدوفيستون ١٠/١ خلال ٢٤ ساعة من الـ ١٢ شهرا على الأقل على دورتك الشهرية الأخيرة.

إذا كنت حائلا أو إذا كنت تعاني من احتمال الربط بين علاج الأدوية بالهرمونات الأخرى، وصايتها بوصفة الدوفيستون ١٠/١ قد تكون أنسب لك من الشكل الثاني.

أعلم اختيار عقوقي مثل دواء وهميا أسبه "مدارية صحة الفرأة" (WHI) وهي دراسات الوقائية بها "دراسة المنع الصحي لفرأة" (WWS)، من أرقام الجلطة بسرطان الثدي لدى النساء اللواتي يتناولن الأسبوعين أو مزيج الأسبوعين – الدوبيجيتوين أو الدوبيجيتوين بمثابة علاج الأدوية الهرمونية بعدة دراسات أخرى أجريت بعد "دراسة الأوراق الجيدة".

تشير نتائج أنواع العلاجات بالهرمونات الخارجية بارتفاع خطر الإصابة بسرطان الثدي بعد سنوات عدة من تناول الهرمونات. ومن ذلك بعد الأخذ بالاعتبار الأمر في تلقي العلاج الخارجي، إن لا يجوز إلى مستويات الخفيضة في خلال سنوات قليلة (يخص سنوات على الأكثر) بعد التوقف عن تلقي العلاج.

إنتاج "دراسة الطريق الصحي" إلى ازدياد خطر سرطان الثدي عند نشاط الهرمون الكبير الأسبوعين – الدوبيجيتوين بعلاج من نوع الدوبيجيتوين (MPA) بمقدار ٢٠٪ بالمقارنة مع غير حاملة العلاج الأسبوعين الذي يتم تناوله بالنسبة للمدة الزمنية الأطول.

وقد أظهرت تجربة "مدارية صحة الفرأة" (WHI) إن الأخطار المتواصل المركز بالنسبة لمدة أطول من الأسبوعين وبالنسبة لمدة أطول من الأسبوعين المقترن بالنسبة لمدة أطول من الأسبوعين بالنسبة لمدة أطول من الأسبوعين بالنسبة لمدة أطول من الأسبوعين