

**مالك حق التسويق:**  
شركة ميرك شارب آند دوم ذ.م.م، راهواي، نيو جيرسي.  
126 طرفيه ايس٧ لينكلون.  
راهواي، نيو جيرسي 07065 ، الولايات المتحدة الأمريكية  
**تمت المراجعة في:** 2022/07  
**جميع الحقوق محفوظة.**

(هذا منتج دوائي)  
الدواء منتج يُؤثر على صحتك وتتأثر به على نحو مختلف للتعليمات يعرضك للخطر.  
اتبع الوصفة الطبية تماماً وطريقة الاستخدام وتعليمات الصيادي الذي باعك الدواء.  
الطبيب والصيادي هما خبران في الأدوية وفرازتها ومخاطرها.  
لا توقف عن تلقاء نفسك فقرة العلاج التي تم وصفها لك.  
لا تكرر نفس الوصفة الطبية دون استشارة طبيبك.  
احفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال  
مجلس وزراء الصحة العرب

- إذا تناولت كمية كبيرة من عقار جانوفيا، فاتصل فوراً بطبيبك أو بمركز مكافحة السموم المحلي.
- عندما يكون جسمك تحت بعض أنواع التوتر، مثل **الحمى**، أو **الإصابات الرضحية** (الناجمة على سبيل المثال عن حادث سير)، أو **العدوى أو الجراحية**، فقد تغير الكمية التي تحتاجها من دواء مرض السكري. أخبر طبيبك فوراً إذا كنت تعاني من أيٍ من هذه الحالات واتبع تعليمات طبيبك.
- تتحقق من مستوى السكر لديك بالدّم كما أخبرك طبيبك.
- التزم بالنظام الغذائي وبرنامج التمارين الرياضية الموصوفين لك أثناء تناول عقار جانوفيا.
- تحدث إلى طبيبك حول كيفية الوقاية من انخفاض مستوى السكر بالدّم (نقص السكر بالدّم) وارتفاع مستوى السكر بالدّم (فرط السكر بالدّم) والمشاكل الناجمة عن مرض السكري الذي تعاني منه وكيفية اكتشافها وعلاجها.
- سيفحص طبيبك حالة مرض السكري الذي تعاني منه عبر إجراء اختبارات بالدّم، بما في ذلك **مستويات السكر لديك بالدّم** و**مستوى الهموجلوبين السكري**.

- ما هي الاعراض الجانبية المحتملة لعقار جاتوفي؟  
يمكن أن يسبب عقار جاتوفي أعراضًا جانبية خطيرة، بما في ذلك الآتي:

  - انظر "ما المعلومات الأكثر أهمية التي ينبغي علي معرفتها حول عقار جاتوفي؟"
  - مشاكل بالكلى، في بعض الأحيان يتطلب الأمر الخضوع للغسيل الكلوي.
  - انخفاض مستوى السكر بالدم (نقص السكر بالدم)، إذا تناولت عقار جاتوفي إلى جانب دواء آخر يمكنه خفض مستوى السكر بالدم، مثل السلفوينيل بوريا أو الأنسولين، فيكون التعرض لخطر الإصابة بانخفاض مستوى السكر بالدم أعلى. قد يتعضي الأمر خفض الجرعة الخاصة بك من دواء السلفوينيل بوريا أو الأنسولين أثناء استخدامك لعقار جاتوفي. قد تشمل علامات وأعراض انخفاض مستوى السكر بالدم الآتي:
    - صداعاً
    - ارتياكاً/النابساً
    - تعرقاً
    - نعاساً
    - شعوراً بعصبية
    - هياجاً
    - ضعفاً
    - جوغاً
    - دوخة
    - تسارع ضربات القلب  - تفاعلات حساسية خطيرة. إذا كنت تعاني من أي من أعراض احتمالات الحساسية الخطيرة، توقف عن تناول عقار جاتوفي واتصل بطبيبك فوراً أولاً قبل أن تبدأ في تناول عقار جاتوفي، أخير طببك إذا كنت قد عانيت من قبل من الآعراض التالية:
    - زيادة ضيق التنفس أو صعوبة في التنفس، خاصة عند الاستنشاء
    - تورّم أو احتباس السوائل، خاصة بالقدمين، أو الكاحلين أو الساقين
    - زيادة الوزن بشكل سريع وغير متعدد
    - تعب غير معتاد

- عقار جانوفي هو دواء وصفي يستخدم بجانب اتباع النظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضية لخفض مستوى السكر بالدم لدى البالغين المصابين بمرض السكري من النوع "2".
- عقار جانوفي غير مخصوص للاستخدام لعلاج الاشخاص المصابين بمرض السكري من النوع "1".
- إذ كنت قد أضببت بالتهاب البنكرياس في الماضي، فمن غير المعروف ما إذا كانت أكثر عرضة للإصابة بالتهاب البنكرياس أثناء تناول عقار جانوفي أم لا.
- لم يتم التحقق من أمان وفعالية استخدام عقار جانوفي في المرضى من الأطفال.

- إذا كنت تُعاني من الحساسية تجاه أي من المكونات الموجودة في عقار جانوفيلا، اطرد نهائياً دليلاً للدواء هذا لمعرفة القائمة الكاملة لمكونات عقار جانوفيلا.
- قد تتضمن أعراض إحدى تفاعلات الحساسية الخطيرة تجاه عقار جانوفيلا، فلذلك حذرأءاً يتعارض بارتز على العدل (أرتوكاريلا) أو توروم الوجه والشفتين واللسان.

والحلق مما قد يسبب صعوبة في التنفس أو البلع.  
بماذا ينبع على إخبار طببي قبل تناول عقار جاتوفيا؟  
فأنا تناولت عقار هان فإني أخذ طبتك بكافة حالاتك الطبية، بما في ذلك الحالات

الاتية:

- إذا كنت تعاني أو قد عانيت من التهاب البنكرياس.
- إذا كنت تعانى من مشاكل الأكل.

- حانه في سبب تحذيرات أو لا إذا كانت حاملة تحدث إلى طبائك حوا الطريقة
- إذا كانت تعاني من فشل القلب.
- إذا كانت حاملاً أو تخططن للحمل. من غير المعروف ما إذا كان عقار

- اذا كنت مرضعاً او تخططرين لمارسة الرضاعة الطبيعية من غير المعرف بالمتلئ لضبط مستوى السكر لديك في الدّم أثناء حملك.

ما إذا كان عقار جانوفينا يبر في حليب الأم أم لا. تحدثني إلى طبيبك حول الطريقة المثلث لإطعام طفلك إذا كنت تتناولين عقار جانوفينا.

أخير طبيبك عن جميع الأدوية التي تتناولها، بما في ذلك الأدوية التي تحصل

عليها بوصفة طيبة أو بدون وصفة طيبة والفيتامينات والمكمالت العشبية. كن على علم بالالأدوية التي تتناولها. احتفظ بقائمة بأدوينك واعرضها على طبيبك و الصيدلي، الخاص بك عند حصولك على دواء جديد.

- تناول عقار جانوفيا مرة واحدة كل يوم كما أخبرك طبيبك بالضبط.
- يمكنك تناول عقار جانوفيا مع الطعام أو بدونه.

- سيجري طبيك اختبارات بالالم للتحقق من مدى كفاءة عمل الكلى لديك قبل وأثناء علاجك بعقار جانوفينا.
- قد يخبرك طبيك بتناول عقار جانوفينا بجانب أدوية أخرى خاصة بمرض

السكري. قد يحدث انخفاض في مستوى السكر بالدم بوتيرة أكثُر عند تناول عقار جانوفيل إلى جانب أدوية أخرى خاصة بمرض السكري. انظر "ما هي الأعراض الجانبية المحتملة لعقار جانوفيل؟"

- إذا ألغلت تناول إحدى الجرّاءات، فتناولها بمجرد تذكر لها. إذا لم تذكر حتى حول موعد تناول الجرّاءة التالية، فتجاوز الجرّاءة التي أغفلتها واستمر في تناول الجرّاءات وفقاً لجدول المعتاد. لا تتناول جرّاءتين من عقار جانوفير في الوقت نفسه.

