

يرجى قراءة هذه النشرة بعناية قبل أن تتدنى في استخدام هذا الدواء. فهي تحتوى على ملخص للمعلومات المتوفرة

عن الدواء الخاص بك. إذا كانت لديك آية أسئلة بعد قراءة هذه النشرة، فاسأل الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.

عن الدواء الخاص بك

اسم الدواء الخاص بك هو كريبنون® ٨٪ بروجسترون جل مهيلي. المادة الفعالة به هي هرمون بروجسترون. كمية

الجل عند كل استخدام تحتوى على ٩٠ مجم من هرمون بروجسترون.

كما يحتوى الجل على المواد غير الفعالة التالية: جلسرين، سائل برافين خفيف، جلسريدات زيت النخيل المهرجة، كاربومير ٩٧٤، محض سوربيك، بولي كاربولي، هيدروكسيد صوديوم وماء مقطر.

يتجاوز كريبنون® ٨٪ بروجسترون جل مهيلي في عبوات تحتوى على ١٥ آية استخدام، ينتهي الدواء الخاص بك الذي يحتوى على هرمون بروجسترون إلى مجموعة من الأدوية تسمى هرمونات أنوثوية.

يستخدم الدواء الخاص بك في:

يستخدم كريبنون® ٨٪ بروجسترون جل مهيلي لعلاج العقم الناتج عن وجود مستويات غير طبيعية من هرمون بروجسترون الأنثوي خلال الدورة الشهرية. كما يتم استخدامه أثناء عملية التلقيح المجهري في سيدات لديهن دورات شهرية مع تبوضع طبيعى، عندما يكون العقم ناتجاً عن مشاكل بقفاتي فالوب أو الرحم. في بعض الأحيان، قد لا يوجد سبب واضح للعقم.

قبل استعمال الدواء الخاص بك:

يرجى قراءة الأسئلة التالية. إذا كانت إجابتك لأي منها بـ «نعم»، فأخبر الطبيب أو الصيدلي الخاص بك قبل بدء العلاج:

- هل لديك حساسية تجاه أي من المكونات المذكورة أعلاه؟
- هل تتعانين بأى نزيف غير معناد أو نزيف غير من المهبل لمسبب غير معروف؟
- هل تقومن بالاصداع الطبيعى؟
- هل تعانين من المرض الواثئي الخاص بعملية التمثيل الغذائي الذي يسمى البرفيرية؟
- هل تستخدمني أية مستحضرات مهيلية أخرى؟
- هل تعانين أولديك شك بأنك تعانين من ورم ذي حساسية للهرمونات؟

محض سوربيك هو أحد المواد المسواغ التي لديها القدرة على إحداث تهيج بالجلد وتسبب الالتهاب (أي التهاب الجلد).

اتخذى انتباها خاصاً مع الدواء الخاص بك:

- تحدثى إلى الطبيب أو الصيدلي الخاص بك إذا كنت تعانين من مرض شديد بالكليد.
- إذا كان لديك تاريخ مرضي شخصي أو عائلي من جلطات الدم.
- إنك كانت هناك بعض التقارير المتفققة عن عناصر مصايب استخدام هذا الدواء؛ لذا تتبئى إذا كنت تعانين القادة أو تشنج الآلات.
- توقفى عن العلاج في حالة الإجهاض.
- في حالة الشك، يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي الخاص بك قبل استخدام هذا المستحضر.

كيفية استخدام الدواء الخاص بك:

يستخدم مرة واحدة كل يوم، ابتداءً من بعد أن يخبرك طبيبك أن عملية التبوضع لديك قد تمت، أو في اليوم الـ ١٨ - ٢١ من دورتك الشهرية. (اليوم الأول من دورتك الشهرية هو اليوم الذي يبدأ فيه الحيض لديك) عند استخدامه أثناء عملية التلقيح المجهري، يجب موافلة الاستخدام اليومي لديك لمدة ٣، يوماً إذا كان هناك دليل معملى على الحمل.

يتم استخدام الجل مباشرةً بواسطة الأداة المعلقة المصممة خصيصاً لوضعه داخل المهبل. قومي بتنزع الغلاف عن الأداة، لا تقومي بإدارة الغطاء لنزعه هذه المرة.

١- امسكى الأداة من الطرف السميكة. قومي بهزها للأعلى مثل مقاييس الحرارة؛ لضمان وصول المحتويات إلى الطرف الرقيق.

بعد استخدام الدواء الخاص بك:

كانت هناك تقارير متفرقة عن حدوث تعاس أثناء العلاج بـ كريبنون® ٨٪ بروجسترون جل مهيلي. إذا كنت تعانين من هذا التأثير، فيرجى عدم ممارسة القيادة أو تشغيل الآلات.

كما توجد تقارير عن حدوث صداع، ألم بالثدي، تهيج المهبل، حرقة، نزيف طفيف أو «تقطّع». كما كانت هناك تقارير نادرة عن حدوث حكة ونفخات فرط الحساسية التي يمكن أن تؤدي إلى طفح جلدي.

إذا عانيت من هذه الآثار وأصبحت مزعجة، أو عانيت من آثار جانبية أخرى، فيرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.

حفظ الدواء الخاص بك:

يجب حفظ هذا المستحضر في درجة حرارة الغرفة (أقل من ٣٠ درجة مئوية).

مثل جميع الأدوية، يجب حفظ آداته الاستخدام في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال.

لا تستخدمي الدواء الخاص بك بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المطبوع على البطاقة.

للمزيد من الإستفسارات داخل مصر، الاتصال برقم ١٦٩٣٥

الشركة صاحبة حق التسويق:

ميرك سيرونو المحدودة

قطاع بيوفونت

طريق ستانليون

فيشام، ميدلسكس

TW14 8NX

المملكة المتحدة.

الشركة المصئعة:

معامل شركة فليت المحدودة

٤ شارع ريكمنس وورث


ونغورد

هاتفون داير ٧JJ WD18 7JJ

المملكة المتحدة.

هذا دواء



- الدواء منتج يُؤثر على صحتك، واستعماله بطريقة مخاطية للمهبل؛ لتوفير إطلاق طويل الأمد لهرمون بروجسترون.
- اتبع وصفة الطبيب بشكل صارم وطريقة الاستعمال وتعليمات الصيدلي الذي ي开具ك الدواء.
- الطبيب والصيدلي خبريران بالأدوية وفواندها ومخاطرها.
- لا توقف من تلقاء نفسك فترة العلاج التي وصفها لك الطبيب.
- لا تكرر الوصفة الطبية دون استشارة طبيب.
- احفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال.



٢- قومي بإدارة الغطاء لنزعه والتخلص منه.



٣- يمكن إدخال الأداة في المهبل وأنت في وضع الجلوس أو عند استلائك على ظهرك مع ثني الركبتين. قومي بإدخال الطرف الرفيع للأداة برفق جيداً داخل المهبل.



٤- اضغطى على الطرف السميكة بإحكام؛ لوضع الجل. أخرجي الأداة، وتخلصي منها في حاوية النفايات.

٥- يقوم الدواء الخاص بك بتحفظ الأغشية المخاطية للمهبل؛ لتوفير إطلاق طويل الأمد لهرمون بروجسترون.

إذا نسيت استخدام دوايتك في اليوم المعتمد لاستعماله، فلا تقلقى. فقط استخدمي الدواء في اليوم التالي ثم استمري بعد ذلك كالسابق.