

 اندروكيور ^(P)١٠ ميليغرام أقراص	
المادة الفعالة: أسيتات السيبروتيرون	
Bayer Schering Pharma	

نشرة العبوة:

معلومات لمستخدم الدواء

اندروكيور ١٠ ميليغرام أقراص

المادة الفعالة: أسيتات السيبروتيرون

إن هذا الدواء :

- الدواء مستحضر مؤثر على صحنك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للمخاطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلانى الذى صرفها لك.
- فالطبيب والصيدلانى هما الخبيران بالدواء وينفعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفه طبية.

لا تترك الأدوية فى متناول أيدي الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب

اتحاد الصيادلة العرب

اقرأ كل هذه النشرة بعناية قبل بداية تناول هذا المستحضر.

- احتفظ بهذه النشرة. يمكن أن تحتاج قراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة إضافية أخرى. اسأل طبيبك أو الصيدلي
- هذا الدواء تم وصفه لك. لا تعطيه للآخرين. يمكن أن يسبب الضرر لهم. حتى في حالة غائل الاعراض بينكم.
- إذا اصبحت أي من الآثار الجانبية خطيرة. أو إذا لاحظت أي آثار جانبية غير مذكورة في هذه النشرة. الرجاء ابلاغ طبيبك أو الصيدلي.

١- ما هو اندروكيور ١٠ ميليغرام و فيما يستخدم
٢- قبل تناول اندروكيور ١٠ ميليغرام
٣- كيف يجب تناول اندروكيور ١٠ ميليغرام
٤- الآثار الجانبية المحتملة
٥- تخزين اندروكيور ١٠ ميليغرام
٦- معلومات إضافية

١- ما هو اندروكيور ١٠ ميليغرام و فيما يستخدم

اندروكيور ١٠ ميليغرام هو مضاد لهرمون الأندروجين.

المادة الفعالة في اندروكيور ١٠ ميليغرام تثبط (تمنع) تأثير الهرمونات الذكرية (الأندروجين). التي هي أيضاً تتكون - إلى حد أقل - في الأنثى.

يتم تناول اندروكيور ١٠ ميليغرام لعلاج علامات الرجولة (الذكورة) الواضحة في السيدات. التي جعل العلاج الهرموني ضروري:

- الأشكال الشديدة حب الشباب (عد). عندما تكون مصحوبة بالتهاب أو تكون عقد (حب شباب حطاطي بثاري. حب شباب عقيدى كيسي) أو إذا وجد خطورة للتندب.
- من أشكال متوسطة الشدة إلى أشكال شديدة (وخيمة) لزيادة نمو غير طبيعي لشعر الوجه و الجسم (كثرة الشعر الذكري النمط خصوصاً لدى النساء).
- من أشكال متوسطة الشدة إلى أشكال شديدة (وخيمة) لصلع يعتمد على هرمون الأندروجين (صلع ذكري الشكل - ثعلبة).

في حالة عدم إثبات فاعلية أسيتات السيبروتيرون من الناحية الطبية في جرعة منخفضة كجزء من جرعة منخفضة يتم تناولها في نفس الوقت مع الاستروجين ٢ ميليغرام / ٠.٣٠ ميليغرام أو ٢ ميليغرام / ٠.٣٥ ميليغرام (أقراص منع الحمل المركبة التي يتم تناولها عن طريق الفم و تسمى «حبوب منع الحمل») أو عندما يفشل علاج آخر مضاد للاندروجين. عند علاج حب الشباب (العد). يجب على الطبيب أن يوازن في اختياره بين العلاج الهرموني والعلاج بمضاد حيوي شامل للجسم كله.

٢- قبل تناول اندروكيور ١٠ ميليغرام

لا تتناول اندروكيور ١٠ ميليغرام.

- إذا كان لديك أرجية (فرط الحساسية) لأسيتات السيبروتيرون أو لأي من المكونات الأخرى في اندروكيور ١٠ ميليغرام.
- في حالة الإصابة بأمراض للكبد (تشمل اضطرابات الاطراح (الاخراج). مثل متلازمة دوبين - جونسون و متلازمة روتور).
- إذا كان لديك في الماضي أو لديك الآن أورام كبد.
- إذا كان لديك أمراض خبيثة معروفة أو مشتبه في ذلك.
- إذا كان قد تم تشخيص ان لديك ورم سحائي (عامة ورم حميد للسحايا).
- إسأل طبيبك. إذا كان لديك الشك في ذلك.
- في حالة وجود اكتئاب مزمن وخيم.
- إذا كان لديك في الماضي أو الآن أمراض مصحوبة مع جلطات دموية (خثار) في الأوردة و / أو الشرايين (خاصة سكتة. احتشاء القلب).
- إذا كان لديك داء سكري وخيم (السكري) مع تغييرات وعائية.
- في حالة خلایا دم حمراء متغيرة (داء الكريات المنجلية).
- أثناء الحمل.
- فترة الإرضاع من الثدي.
- إذا كنت تعاني نرف من المهبل. و لم يحدد طبيبك السبب.
- إذا كان لديك يرقان في الماضي (يرقان الحمل غير معروف السبب). حكة مستمرة (حكة الحمل) و / أو طفح فقاعي (تشبه الفقاع الحملPemphigoid gestationis) خلال حمل سابق.
- انتبه لموانع الاستخدام و اسباب إيقاف تناول هرمون الإستروجين أو مركب من بروجستوجين - إستروجين (أقراص منع الحمل التي يتم تناولها عن طريق الفم و تسمى «حبوب منع الحمل»). التي هي مذكورة في نشرات العبوة الخاصة بكل منهم.

إتخذ عناية خاصة مع اندروكيور ١٠ ميليغرام عامة

قبل بداية التناول. يجب القيام بفحص طبي عام و أيضاً فحص خاص بطب النساء.

يجب التأكد من عدم وجود حمل. لأن تناول اندروكيور ١٠ ميليغرام أثناء الحمل يمكن أن يسبب علامات انثوية (مُتَنَاثٌ) فى الوليد الذکر.

يجب تناول اندروكيور ١٠ ميليغرام في نفس الوقت مع إستروجين مناسب أو مستحضر مناسب يحتوي على مركب بروجستوجين - إستروجين (أقراص منع الحمل التي يتم تناولها عن طريق الفم و تسمى «حبوب منع الحمل») لدى السيدات الناضجات جنسيا.

هذه هي الإمكانية الوحيدة لتجنب اضطرابات الدورة الشهرية و النزف الغير منتظم و الحصول على الوقاية اللازمة لمنع الحمل.

على الرغم من أن أسيتات السيبروتيرون (المادة الفعالة في اندروكيور ١٠ ميلیغرام) لديها أيضاً تأثير مانع للحمل عندما يتم تناولها في نفس الوقت مع الاستروجين أو مع مركب من أسيتات السيبروتيرون - الاستروجين من وسائل منع الحمل المناسبة. فإنه لا ينبغي أن يتم تناولها حصراً لمنع الحمل و لكن يتم تناولها فقط في النساء اللاتي ينبغي علاجهن من الاضطرابات الجلدية التي تعتمد على الاندروجين (انظر أيضاً الجزء ١. ما هو اندروكيور ١٠ ميليغرام و فيما يستخدم ٥). النساء اللاتي يتم معالجتھن بأسيتات السيبروتيرون و يتناولن في نفس الوقت الاستروجين و / أو مع مركب من الاستروجين - البروجسترون المناسب. لا ينبغي تناولهن لأي مانع حمل إضافي. الذي يتم تناوله عن طريق الفم («حبوب منع الحمل») أثناء تناول هذا العلاج. لابد من ملاحظة التناول المنتظم من أجل تحقيق حماية منع الحمل.

ما الذي يجب القيام به في حالة حدوث نرف غير متوقع

إذا حدث نرف قليل «غير متوقع» خلال ثلاثة أسابيع من تناول هذه المجموعة المركبة. لا تقاطع استخدام

المستحضر مع ذلك إذا حدث نرف شديد يجب إخطار طبيبك.

ما الذي يجب القيام به في حالة عدم حدوث النزف الدوري

في الحالة الإستثنائية بعدم حدوث نرف خلال ٧ أيام الفترة الفاصلة . التي لا يتم تناول الأقراص فيها . يجب إيقاف العلاج و اخطار الطبيب. قد لا تستمر في تناول الأقراص إلى أن يستبعد طبيبك الحمل على وجه اليقين. **الكبد**

الرجاء. ابلاغ طبيبك فوراً. إذا كنت تعاني أي من الأعراض التالية.

- توعلك عام. حمى (ارتفاع درجة حرارة الجسم). غثيان. قيء. فقدان الشهية. حكة للأنحاء الجسم بأكمله.
- يرقان للجلد والعينين. لون فاتح للبراز. تلون البول بلون داكن. قد تكون هذه الأعراض علامات لتلف الكبد. بما في ذلك التهاب الكبد (التهاب كبدى).

◀ قد لوحظ في المرضى الذين عولجوا باندروكيور ١٠ ميليغرام حدوث اضطرابات لوظيفة الكبد. بعض الالتهابات الشديدة (اليرقان. التهاب الكبد [التهاب كبدى]). تعتمد اضطرابات وظيفة الكبد على الجرعة و تتطور عموماً على مدى عدة أشهر بعد بدء العلاج. هذا هو السبب الذي سوف يجعل طبيبك يفحص وظيفة الكبد قبل بدء العلاج وعلى فترات منتظمة أثناء العلاج. خاصة إذا كان هناك أي أعراض أو علامات. التي تشير إلى تلف الكبد. إذا تم التحقق من الاشتباه بتلف الكبد. طبيبك سوف يوقف العلاج بتناول اندروكيور ١٠ ميليغرام.

◀ ألم غير عادي في المنطقة الواقعة فوق المعدة (شرسوفي). والذي لا يزول من تلقاء نفسه في غضون فترة زمنية قصيرة. يمكن لهذا الألم أن يكون مؤشراً لأورام الكبد الحميدة أو الخبيثة. والذي يمكن أن يؤدي إلى نرف داخل البطن الذي يهدد الحياة.

السكر مرض السكري (داء السكري)

الرجاء. إبلاغ طبيبك إذا كنت تعاني من مرض السكري (داء السكري). قد يكون ضروري ضبط الجرعة لعلاج مرض السكري. ولذلك. لابد من مراقبة دقيقة لسكر المرض السكري خلال فترة العلاج باندروكيور ١٠ ميليغرام (انظر أيضاً الجزء ٢. قبل تناول اندروكيور ١٠ ميليغرام)

تناول اندروكيور ١٠ ميليغرام مع أدوية أخرى:

رجاء اخطار طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول/ تستخدم حالياً أو قد تناولت/ استخدمت حديثاً أي أدوية أخرى. حتى إذا كانت هذه الأدوية تصرف بدون تذكرة طبية. هذا مهم خاصة للمستحضرات الطبية. التي تحتوي كيتوكونازول. ايتراكونازول. كلوتريمازول (لمكافحة عدوى الفطريات).

◀ ريتونافير (مضاد للفيروسات).

◀ ريفاميسين (العلاج الدرن).

◀ فنيتوين (لعلاج مرض الصرع):

و مستحضرات تحتوي على عشب سان جون. لأنهم يمكن أن يكون لهم تأثير على تركيز المادة الفعالة. أسيتات السيبروتيرون. في الجسم.

رجاء الملاحظة. أن هذه المعلومات يمكن أن تنطبق أيضاً على الأدوية التي تم تناولها حديثاً.

الحمل و الارضاع من الثدي

يجب عدم تناول اندروكيور ١٠ ميليغرام خلال فترة الحمل و اثناء الارضاع من الثدي.

استشر طبيبك أو الصيدلي للنصيحة قبل تناول أي دواء.

القدرة على القيادة و استخدام الآلات.

لم يتم إجراء أي خريات بشأن الآثار على القدرة على القيادة واستخدام الآلات.

معلومات هامة عن بعض مكونات اندروكيور ١٠ ميليغرام:

هذا المستحضر الطبي يحتوي على لاكتوز. لذلك. الرجاء تناول اندروكيور ١٠ ميليغرام فقط بعد الإستشارة مع طبيبك. إذا كنت تعلمين أنك تعانين من عدم التحمل لبعض السكريات.

٣- كيف يجب تناول اندروكيور ١٠ ميليغرام

اندروكيور ١٠ ميليغرام أقراص يتم تناولها عن طريق الفم.

دائماً تناول اندروكيور ١٠ ميليغرام تماماً وفقاً لتعليمات طبيبك. يجب المراجعة مع طبيبك أو الصيدلي إذا كنت غير متأكد.

كيف و متى يتم تناول اندروكيور ١٠ ميليغرام

يجب تناول الأقراص كاملة (غير مكسورة أو مقسومة) (بدون مضغها) مع كمية وفيرة من سائل (يفضل مع كوب من ماء للشرب). الجرعة الاعتيادية للعلاج المركب مع احدى الإستروجينات أو مع مركب بروجستوجين - إستروجين هي:

تناول ١ قرص اندروكيور ١٠ ميليغرام من يوم ١ إلى يوم ١٥ من فترة العلاج المركب. إضافة لذلك تناول من يوم ١ إلى يوم ٢١. في نفس الوقت إستروجين مناسب أو مستحضر مناسب يحتوي على مركب بروجستوجين - إستروجين (مانع حمل الذي يتم تناوله عن طريق الفم «حبوب منع الحمل»).

يوم ١ من التناول	١٥	٢١	١
●●●●●●●● ○○○○○○○○	●●●●●●●● ○○○○○○○○	●●●●●●●● ○○○○○○○○	●●●●●●●● ○○○○○○○○
		٧ أيام راحة بدون تناول أقراص	◀●● ◀○○
نرف			نرف
يوم ١ من الدورة الشهرية			

● ١ قرص اندروكيور ١٠ ميليغرام

○ ١ قرص مغلف من إستروجين أو من مركب بروجستوجين - إستروجين (مانع حمل الذي يتم تناوله عن طريق الفم «حبوب منع الحمل») يتم تناوله

يجب أن البدء في تناول المستحضرين من يوم ١ من الدورة (يوم ١ من الدورة الشهرية).

فقط السيدات. اللاتي لا تخضن. البدء مباشرة بالعلاج الموصوف من الطبيب. في هذه الحالة. اعتبري يوم ١ من التناول كاليوم ١ من الدورة الشهرية و لمزيد من الحسابات بناء على التوصيات.

ينزع أول قرص اندروكيور ١٠ ميليغرام من المنطقة التى في عبوة الروزنامة. التي تتطابق مع يوم الاسبوع الذى ابتدأ فيه البرنامج العلاجي (مثلاً Mo- ليوم الإثنين). و يجب تناول القرص كامل (غير مكسور أو مقسوم) (بدون مضغه).

توقيت تناول المستحضر في اليوم غير مهم. مع ذلك. يجب الاستمرار مع هذا التوقيت. ما إن تم إختيارك له. الآن. تناول قرص كل يوم في اتجاه السهم (١٤ بالإجمال) و إختتم بالقرص من المنطقة الموسومة بعلامة الـ ١٥. لمدة ٦ أيام أخرى. تناولي فقط الإستروجين أو مركب بروجستوجين - إستروجين (مانع حمل الذي يتم تناوله عن طريق الفم «حبوب منع الحمل») أيّا كان الذي تتناولينه. بعد ذلك. توقفي عن تناول الأقراص لمدة ٧ أيام. خلال هذه الفترة سوف يحدث نرف. بعد أربعة أسابيع من بداية تناول الأقراص. يعني ذلك في نفس اليوم الأسبوعى. أبدأني مع العلاج المركب التالي. بصرف النظر ما إذا توقف النزف من قبل أو لا يزال مستمر.

طول المدة الزمنية لتناول اندروكيور ١٠ ميليغرام

سوف يحدد طبيبك طول مدة العلاج اعتماداً على نوع و شدة أعراض الرجولة (الذكورة) المرضية و الإستجابة للعلاج. العلاج يجب أن يمتد لعدة شهور.

إ ذا حدث عدم وجود نجاح أو نجاح غير كافى بعد علاج

◀ حب الشباب الشديد (عد) لفترة ٦ شهور أو

◀ لعلاج صلغ أو لفرط الشعر الذكري النمط خصوصاً لدى النساء بعد مدة علاج لا تقل عن ١٢ شهر.

قد ينظر طبيبك في زيادة جرعة أسيتات السيبروتيرون. التي يتم تناولها في نفس الوقت مع الإستروجين أو مستحضر مناسب يحتوي على مركب بروجستوجين - إستروجين.

عندما يتم تحقيق نجاح بشكل كاف عن طريق العلاج. يمكن الاستمرار بجرعة منخفضة من أسيتات السيبروتيرون في نفس الوقت مع الإستروجين أو مع مضاد لهرمون الأندروجين الستيرويد الجنسي.

يجب أيضاً أن تنتبهي للتوجيهات الإضافية المتاحة في نشرة عبوة الإستروجين أو المستحضر المناسب الذي يحتوي على مركب بروجستوجين - إستروجين (مانع حمل الذي يتم تناوله عن طريق الفم «حبوب منع الحمل») الذي تتناولينه.

معلومات إضافية عن فئات خاصة من المرضى

الأطفال و المراهقين

يمكن فقط تناول اندروكيور ١٠ ميليغرام بعد اتمام مرحلة البلوغ.

لا يمكن استبعاد تماماً الآثار الغير مرغوبة التي يمكن أن تحدث من اندروكيور ١٠ ميليغرام قبل نهاية البلوغ على قامة المريضة (النمو في الطول).

لا توجد بيانات تطالب بتعديل الجرعة.

لم يتم إثبات في التجارب السريرية سلامة و فعالية اندروكيور لدى الأطفال والمراهقين دون سن ١٨ عاما.

المرضى كبار السن (٦٥ سنة أو أكثر)

يتم فقط تناول اندروكيور ١٠ ميليغرام فى النساء اللاتى لديهن احتمال الإنجاب.

المرضى اللاتي لديهن مرض في الكبد

لا تتناول اندروكيور ١٠ ميليغرام. إذا كنت تعاني من مرض في الكبد (أنظر أيضاً الجزء ٢ «لا تتناول اندروكيور ١٠ ميليغرام»).

المرضى اللاتي لديهن خلل كلوي

لم تكن هناك أي دراسات أجريت على خصائص حركية اندروكيور ١٠ ميليغرام (الامتصاص. التوزيع. الانحلال و الإخراج) في المرضى اللاتي لديهن خلل لوظائف الكلى.

إذا تناولتي اندروكيور ١٠ ميليغرام أكثر من المفروض تناوله

لا توجد مؤشرات خطيرة تشير نحو الآثار الصحية الضارة الناجمة عن جرعة زائدة من اندروكيور ١٠ ميليغرام.

إذا نسيتي تناول اندروكيور ١٠ ميليغرام:

إذا نسيتي تناول اندروكيور ١٠ ميليغرام في التوقيت المعتاد. يجب أن تستمري في تناول العلاج المركب في وقته. مع اسقاط الجرعة المناسبة.

لا تتناولي الجرعة (الجرعات) المنسية.

نسيان تناول جرعة اندروكيور ١٠ ميليغرام يمكن أن ينتج عنها انخفاض الفاعلية و نرف بين الدورات.

إذا نسيتي تناول قرص مغلف من مركب بروجستوجين - إستروجين (مانع حمل الذي يتم تناوله عن طريق الفم «حبوب منع الحمل) يجب تناوله على أبعد تقدير خلال ١٢ ساعة من التوقيت المعتاد. حيث بخلاف ذلك. تأثيره المانع للحمل يصبح مهدد.

الرجاء. الإنتباه للمشورة و التوصيات المتاحة في نشرة العبوة (خاصة فيما يتعلق بتأثير مانع الحمل في حالة الجرعات المفقودة. للإستروجين أو لمركب بروجستوجين - إستروجين (مانع حمل الذي يتم تناوله عن طريق الفم «حبوب منع الحمل) الذي تتناولينه.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى عن تناول هذا المنتج. اسألى طبيبك أو الصيدلي.

٤- الآثار الجانبية المحتملة

مثل كل الأدوية. يمكن أن يسبب اندروكيور ١٠ ميليغرام آثار جانبية. لكن لا يصاب بها كل شخص.

الآثار الجانبية المبلغ عنها الأكثر شيوعاً لدى المرضى اللاتي تتناولن اندروكيور ١٠ ميليغرام. هي النزف بين دورات

الحيض، زيادة الوزن و الاكتئاب.

أخطر التفاعلات الدوائية الضارة تتضمن أورام الكبد الحميدة و الخبيثة، و التي قد تسبب نزف داخل

البطن يهدد الحياة.

الرجاء، إبلاغ طبيبك فوراً، إذا كنت تعاني أي من الأعراض التالية.

⬅توسعك عام، حمى (ارتفاع درجة حرارة الجسم)، غثيان، قيء، فقدان الشهية، حكة لأنحاء الجسم بأكمله، يرقان للجلد والعينين، لون فاتح للبراز، تلون البول بلون داكن. قد تكون هذه الأعراض علامات لتلف الكبد. بما في ذلك التهاب الكبد (التهاب كبدي).

⬅قد لوحظ في المرضى اللاتي تم علاجهن باندروكيور ١٠ ميلليغرام حدوث اضطرابات لوظيفة الكبد. بعض الالتنهايات الشديدة (اليرقان، التهاب الكبد [التهاب كبدي]، تعتمد اضطرابات وظيفة الكبد على الجرعة و تنشأَ عموماً على مدى عدة أشهر بعد بدء العلاج. هذا هو السبب الذي سوف يجعل طبيبك سيفحص وظيفة الكبد قبل بدء العلاج وعلى فترات منتظمة أثناء العلاج. خاصة إذا كان هناك أي أعراض أو علامات، التي تشير إلى تلف الكبد. إذا تم التحقق من الاشتباه بتلف الكبد، طبيبك سوف يوقف العلاج بتناول اندروكيور ١٠ ميلليغرام.

⬅آلم غير عادي في المنطقة الواقعة فوق المعدة (نتريسوفي). و الذي لايزول من تلقاء نفسه في غضون فترة زمنية قصيرة. يمكن لهذا الألم أن يكون مؤشراً لأورام الكبد الحميدة أو الخبيثة. والذي يمكن أن يؤدي إلى نزف داخل البطن الذي يهدد الحياة.

تم الإبلاغ عن الآثار الجانبية التالية التي لها صلة مع اندروكيور ١٠ ميلليغرام.

لا يمكن تقدير تكرار حدوثها من البيانات المتاحة.

الأورام، حميدة، خبيثة و غير محددة (بما في ذلك الخراجات و السلائل): أورام حميدة و خبيثة للكبد*.

اضطرابات الجهاز المناعي: تفاعلات الحساسية (تفاعلات حساسية زائدة).

اضطرابات الأيض و التغذية: زيادة الوزن، وفقدان الوزن، وارتفاع في نسبة السكر في الدم لدى مرضى

السكري

اضطرابات الكبد و المرارة: اضطرابات وظيفة الكبد، يرقان، التهاب الكبد (التهاب كبدي).

الاضطرابات النفسية: الاكتئاب، انخفاض في الدافع الجنسي (الرغبة الجنسية)، زيادة في الرغبة الجنسية

(الشهوة الجنسية)

اضطرابات الجهاز الهضمي: نزيف داخل البطن*.

اضطرابات الجلد و النسيج تحت جلدي: تفاعلات جلدية.

اضطرابات الجهاز التناسلي و الثدي: آلام، ألم الثدي أو تكبير الثدي. خاصة في بداية العلاج. عدم انتظام

الحيض أو عدم حدوث الحيض، بقع دم*.

* لمزيد من المعلومات، راجع أيضا الجزء ٢، «قبل تناول اندروكيور ١٠ ميلليغرام» إتخذ عناية خاصة مع

اندروكيور ١٠ ميلليغرام:

تم التبليغ عن حدوث ورم سحائي (عامة أورام حميدة للسحايا) مرتبط بتناول اندروكيور ١٠ ميلليغرام لمدة طويلة (سنوات) في جرعات ٢٥ ميلليغرام يوميا و أكثر.

من الشائع التبليغ عن شكاوى بالمعدة و غثيان مرتبط مع المستحضرات الطبية، التي تحتوي على

أسيئات السيبروتيرون، التي هي المادة الفعالة في اندروكيور ١٠ ميلليغرام.

على الرغم من أن أسيئات السيبروتيرون (المادة الفعالة في اندروكيور ١٠ ميلليغرام) أيضاً لها تأثير

مانع للحمل عند تناولها في نفس الوقت مع هرمون الاستروجين أو مركب أسيئات السيبروتيرون -

الاستروجين المركب، فإنه لا ينبغي أن يتم تناولها حصرا لمنع الحمل و لكن يتم تناولُها فقط في النساء

اللاتي ينبغي علاجهن من الأمراض الجلدية التي تعتمد على الاندروجين (انظر أيضا: «ما هو اندروكيور ١٠ ميلليغرام و فيما يستخدم»).

النساء اللاتي تعالجن بتناول أسيئات السيبروتيرون في نفس الوقت مع هرمون الاستروجين أو مع مركب

من الاستروجين -البروجيستيرون المناسب، لا ينبغي أن تتناولن أي مانع للحمل إضافي يتم تناوله عن طريق الفم («حبوب منع الحمل») خلال هذا العلاج.

لايد من ملاحظة تناول المنتظم من أجل تحقيق حماية منع الحمل.

علاوة على ذلك، يجب الإلتباه لكل المعلومات الموجودة في جزء الآثار الجانبية في نشرة عبوة الإستروجين أو مركب بروجيستيوجين - إستروجين الذي تتناوليه (مانع حمل الذي يتم تناوله عن طريق الفم «حبوب منع الحمل»).

إذا اصبحت أي من الآثار الغير مرغوبة خطيرة، أو إذا لاحظتى أي آثار غير مرغوبة ليست مذكورة في هذه النشرة، الرجاء إبلاغ طبيبك أو الصيدلي.

٥- تخزين اندروكيور ١٠ ميلليغرام

يحفظ بعيداً عن متناول أيدي و نظر الأطفال.

لا تتناول المستحضر بعد تاريخ انتهاء المفعول المذكور على العبوة الخارجية.

يشير تاريخ انتهاء المفعول لأخر يوم في الشهر المذكور.

يحفظ في درجة حرارة أقل من ٣٠ درجة مئوية.

٦ – معلومات إضافية

ماذا يحتوي اندروكيور ١٠ ميلليغرام:

المادة الفعالة:

أسيئات السبروتيرون

يحتوي ١ قرص على ١٠ ميلليغرام أسيئات السبروتيرون.

المكونات الأخرى هي:

لاكتوز احادي المائية، سيليكا غروانية لا مائية، ستيارات المغنيزيوم (دستور الأدوية الأوروبي)

نشاء الذرة، و بولي فيدون ٢٥٠٠٠.

ماذا يشبه اندروكيور ١٠ ميلليغرام و محتويات العبوة:

أقراص اندروكيور ١٠ ميلليغرام لونها من أبيض لأصفر باهت، مع حز زخرفي على أحد جوانبها و على

الجانب الآخر نقش للحروف “BW” داخل مضلع سداسي منتظم.

الغرض من الحز الزخرفي هو لكسر القرص لسهولة البلع؛ و ليس لتقسيم القرص إلى جرعات متساوية.

اندروكيور ١٠ ميلليغرام متوفر في عبوات تحتوي على ١٥ قرص.

المصنع

شيرخ جي ام بي اتش اند كو.

برودكشن كي جي

فايمر - ألمانيا

التابع لشركة

باير شيرخ فارما ايه جي

ألمانيا

آخر اعتماد لهذه النشرة في

مايو ٢٠١٢.