

LOW-LIP®

Gemfibrozil

Description :

LOW-LIP® (Gemfibrozil) est un hypolipémiant qui abaisse le cholestérol total et les triglycérides sériques. Ces réductions se présentent dans la fraction des LDL et celle des VLDL. LOW-LIP® augmente aussi le cholestérol des HDL.

Propriétés :

Le Gemfibrozil est bien absorbé, largement lié aux protéines plasmatiques et métabolisé essentiellement dans le foie, donc le métabolite principal est l'acide benzoïque. La re-absorption intestinale est une partie importante du métabolisme du Gemfibrozil. Environ 70% du Gemfibrozil sont éliminés par les reins ayant une demi-vie d'élimination de 1.4 heures.

Indications :

LOW-LIP® est indiqué pour le traitement de certains troubles métaboliques des lipides lesquels ne sont pas affectés par un changement du régime ou par d'autres facteurs tels que les exercices ou la perte du poids. En plus d'une pression artérielle élevée et les cigarettes, un taux sanguin élevé des lipides est considéré comme le facteur de risque majeur pour l'incidence et la progression de l'athérosclérose. LOW-LIP® peut aussi être utilisé en cas de troubles métaboliques des lipides en association avec d'autres maladies comme le diabète, la goutte, ou bien d'autres maladies lesquelles continuent à se progresser malgré le contrôle sur la maladie présente.

Posologie et administration :

Un comprimé de LOW-LIP® dans le matin et dans le soir, 30 minutes avant un repas.

Contre-indications :

Hypersensibilité au Gemfibrozil.

Alcoolisme, insuffisances rénales ou hépatiques sévères y compris la cirrhose biliaire primaire et les maladies pré-existante de la vésicule biliaire avec ou sans calcul biliaire.

Précautions :

Les lipides sériques doivent être contrôlés avant de commencer un traitement au Gemfibrozil, avec un régime approprié, des exercices, l'arrêt des cigarettes, limitations de l'alcool, réduction du poids chez les patients obèses, et le traitement des causes des hyperlipidémies secondaires tels que l'hypothyroïdisme et le diabète.

Une surveillance de la thérapie et des tests de laboratoires appropriés doivent être fait avant le traitement.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :

Utiliser pendant la grossesse seulement si les avantages justifient clairement les risques potentiels sur la mère ou le fœtus. Arrêter l'allaitement ou la thérapie, par considération de l'importance du médicament pour la mère.

Interactions médicamenteuses :

- Anticoagulants : Le Gemfibrozil peut augmenter l'effet thérapeutique de ces produits.
- Contraceptives oraux à l'estrogène : Informer votre médecin si vous prenez des contraceptives oraux car ceux-ci peuvent être la raison de vos troubles lipidémiques.
- La Lovastatine et les autres inhibiteurs de la HMG-CoA réductase: Des myosites sévères ont été rapportés en cas de thérapie à combinaison du Gemfibrozil avec la Lovastatine. Cependant, ils ne doivent pas être utilisés ensemble.
- Les taux de la ciclosporine peuvent être réduits en cas de thérapie concurrente avec le



Gemfibrozil.

- Le Rifampine peut réduire les taux du Gemfibrozil.

- Une biodisponibilité réduite du Gemfibrozil peut se présenter si utilisé simultanément avec des médicaments à base de granule à résine comme le Coléstipol. L'administration de ces deux médicaments doit être séparée par au moins deux heures.

Effets secondaires :

Les effets communs sont les effets gastro-intestinaux transitoires qui comprennent : Dys-pepsie, douleur abdominale, diarrhée, nausée, douleur épigastrique, vomissement et ballonnements.

Rares cas : Céphalée, dermatite, vue trouble, fatigue et vertiges. Des cas d'élévation des transaminases et de douleurs des extrémités et myalgie.

Surdosage :

Des surdosages ont été rapportés avec le Gemfibrozil. Les symptômes comprennent : crampes abdominales, tests anormaux de la fonction du foie, diarrhée, augmentation de la créatine phosphokinase, douleurs des articulations et des muscles, nausée et vomissement.

Le traitement est par des mesures de support symptomatique.

Conditions de conservation :

Conserver entre 15-30°C.

Présentation :

LOW-LIP® 600 comprimés : Chaque comprimé pelliculé contient 600mg de Gemfibrozil, en boîtes de 30 comprimés.

Des boîtes hospitalières sont aussi disponibles.

Ceci est un médicament

- Le médicament est un produit qui agit sur votre santé, et sa consommation non-conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Suivre strictement la prescription de votre médecin, le mode d'emploi et les instructions du pharmacien qui vous a vendu le médicament.
- Le médecin et le pharmacien sont des experts en médicament, ses avantages et ses risques.
- Ne pas interrompre la période du traitement prescrite de votre initiative sans consulter votre médecin.
- Ne pas répéter la même prescription sans consulter votre médecin.
- Garder le médicament hors de la portée des enfants.

**LE CONSEIL DES MINISTRES ARABES DE LA SANTÉ
L'UNION DES PHARMACIENS ARABES**

**The United Pharmaceutical Manufacturing Co. Ltd.
P.O. Box 69 Amman 11591, Jordani**

