

- لأنزور® 15 ملغ، كبسولة مقاومة لعصارة المعدة**
- لأنزور® 30 ملغ، كبسولة مقاومة لعصارة المعدة**
- لانتسوبيرازول
- يرجى قراءة هذه النشرة قبل تناول هذا الدواء.
- امتنع بهذه النشرة قد خاتم إلى إسرافها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسلحة أخرى أو أي شكل، اطلب مريراً من المعلومات من طبيبك أو من الصيدلي.
- * وصف هذا الدواء لك شخصياً لا تعطيه لآخرين حتى ولو في وجود أمراض مماثلة. فإن ذلك قد يؤدي.
- في حال تناول أحد التأثيرات غير المغوبة، إذا لاحظت تأثيراً غير مرغوباً به غير مذكور في هذه النشرة، أخبر طبيبك أو الصيدلي بذلك.
- يرجى قراءة هذه النشرة قبل تناول هذا الدواء.
- امتنع بهذه النشرة قبل تناول على الأقل 30 دقيقة على الأقل.
- للحصول على أفضل النتائج تناول لأنزور قبلوجبة الطعام بـ 30 دقيقة على الأقل.
- الحمل والإرضاع
- إذا كنت حاملاً أو ترضعين طفلك أو هناك احتمال أن تكوني حاملاً، استشيري طبيبك قبلأخذ هذا الدواء.
- القيادة واستخدام الآلات**
- نظير أحاجين لدى البعض الذين يتناولون لأنزور تأثيرات غير مرغوبة مثل العumas والمدار والتشبع وأضطرابات بصيرة، انتبه، إذا واجهتك هذه التأثيرات غير المرغوبة فقد يؤدي ذلك إلى الخفاض فقط لديك. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كان يصلح لك القيام أو أداء الهمام الآخر التي تتطلب تركيزاً عالياً بسبب هذه التأثيرات أو التأثيرات غير المرغوبة فيها، فإن تناولك لهذا الدواء يمكن أن يقلل من قدرتك على القيام بهذه الأمور بسلامة.
- يمكن التطور على وصف هذه التأثيرات في يوم آخر، أقرأ كامل هذه النشرة للحصول على كافة المعلومات. إذا ما زلت عذراً شكوك، استشيري طبيبك أو المرضية أو الصيدلاني معلومات هامة عن بعض مكونات لأنزور.
- سواء ذو تأثير معروف: ساكاروز
- في هذه النشرة:
- ما هو لأنزور وفي أي حالة يستعمل
 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول لأنزور
 - كيف ينفع لأنزور
 - ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة
 - كيف يحافظ لأنزور
 - معلومات إضافية

3. كيف يعطي لأنزور

ينبغي بلع الكبسولة كاملة مع كوب من الماء إذا وجدت صعوبة في ابتلاع الكبسولات يمكن طبريك أن شير علىك بطرق أخرى لتناول الدواء.

لا يتعذر أو يصعب الكبسولات أو محبوباتها لأن ذلك سيفي من خصائصها.

إذا كنت تتناول نفسك في اليوم، حاول أن تتناوله يومياً في نفس الوقت. قد تصل على نتائج أفضل إذا كنت تتناول لأنزور بعد استفاظك في الصباح.

إذا كنت تتناول لأنزور مرتين في اليوم تناول الجرعة الأولى في الصباح والجرعة الثانية في المساء، يعتمد مقدار لأنزور على حالتك المرضية، الجرعات المختلفة للذالجين في لأنزور مرتين.

سوف يصنف لك طبيبك أحياناً جرعة مختلفة ويحدد لك مدة العلاج.

مما هي حرقه المعدة والتشنج المهبلي؟

كبسولة واحدة من 15 ملغ أو 30 ملغ يومياً لمدة أربعة أسابيع، إذا استمرت الأعراض، استشري طبريك، إذا لم تختفي الأعراض خلال 4 أيام، احصل على طبتك.

معالجة الفرجة الشائعة: كبسولة 30 ملغ كل يوم لمدة أسبوعين.

معالجة المعدة المعوية: كبسولة 30 ملغ كل يوم لمدة 4 أسابيع.

معالجة التهاب المريء (الإنزداد المريئي): كبسولة واحدة 15 ملغ كل يوم لمدة 4 أسابيع.

الوقاية طويلة الأمد من الإنزداد المريئي.

طبريك يتبعديل الجرعة إلى 30 ملغ يومياً قد يفوم.

معالجة المعدوي بالبروتوكول المتفق عليه يومياً يومياً.

(Helicobacter pylori):

الجرعة المعتادة هي كبسولة واحدة 30 ملغ مشاركة مع مضاريب جبوبين مختلفين في المساء يتم

تناول العلاج كل يوم عادة لمدة 7 أيام.

المضاريب المفيدة المشاركة الموصى بها هي:

- لأنزور مع كلاروثروميسين 500-250 ملغ وأوكسيسيلين 1000 ملغ.

- لأنزور مع كلاروثروميسين 500 ملغ وفينديبرازول 500-400 ملغ.

إذا كنت تتناول على أجل المعدى في حالة الفرجة فإنه من غير احتمال أن تعود الفرجة إذا

تم التعامل مع العدو بنجاح ليتحقق علاجك الجراحي.

تقدير تماماً بوايد تناول الدواء ولا تنسى أي جرعة.

معالجة الفرجة الشائعة أو الفرجة المعدية لدى المرضى الذين يحتاجون إلى

معالجة مضاريب الاتهاب غير الستيرويدية بشكل مستمر: كبسولة واحدة 30 ملغ كل

يوم لمدة 4 أسابيع.

القابلة على في حالة الفرجة الشائعة أو القرحة المعوية التي يحتاجون إلى

معالجة مضاريب الاتهاب غير الستيرويدية بشكل مستمر: كبسولة واحدة 30 ملغ يومياً قد يفوم.

متلازمة زولينجر إيسون:

للبعد المقارن الأولي الموصى به هو كبسولاتان 30 ملغ في اليوم، ثم وفقاً لمدى استجابتك

لأنزور سوف يقرر طبريك الحاجة لتضييف الجرعة.

يجب استعمال لأنزور عند الأطفال.

تقدير داماً بالفرجة التي وصفها طبريك، في حالة الشك، استشيري طبتك.

إذا تناولت أكثر مما يجب من لأنزور:

إذا تناولت أكثر مما يجب من لأنزور يجب استشارة طبتك على الفور.

إذا تسببت تناول لأنزور:

إذا فاتك تناول جرعة، تناولها فوراً ذلك، لم يكن قد اقرب موعد تناول الجرعة

ال前一天ية، إذا كان هذا هو الحال لا تتناول الجرعة التالية وتتناول الكبسولات الأخرى بشكيل

طبيعي، لا تتناول جرعة معاقة لتعويض الجرعة التي نسيت تناولها.

إذا توقفت عن تناول لأنزور:

في حالة خس الماء لا توقف العلاج قد لا تكون شفيف تماماً والأعراض قد تعود.

في ظاهره مرة أخرى، إذا كان لديك أسلحة أخرى بخصوص استعمال هذا الدواء اطلب المزيد من المعلومات من طبتك.

2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول لأنزور

إذا أخبرك طبتك بعدم تحمل بعض السكريات، احصل به قبل تناول هذا الدواء.

موقع الاستعمال

لا تستعمل أبداً لأنزور في الحالات التالية:

- إذا كانت لديك حساسية (فرط الحساسية) للأنسبرازول أو لأي من مكونات لأنزور.

- إذا كنت تتناول دواء يحتوى على المضاد المضاد للالتهاب غير الستيرويدية المستخدمة في علاج الألم أو الالتهاب.

- إذا كنت تتناول دواء يحتوى على مضاد للالتهاب.

قد يكون طبتك قد وصف لك لأنزور لسبب آخر أو يجرعه مختلفة عن تلك المشار إليها.

في هذه النشرة، اتبع تعليمات طبتك الخاصة بتناول الدواء.

احتياطات خاصة

من حذرا عند استخدام لأنزور:

- إذا كان لديك مرض ورمي وخبيث في الكبد، أخبر طبتك قد خاتم إلى ضبط المقدار.

- قد يطلب منك طبتك أو يكتون قد طلب إجراء حصر إضافي على مضاريب المقوية.

- تشخيص حالتك المرضية وأستعداده قد يزيد من خطر حدوث آثار جانبية.

- في حالة حدوث أدواء خالل المعاقة، احصل على طبتك على الفور.

- إذا كان لديك مرض ورمي، قد يكتون قد طلب طبتك عن أي أمراض غير عادي قد تظهر.

- إن تناول ملحنة البروتوكول مثل لأنزور، وخصوصاً لمدة تتجاوز السنة واحدة قد يزيد

فلياً من خطر الإصابة بكسر الورك أو المفصل أو الفقرات. أخبر طبتك إذا كان لديك

مرض هشاشة العظام أو إذا كنت تتناول الفشريات الستيرويدية (التي قد تزيد من

خطر هشاشة العظام).

ينصح بعدم استعمال هذه الدواء لدى المرضى الذين يعانون من عدم تحمل الفركتوز أو من

متلازمة سوء امتصاص الغلوكوز أو الغلاكتوز أو من نقص في إنزيم السوكراز إيزومالات.

(أمراض وراثية نادرة).

تناول أو استعمال أدوية أخرى:

- إذا كنت تتناول أو تتناول موخرة، وواة آخر، بما في ذلك دواء حصلت عليه من دون وصفة

طبية، أخبر طبتك أو الصيدلي بذلك.

على وجه الخصوص، أخبر طبتك إذا كنت تتناول أدوية خلوى على واحد أو أكثر من المواد

٤. ما هي التأثيرات غير المرغوبة المختلطة

مثل كآفة الأدوية يمكن أن يسبب استعمال لانزور تأثيرات غير مرغوبة، مع أنه ليس من الضرورة تغريم الجميع لذلك.

◀ التأثيرات غير المرغوبة الناتجة شائعة (حدث عند أكثر من مريض واحد من 100):

- الصداع النعاس.

- الإسهال الأيساك (ألم المعدة الغليان الانفاس الججناطي أو ألم القم / المخل).

- التهاب المجرى الهضمي الشامل الحادة.

- شفود في نتاج اخبارات وظائف الكبد.

- التقيّب.

◀ التأثيرات غير المرغوبة الناتجة قليلة الشبيع (حدث عند أقل من مريض واحد من 100):

- الاكتئاب.

- الألم العضلي أو المفصلي.

- اختيارات السؤال أو الوفاة (إيجاب).

- شدودات في صفيحة الدم.

◀ التأثيرات غير المرغوبة الناتجة نادرة (حدث عند أقل من مريض واحد من 1000):

- الحمى.

- الهاياج النعاس، التخليل، الهلوسة، الأرق، الاضطرابات البصرية، الدوار.

- تغير المذاق، فقدان الشهية، التهاب اللسان.

- التهابات المثانة مثل المفران أو الورخ، الكلمات، الاحمرار أو التعرق المفرط.

- الحساسية المفرطة (تفاعل جلدي شديد عند التعرض لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية).

- تساقط الشعر.

- التهاب المقدى، الرعشة.

- فقر الدم (شحوم).

- اضطرابات كلوية.

- التهاب البنكرياس.

- التهاب الكبد المزمن.

- تونم، التهاب البنكرياس، التهاب المثانة، التهاب المعدة.

- داء المبيضات (اخم في الجلد أو الأغشية المخاطية تاجم عن الفطريات).

- وذمة وعائية، افضل طبیبک على الموزا كان لديك اعراض وذمة وعائية مثل تونم في الوجه أو المسان أو البعوض، معروفة في البالغ شبه شبيه أو صعوبة في التنفس.

◀ التأثيرات غير المرغوبة الناتجة نادرة جداً (حدث عند أقل من 10000):

- فرط الحساسية الشديد بما في ذلك حالة الصدمة، قد تختفي اعراض فرط

الحساسية المفرطة التي تحدث في المجرى الهضمي الشامل الونمة وأحياناً تنتهي بالضغط

- التهاب الفم.

- التهاب القولون (التهاب الأمعاء).

- التغيرات في مستويات الصوديوم والكوليستيرول وتلاثي الغليسيريد في الدم.

- تفاعلات جلدية وحادة مع أحصار، تساقط، التهاب شديد، فتقشر.

- نادرًا ما قد يسبب لانزور انخفاضاً في عدد خلايا الدم البيضاء التي يمكن أن تضعف

القاومية للعدوى إذا ظهرت لديك عدو مع اعراض مثل المرض وذهور خطير في

الحالة، أو حمى مع اعراض عدو موضعية مثل التهاب المثلثة، البلعوم، الفم، أو

اضطرابات بولية، استنشق طبیبک فوراً سينتم إجراء فحص للدم للتحقق من نقص

محتمل لتعداد خلايا الدم البيضاء (ندرة اهبيتس).

◀ التأثيرات غير المرغوبة الناتجة وبردة دعوتها غير معروفة:

إذا كنت تتناول لانزور لأكثر من 3 أشهر، فمن الممكن أن يكون معدل الغيفنيسيوم

في الدم قد انخفض لديك. النقص في مستويات الغيفنيسيوم قد يتراوح على

شكل تعب، أو اضطرابات خاصة غير إرادية، توهان، احتلاج، احسان بالدور، سرقة

في ضربات القلب، إذا كنت تشعر بأي من هذه الأعراض عليك بإبلاغ طبیبک على

الهاتف الشخصي في مستويات الغيفنيسيوم قد تؤدي أيضًا إلى انخفاض في مستويات

الموناسيوم أو الكالسيوم في الدم.

قد يفرط طبیبک إجراء فحوصات مد منتظمة لراقبة مستوى الغيفنيسيوم لديك.

الإبلاغ عن التأثيرات غير المرغوبة

إذا شعرت بأي تأثير غير معروف فيه مذكور أو غير مذكور في هذه النشرة أخبر

طبیبک أو الصيدلاني أو أي مهني طبي آخر بمرضه... بذلك بإبلاغك عن التأثيرات غير

المرغوبة تساهم في التعريف على جميع من العلوم حول سلامة المستحضر.

5. كيف يحافظ لانزور

يحفظ بعيداً عن مجال نظر الأطفال وعن متناول أيديهم.

يجب عدم استخدام لانزور بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على الشريط أو

العلبة. تارikh انتهاء الصلاحية يشير إلى اليوم الأخير من الشهر المذكور.

يُحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية.

احتفظ العلبة ممدكة بالإيثانول بعيداً عن الرطوبة. احفظ الأشرطة المشكّلة حراريًا

داخل العبوة الخارجية بعيداً عن الرطوبة.

لا ينبعي التخلص من الأدوية عن طريق مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية.

اسأل الصيدلاني عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد مراجحة إليها

وسوف تساعد هذه التدابير على حماية البيئة.

6. معلومات إضافية

على ماذا يحتوي لانزور 15 ملг. كبسولات مقاومة لعصارة المعدة

المادة الفعالة هي:

لانزور باول.

لكل كبسولة مقاومة لعصارة المعدة.

المكونات الأخرى هي:

كريونات الغيفنيسيوم التثليل، حبيبات دقيقة متعادلة (سكاروز، نشا الدرة)، سكاروز

ان هذا الدواء

مستحضر يوثر على صحتك و استهلاكه خلافاً
للتوصيات يعرضك للخطر.

اتبع بدقة وصفة الطبيب و طريقة الاستعمال
المتضمن عليها و تعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.
• الطبيب و الصيدلي هما الخبريان في الدواء و في نفعه
و ضرره.

لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.

لا تترك الأدوية في متناول الأطفال.
مجلس وزراء الصحة العرب

THIS MEDICAMENT

is a product, which affects your health, and its consumption
contrary to instructions is dangerous for you.

Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and
the instructions of the pharmacist who sold the medicament.

• The doctor and the pharmacist are the experts in medicines,
their benefits and risks.

• Do not by yourself interrupt the period of treatment
prescribed.

• Do not repeat the same prescription without consulting your
doctor.

• Keep all medicaments out of reach of children.

Council of Arab Health Ministers,
Union of Arab Pharmacists.