

بيزوكور[®] بلاس

بيزوبرولول فومات / هيدروكلوروثيازيد

الاشكال و العيوبات

بيزوكور ٥ بلاس: أقراص ملبسة بالفيلم: ٣٠ قرص في العبوة.

بيزوكور ١٠ بلاس: أقراص ملبسة بالفيلم: ٣٠ قرص في العبوة.

التكوين

بيزوكور ٥ بلاس: يحتوي كل قرص ملبس بالفيلم على ٥ ملغ من العامل الفعال بيزوبرولول فوماتر بالإضافة إلى ١٢,٥ ملغ من العامل الفعال هيدروكلوروثيازيد.

المواد غير الفعالة: لاكتوز، ميكروكريستالين سيلولوز، ديكالسيوم فوسفات ، كروسوفيدون، ثنائي أكسيد السيليكون الغرواني، ماغنيزيوم ستيارات، بولي فينيل الكحول، بولي إيثيلين غليكول، FD&C الأصفر، تلك، ثاني أكسيد التيتانيوم، أكسيد الحديد الأصفر.

بيزوكور ١٠ بلاس: يحتوي كل قرص ملبس بالفيلم على ١٠ ملغ من العامل الفعال بيزوبرولول فوماتر بالإضافة إلى ٢٥ ملغ من العامل الفعال هيدروكلوروثيازيد.

المواد غير الفعالة: لاكتوز، ميكروكريستالين سيلولوز، ديكالسيوم فوسفات ، كروسوفيدون، ثنائي أكسيد السيليكون الغرواني، ماغنيزيوم ستيارات، هيبروميلوز، بولي إيثيلين غليكول ، تلك، ثاني أكسيد التيتانيوم، أكسيد الحديد الأسود، أكسيد الحديد الأحمر.

لما يجب تناول بيزوكور بلاس؟

الفئة العلاجية : عوامل احصار الببتا.

الرمز الكيميائي العلاجي التشريحي (ATC): C07BB07.

إن بيزوكور بلاس يوصف للتحكم بارتفاع ضغط الدم. فهو مزيج من بيزوبرولول فوماتر، محصر بيتا، مع هيدروكلوروثيازيد، مدر للبول من مجموعة الثيازيد. إن محصرات بيتا تعمل على تخفيض قوة انقباضات القلب ومعدلها، مما يؤدي إلى تخفيض ضغط الدم. إن مدرات البول تساعد الجسم على إنتاج وإزالة المزيد من البول، مما يساهم أيضًا في تخفيض ضغط الدم.

ما هي المعلومات الضرورية حول بيزوكور بلاس؟

يساعد بيزوكور بلاس على التحكم بضغط الدم المرتفع. مثل غيره من الأدوية المخفضة لضغط الدم، هو ليس علاجًا لارتفاع ضغط الدم الأولي. إن التوقف فجأة عن تناول بيزوكور بلاس قد يسبب مشاكل في القلب، لذلك عليك الالتزام بإرشادات طبيبك وعدم التوقف عن تناول الدواء حتى ولو شعرت بأنك في حالة صحية جيدة. هذا الأمر مهم للغاية خاصة إذا كنت مصابًا بمرض في شرايين القلب التاجية.

ما هي الجرعات الموصى بها من بيزوكور بلاس؟

للبالغين

تبلغ الجرعة اليومية المعتادة في بداية العلاج ٥ ملغ من بيزوبرولول مع ١٢,٥ ملغ من الهيدروكلوروثيازيد. يمكن زيادة الجرعة اليومية إلى ١٠ ملغ من بيزوبرولول مع ٢٥ ملغ من الهيدروكلوروثيازيد في حال عدم السيطرة على معدل ضغط الدم.

إن الجرعة اليومية المعتادة في بداية العلاج قد تكون أقل بكثير لدى المرضى المصابين بالربو أو الذين يعانون من مشاكل في الشعب الهوائية أو من أمراض كلوية أو كبدية.

للأولاد

لم تكرر دراسات وافية حول إستعمال بيزوبرولول فوماتر بالإضافة إلى الهيدروكلوروثيازيد عند الأولاد. **كيف يتم تناول بيزوكور بلاس؟**

تناول بيزوكور بلاس ملتزمًا بإرشادات طبيبك، دون تقويت أي من الجرعات، حتى عند إختفاء العوارض.

ما العمل عند تقويت موعد إحدى الجرعات؟

تناول الجرعة التي فوّتها حالما تترك أنك نسيتها. في حال تذكرت ذلك في وقت قريب من موعد الجرعة

التالية، أهمل الجرعة التي فوّتها وإستأنف برنامج العلاج المعتاد. لا تتناول جرعتين في الوقت نفسه.

ما العمل عند تناول جرعة مفرطة؟

إن تناول جرعة مفرطة من أي دواء ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. في حال شككت بأنك تناولت جرعة مفرطة، إستشر طبيبك فوراً.

قد تشمل الأعراض الناتجة عن تناول جرعة مفرطة من بيزوكور بلاس ما يلي:

فشل القلب الإحتقاني (الذي يتجلى في الشعور بالتعب، ضيق في التنفس، زيادة الوزن المفاجئة كما يتجلى في ظهور وذمات في الأطراف السفلى، ومن ضمنها الساقان، والقدمان، والكاحلان)، الشعور بصعوبة في التنفس، تندي أو إزدباد معدل دقات القلب، إنخفاض في ضغط الدم، إنخفاض في مستوى السكر في الدم، تندي أو إزدباد التبول، خسارة السوائل أو المنحل الكهربائي، آحاسيس جلدية غير طبيعية، تشنجات في العضل الربلي، إرتباك، دوخة، حمول، إختلال الوعي، ضعف، غثيان، صدمة، عطش، تقبؤ.

في حالة الجرعات المفرطة الكبيرة، هذا من شأنه التأثير على التنفس أو التسبب بهذيان، تشنجات، أو غيبوبة.

هل من تداخل بين بيزوكور بلاس وأي طعام أو دواء؟

يمكن تناول بيزوكور بلاس مع معظم الأدوية؛ لكن يجب أن تستشير طبيبك قبل تناول بيزوكور بلاس بالتزامن مع أي من الأدوية التالية:

أدوية الضغط من ضمنها محصرات الكالسيوم (مثل ديلتيازام، وديزوبراميد، وفرايامل)، وكولندين، وديزوبراميد وغيرها من الأدوية المماثلة التي تعالج مشكلة عدم إنتظام دقات القلب، وإيبينيفرين، ونورإيبينيفرين، وريفامبين، وغوانيثيدين، وريسبيرين، والأدوية القوية المضادة للسكري، وأنسولين، ومضادات الإلتهابات غير الستيرويدية (مثل حمض الأسيتيل ساليسيليك، وإيبوبروفين، وأسيتامينوفين)، والمسكنات (مثل كودين ومورفين)، والأدوية الستيرويدية (مثل بريدنيزون)، ومرخبات العضلات (مثل توبوكورارين)، وليثيوم، والمهدئات الباربيتورية (مثل سيكوبرابيتال وبنتبوباريتال)، والأدوية المخفضة للكوليستيرول (مثل كوليستيول وكوليستيرامين)، والكحول.

ما هي التأثيرات الجانبية لبيزوكور بلاس؟

قد تتضمن التأثيرات الجانبية الأكثر شيوعاً ما يلي:الدوخة والتعب.

آثار جانبية غير معروفة: سرطان الجلد والشفة (سرطان الجلد غير الميلانيني)

أبلغ طبيبك حول أية عوارض أخرى غريبة.

الإحتياطات الواجب إتخاذها عند تناول بيزوكور بلاس

إذا كنت قد أصبت بسرطان الجلد أو إذا كنت تعاني من آفة جلدية غير متوقعة أثناء العلاج. قد يؤدي العلاج باستخدام هيدروكلوروثيازيد، وخاصة على المدى الطويل مع الجرعات العالية ، إلى زيادة خطر الإصابة ببعض أنواع سرطان الجلد والشفة (سرطان الجلد غير الميلانيني). احمي بشرتك من التعرض لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية أثناء تناول بيزوكور بلاس.

يجب عدم توقيف العلاج بدواء بيزوكور بلاس فجأة إلا إذا أوصى الطبيب بذلك.

إذا كان عليك توقيف العلاج بدواء بيزوكور بلاس، سيقوم طبيبك بتخفيض الجرعة تدريجياً وذلك خلال فترة أسبوعين.

يجب توخي الحذر عند إستعمال بيزوكور بلاس لدى المرضى المصابين بالربو أو الذين يعانون مشاكل في القصبات الهوائية، والمصابين بأمراض في الكلى والكبد، وبأمراض في شرايين القلب التاجية، وبأمراض في الأوعية الدموية المحيطية.

إستشر طبيبك في حال سبق لك أن تعرضت لفشل القلب الإحتقاني أو تعرضت لأية مشاكل في التنفس أو في حال صارت دقات قلبك بطئنة في خلال خضوعك لعلاج بدواء بيزوكور بلاس.

من المحتمل أن يحجب بيزوكور بلاس أعراض إنخفاض مستويات السكر في الدم، أو قد يؤثر على مستويات السكر في الدم، كما من المحتمل أن يحجب الأعراض الناتجة عن إرتفاع نشاط الغدة الدرقية. من المحتمل أن يؤثر بيزوكور بلاس على الإستجابة لمدة إيبينيفرين عند المرضى الذين سبق لهم أن تعرضوا لمشاكل حساسية حادة تتطلب علاجاً بمادة إيبينيفرين.

من المحتمل أن يخفض بيزوكور بلاس مستويات التيقظ أو أن يسبب الدوخة، لذلك يجب الإمتناع عن قيادة المحركات أو عن المشاركة في نشاطات خطيرة لحين تتأكد من كيفية إستجابة جسمك للدواء.

يجب إعلام طبيبك بالمعالج أو طبيب الأسنان بأنك تتناول بيزوكور بلاس قبل الخضوع لأي عملية في الأسنان أو أي عملية جراحية أو في حالات الطوارئ.

في حال حصول الذئبة الحمامية الشاملة، بيزوكور بلاس قد يضاعف العوارض.

عند قلّة من المرضى، بيزوبرولول فوماتر بالإضافة إلى الهيدروكلوروثيازيد قد سبّب إرتفاع في معدلات الكالسيوم والفوسفات في الدم وذلك بسبب التداخل مع وظيفة الغدة الدرقية. في بعض الحالات النادرة، هناك ظهور للقرص.

هناك إحتمال ضئيل في أن يسبب بيزوكور بلاس إنخفاض في معدلات بعض المنحل الكهربائي في الدم مثل البوتاسيوم والمغنيزيوم.

أبلغ طبيبك في حال أصابتك أي من العوارض التالية: عطش مفرط، جفاف الفم، مشاكل معدية معوية مثل الغثيان والتقيؤ، الحمول، الأرق، الضعف أو التعب العضلي، آلام أو تشنجات عضلية، إنخفاض في ضغط الدم، تسرع دقات القلب، أو إنخفاض غير عادي في التبول.

ما هي الحالات التي يجب الإمتناع فيها عن تناول بيزوكور بلاس؟

اعلم طبيبك في حال كنت تعاني ربواً أو الشعب الهوائية، إنخفاضاً في مستويات الدم الذي يروي الدورة الدموية أو أية مشاكل قلبية مثل فشل القلب الإحتقاني، وتباطؤ دقات القلب أو عدم إنتظامها، أو صعوبة في التبول.

لا تستعمل بيزوكور بلاس إذا كنت تعاني من تفاعلات حساسية ضد الدواء أو على بعض المضادات الحيوية المسماة سلفوناميد مثل سلفاميثوكسازول.

ما العمل في حالات الحمل والرضاعة؟

نظراً إلى غياب أي دراسة وافية حول إستعمال بيزوبرولول فوماتر بالإضافة إلى الهيدروكلوروثيازيد خلال فترة الحمل، عليك بالتالي إعلام طبيبك في حال كنت حاملاً أو تخططين للحمل، إذا كنت تخضعين لعلاج بدواء بيزوكور بلاس.

كما لم يتمّ التحقق من أن بيزوكور بلاس يُفرّز في حليب الأم، وبالتالي على طبيبك أن يطلعك على التدابير الواجب إتخاذها إذا كنت ترضعين طفلك خلال فترة العلاج بدواء بيزوكور بلاس. في حال كان هذا الدواء ضرورياً لضمان سلامة صحتك، قد ينصحك طبيبك بتوقيف الرضاعة لحين ينتهي العلاج بدواء بيزوكور بلاس.

كيف يُحفظ بيزوكور بلاس؟

يُحفظ بيزوكور بلاس في مكان لا تتعدى الحرارة فيه ٣٠ درجة مئوية.

يجب حفظه في العبوة الأصلية بحالة سليمة.

تاريخ مراجعة النشرة: تشرين الثاني ٢٠١٨.

هذا دواء:

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك، وإستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع وصفة الطبيب بدقة، وإرشادات الإستعمال، وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.

- إن الطبيب والصيدلاني هما الخبيران في الأدوية، فوائدها ومخاطرها.

- لا تقطع فترة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.

- لا تكرر نفس الوصفة دون إستشارة طبيبك.

- إحفظ الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال.

نبتا ش.م.ل.

ضوييه - لبنان

مؤتمر وزراء الصحة العرب

وفاق الصليبة العرب

