

Sectral® 200mg

acébutolol

Comprimé pelliculé

sanofi aventis

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que SECTRAL 200 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SECTRAL 200 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre SECTRAL 200 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver SECTRAL 200 mg, comprimé pelliculé ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE SECTRAL 200 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : BÉTA-BLOQUANT, SÉLECTIF.

Ce médicament est un bêta-bloquant. Il diminue certains effets (dits effets bêta) du système sympathique de la régulation cardiovasculaire.

Ce médicament est préconisé dans :

- l'hypertension artérielle,
- certains troubles du rythme cardiaque,
- la prévention des crises douloureuses de l'angine de poitrine d'effort,
- le traitement au long cours après infarctus du myocarde.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SECTRAL 200 mg, comprimé pelliculé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais SECTRAL 200 mg, comprimé pelliculé dans les cas suivants :

- asthme et bronchopneumopathies chroniques obstructives, dans leurs formes sévères (*formes sévères d'asthme et maladie des bronches et des poumons avec encombrement*),
- insuffisance cardiaque non contrôlée par le traitement (*défaillance des fonctions du cœur non contrôlées par le traitement*),
- choc cardiogénique (*choc d'origine cardiaque*),
- blocs auriculo-ventriculaires des second et troisième degrés non appareillés (*certaines troubles de la conduction cardiaque*),
- angor de Prinzmetal (dans les formes pures et en monothérapie) (*variété de crises d'angine de poitrine*),
- maladie du sinus (y compris bloc sino-auriculaire),
- bradycardie importante (< 45-50 battements par minute) (*ralentissement du rythme cardiaque*),
- phénomène de Raynaud et troubles artériels périphériques, dans leurs formes sévères (*troubles circulatoires symétriques des doigts avec engourdissements et troubles artériels périphériques dans leurs formes sévères*),
- phéochromocytome non traité (*croissance de la glande médullosurrénale sécrétant des substances provoquant une hypertension artérielle sévère*),

- hypotension (*diminution de la pression artérielle*),
- hypersensibilité à l'acébutolol,
- antécédent de réaction anaphylactique (*antécédent de réaction allergique*),
- allaitement,
- association à la floctafénine (*médicament de la douleur*),
- si vous êtes allergique (hypersensible) au blé, en raison de la présence d'amidon de blé.

Vous ne devez pas prendre ce médicament, en général, avec le bépridil, le diltiazem et le vérapamil (médicaments pour le cœur).

Faites attention avec SECTRAL 200 mg, comprimé pelliculé :

Mises en garde spéciales

Ce médicament contient du lactose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose.

NE JAMAIS INTERROMPRE BRUTALEMENT LE TRAITEMENT SANS AVIS DE VOTRE MÉDECIN.

NE PAS LAISSER À LA PORTÉE DES ENFANTS.

Précautions d'emploi

Prévenir le médecin en cas de grossesse, diabète, insuffisance rénale ou hépatique, psoriasis, antécédents allergiques, certaines maladies des artères (syndrome de Raynaud).

Si vous devez subir une intervention chirurgicale, avertissez l'anesthésiste que vous prenez ce médicament.

Ce médicament peut être administré en cas de maladie cœliaque. L'amidon de blé peut contenir du gluten, mais seulement à l'état de trace, et est donc considéré comme sans danger pour les patients atteints de maladie cœliaque.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, notamment du bépridil, du diltiazem ou du vérapamil, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Grossesse

En cas de besoin, ce médicament peut être pris durant votre grossesse.

Si ce traitement est pris en fin de grossesse, une surveillance médicale du nouveau-né est nécessaire pendant quelques jours, dans la mesure où certains effets du traitement se manifestent aussi chez l'enfant.

Allaitement

Ce médicament passe fortement dans le lait maternel. L'allaitement est donc contre-indiqué en cas de traitement par ce médicament.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

L'attention des sportifs est attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.

Informations importantes concernant certains composants de SECTRAL 200 mg, comprimé pelliculé

Liste des excipients à effet notoire : lactose, amidon de blé (gluten).

3. COMMENT PRENDRE SECTRAL 200 mg, comprimé pelliculé ?

Posologie

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin.

En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

La posologie est variable en fonction de l'affection traitée ; elle est aussi adaptée à chaque patient.

Mode d'administration

Voie orale.

Les comprimés doivent être avalés avec une boisson sans les croquer.

Fréquence d'administration

Dans tous les cas, se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

Durée du traitement

Dans la majorité des affections, le traitement par un bêta-bloquant est prolongé de quelques mois ou années. C'est votre médecin qui vous précisera la durée du traitement.

Si vous avez pris plus de SECTRAL 200 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

Prévenir votre médecin ou l'hôpital.

Si vous oubliez de prendre SECTRAL 200 mg, comprimé pelliculé :

En cas d'oubli, prendre dès que possible votre comprimé et poursuivre votre traitement normalement. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, SECTRAL 200 mg, comprimé pelliculé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet :

- les plus fréquemment rapportés sont : fatigue, refroidissement des extrémités, ralentissement du pouls, troubles gastro-intestinaux, impuissance,
- beaucoup plus rarement : ralentissement important du cœur, insuffisance cardiaque, chute de la tension, gêne respiratoire, hypoglycémie (*quantité insuffisante de sucre dans le sang*), syndrome de Raynaud, aggravation d'une claudication (*difficulté à marcher*) intermittente existante, diverses manifestations cutanées, notamment des éruptions ressemblant au psoriasis ou exacerbation d'un psoriasis,
- exceptionnellement, pneumopathies d'origine immunoallergique (*maladie des poumons*), manifestations immunologiques (apparition d'anticorps antinucléaires) pouvant aboutir à un lupus.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER SECTRAL 200 mg, comprimé pelliculé ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser SECTRAL 200 mg, comprimé pelliculé après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient SECTRAL 200 mg, comprimé pelliculé ?

La substance active est :

chlorhydrate d'acébutolol.....221,70 mg

soit quantité correspondant à acébutolol.....200,00 mg

pour un comprimé pelliculé.

Les autres composants sont :

lactose, amidon de blé, talc, silice colloïdale anhydre, povidone, stéarate de magnésium, hypromellose, macrogol 20 000.

Qu'est-ce que SECTRAL 200 mg, comprimé pelliculé et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimés pelliculés. Boîte de 30.

Titulaire et exploitant

sanofi-aventis France

1-13, boulevard Romain Rolland

75014 Paris – France

Fabricant

FAMAR LYON

29 avenue Charles de Gaulle

69230 Saint Genis Laval - France

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : avril 2009