

داونيل 5 ملغ

قرص قابل للقطع

غليبينكلاميد

sanofi aventis

تعريف بالمنتج الدوائي

التسمية

غليبينكلاميد..... 5 ملغ للقرص الواحد القابل للقطع.

الأسوة: لاكتوز أحادي التيمية، نشا الذرة، نشا الأرز المسقى بالهلمنة، طلق، سيليكاً غروانية غير مميّهة، ستيرات المغنيزيوم.

الشكل الصيدلاني

قرص قابل للقطع، علبه من 30 قرصاً أو 100 أقراص.

الفئة الإستدوائية

السُّفونيلوريا- مضاد فموي للسكري. (السبيل المعدي المعوي وعملية الإيض)

متى يجب تناول هذا الدواء

يوصف هذا الدواء للمصابين بمرض السكري غير المرتبط بالإنسولين، عند فشل النظام الغذائي.

انتبه!

متى لا يجب تناول هذا الدواء

لا يجب تناول هذا الدواء في الحالات التالية:

- تحصُّس تجاه الغليبينكلاميد،

- مرض السكري الذي يتطلب علاج بالإنسولين،

- حماض كيتوني مرتبط بالسكري، سكري سابق للسبيل،

- مرض كلوي أو كبدِي حاد،

- العلاج بالميكوثازول (راجع فقرة "تفاعلات مع أدوية أخرى وتفاعلات أخرى)،

- برفيرية؛ تصمُّغ الصباغ (فرولين) في الجسم،

- الإرضاع.

لا ينصح بتناول هذا الدواء بشكل متزامن مع الفينيليتولزون أو الدانازول، الا في حال سمح الطبيب بذلك.

في حال الشك، يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي.

تحذيرات خاصة

تدني سكر الدم (مستويات منخفضة من السكر في الدم):

قد تعاني، خلال العلاج، من تدني سكر الدم. في حال حصول ذلك، قد يكون دخول المستشفى ضرورياً لتصحیح مستوى السكر.

بعد حصول تدني سكر الدم، سيشرق الطبيب عن كتب على حالتك لما لا يقل عن 24 ساعة.

المعلومات التالية ضرورية لتجنُّب حالات تدني سكر الدم:

- عليك أن تتناول الوجبات، بما في ذلك الفطور، بشكل منتظم. إن خطر حصول تدني سكر الدم يرتفع عند تقویت إحدی الوجبات أو عندما يتميِّز نظامك الغذائي بمستويات غير كافية أو غير متوازنة من السكر؛

- إن العمر، القصور الكلوي أو الكبدِي، أو بعض الاضطرابات الأدرنالية أو النخامية كلها عناصر من شأنها التسبب بحدوث تدني سكر الدم.

- إن حصول تدني سكر الدم يتعرَّض بالحماية الغذائية جدًّا الصارمة أو غير المتوازنة توارثاً كاتباً، بالجهد الجسدي المُنهي أو الممتد على فترة طويلة، باحتساء المحلول أو مع تناول أدوية أخرى لمعالجة تدني سكر الدم (راجع فقرة "تفاعلات مع أدوية أخرى وتفاعلات أخرى).

عدم التوازن على مستوى السكر:

في حال العملية الجراحية، الرضخ، الحمى أو الإلتهاب، قد يوقف الطبيب هذا العلاج ويصف لك الإنسولين.

الفحوصات البيولوجية:

يجب الإشراف بشكل منتظم على مستويات السكر في الدم والبول.

محاذير للاستعمال

يسرّح طبيبك لك ولعائلتك طرق تجنب تدني سكر الدم، التعرف على عوارضه المنبهة الأولى، وأيضاً طرق معالجة هذه العوارض. كما يسرّح لك طبيبك الظروف التي تجعلك مقاوماً للعلاج بالغليبينكلاميد في مثل هذه الحالة، يمكنه أن يصف لك أدوية أخرى بديلة. في حال الشك، لا تتردّد في مراجعة الطبيب أو الصيدلي.

تفاعلات مع أدوية أخرى وتفاعلات أخرى

لنفاذی التفاعلات الممكن حصولها مع منتجات دوائية أخرى، يجب أن تعلم طبيبك أو الصيدلي على الدوام بأي علاج آخر تتناولوه، ولا سيما:

1- المنتجات الدوائية التي قد تتسبب بتدني سكر الدم: ميكوثازول، فينيليتولزون، حاصرات بيتا، فلوكونازول، مشطبات الأزييم محوّل الألدیوستين، الكحول.

2- الأدوية التي قد تتسبب بفرط سكر الدم من خلال خفض فعالية مضاد السكري: دانازول، كلوربرومازين، ستيرويدات قشرية سكرية، بروجيستوجين، سابونامول، تيربوتال، ريتودرين.

الحمل- الإرضاع

عندی الحمل، يكون علاج السكري قائماً دائماً على الإنسولين. في حال اكتشفت أنك حامل خلال العلاج بهذا الدواء، يجب التوقف عن تناوله. أخبري طبيبك بالأم، فبعد علاج سكر الدم بما يتلّام مع حالتك.

لا يجب تناول هذا الدواء خلال فترة الإرضاع.

قيادة السيارة وتولي الآلات

يجب أن يتنبه سائق السيارة إلى العوارض التي تشير إلى تدني سكر الدم وإلى أثرها على قدرته على القيادة.

لائحة الأدوية التي يجب معرفتها لضمان تناول السليم لهذا الدواء عند بعض المرضى:

لاكتوز

كيفية استخدام هذا المنتج الدوائي

تحديد الجرعة

الجرعة العادية هي نصف قرص إلى 3 أقراص في اليوم.

طريقة وسبيل اعطاء الدواء

عبر الفم. يجب بلع القرص مع نصف كوب من الماء، قبل الوجبة مباشرةً.

في حال فرط الجرعة

اتصل بالطبيب مباشرة في شئ الحالات.

في حال شعرت بعوارض خفيفة لتدني سكر الدم: ضعف، غثقة، رغبة ملهنة بتناول الطعام، رجفان لا إرادي، وسن، دوار، ألم في الرأس أو اضطرابات في النظر، تناول مأكولات أو مشروبات تحتوي على السكر.

في حال تقویت جرعة أو أكثر

تناول قرصاً مع الوجبة التالية.

لا تأخذ جرعة مزدوجة.

عوارض جانبية مزعجة وغير مرغوب فيها

شأنه أن ي مادة فاعلة، قد تتسبب هذا الدواء لدى بعض المرضى بعوارض جانبية مزعجة بدرجات متفاوتة:

- تدني سكر الدم (انخفاض مستويات السكر في الدم، راجع فقرة تحذيرات وفرط الجرعة).

- عوارض جلدية: شرى، حكة، طفح جلدي.

- اضطرابات معدية معوية: غثان، إسهال، انزعاج معدي، برقان، كاد.

- برفيرية؛ تصمُّغ الصباغ (فرولين) في الجسد.

- نتائج غير طبيعية في الفحوصات البيولوجية المتعلقة بالكبد والكلتين والدم.

لا تتردّد في مراجعة الطبيب أو الصيدلي للتقرير عن أي أعراض مزعج غير مرغوب فيه لم يذكر في هذه النشرة.

التخزين

لا تتجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على الغلاف الخارجي.

تعليمات خاصة بالتخزين

لا تحترقه ضمن حرارة تزيد عن 25 درجة مئوية.

تاريخ مراجعة النشرة

تشرين الثاني 2009.

موضب في

بشّا بنّا م.م.ل.، ضبيه – لبنان

بشّر خيصى من

سانوفي أنتنس - فرنسا

هذا دواء:

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك، وإستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع وصفة الطبيب بدقة، وإرشادات الإستعمال، وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.

- إن الطبيب والصيدلاني هما الخبيران في الأدوية، فونها وما مخاطرها.

- لا تقطع فترة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.

- لا تكرر نفس الوصفة دون إستشارة طبيبك.

- إحتفظ بالأدوية بعيداً عن متناول الأطفال.

مركز وزارة
الصحة العرب
ولدى الصيدلة العرب