

DI-ANTALVIC ADULTES

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Chlorhydrate de dextropropoxyphène 30 mg
Paracétamol 400 mg
Excipient : stéarate de magnésium
pour une gélule
Enveloppe de la gélule : gélatine, oxyde de titane, indigotine, oxyde de fer jaune, anhydride sulfureux.

PRESENTATION

Boîte de 20 gélules sous plaques thermoformées.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Antalgiques périphériques/opioides.
(N : système nerveux central).

NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT

Laboratoires HOUDE
1 Terrasse Ilini
92010 Paris La Défense Cedex
Tél : 01 40 81 42 00

NOM ET ADRESSE DU FABRICANT

USIPHAR - F. 60200 Compiègne

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT (INDICATIONS THERAPEUTIQUES)

Ce médicament est une association de deux principes actifs.
C'est un antalgique (il calme la douleur).
Ce médicament est préconisé dans les douleurs modérées ou fortes qui ne sont pas soulagées par l'aspirine ou le paracétamol seul.

ATTENTION !

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants

- Enfants de moins de 15 ans.
- Allergies connues au paracétamol et/ou au dextropropoxyphène.
- Maladies graves du foie ou des reins.
- Allaitement (ou grossesse et allaitement).

Ce médicament ne doit généralement pas être utilisé, sauf avis contraire de votre médecin, en cas de traitement par la carbamazépine (médicament utilisé dans l'épilepsie).

~~EN CAS D'OUTRE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.~~

MISES EN GARDE SPECIALES

Éviter la prise d'alcool.

L'usage prolongé de fortes doses peut conduire à l'état de dépendance.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas dépasser les posologies indiquées.

Ne pas prendre ce médicament sans l'avis de votre médecin, en cas de traitement par antidépresseur ou tranquillisants.

~~EN CAS D'OUTRE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.~~

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

~~AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS.~~

En particulier, les traitements contre l'épilepsie contenant de la carbamazépine.

Ce médicament contient du paracétamol, d'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (3g).

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Votre médecin peut être amené, si nécessaire, à vous prescrire ce médicament au cours de votre grossesse. Dans tous les cas, il convient de respecter les doses et la durée d'administration qui vous ont été prescrites.

Ce médicament passe dans le lait maternel.

Lorsqu'il est administré chez la femme qui allaite, il peut entraîner des pauses respiratoires ou des baisses du tonus du nourrisson. Par conséquent, en cas d'allaitement, la prise de ce médicament est contre-indiquée.

CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES

La prise de ce médicament peut entraîner des vertiges et une somnolence.

SPORTIFS

Attention : cette spécialité contient un principe actif pouvant entraîner une réaction positive des tests pratiqués lors de contrôles antidopages.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

POSOLOGIE

Réservé à l'adulte à partir de 15 ans.

Suivre les recommandations de votre médecin.

4 gélules par jour, en moyenne, régulièrement réparties. Les gélules doivent être avalées avec un grand verre d'eau, et de préférence avec une collation.

Ne pas dépasser 6 gélules par jour.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale.

FREQUENCE ET MOMENT AUQUEL LE MEDICAMENT DOIT ETRE ADMINISTRE

Les prises doivent être espacées de 6 heures (4 heures au minimum) et les gélules doivent être prises au moment des repas ou lors d'une collation...

En cas d'insuffisance rénale, les prises seront espacées de 8 heures.

DUREE DU TRAITEMENT

Ne pas utiliser de façon prolongée.

~~DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.~~

CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE

En cas de surdosage ou d'intoxication accidentelle, prévenir un médecin.

RISQUE DE SYNDROME DE SEVRAGE

Risque de dépendance, en cas d'usage prolongé et à fortes doses.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

(EFFETS INDESIRABLES)

~~COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS.~~

Dans certains cas rares, il est possible que survienne : une éruption cutanée (lésions rouges sur la peau) ou une réaction allergique : **il faut immédiatement arrêter le traitement et avvertir un médecin.**

Ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants

- nausées, vomissements,
- ou encore, douleurs abdominales, constipation, vertiges, troubles mineurs de la vision, maux de tête, fatigue, envie de dormir, euphorie, désorientation,
- hypoglycémie (diminution du taux de sucre dans le sang, se traduisant par des sueurs, des troubles de la concentration ou de l'humeur, ou un malaise),
- hépatite (atteinte du foie, avec éventuellement coloration jaune des yeux ou de la peau).

~~SIGNEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.~~

CONSERVATION

~~NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.~~

DATE DE REVISION DE LA NOTICE

Octobre 1996

LABORATOIRES
HOUDE