أملـور*

أملوديين بيبلات

١ـ الاسم التجاري للمستحضر الطبي

أولور ٥ ـ ٣مجم
أولور ١٠ ـ ٦مجم
أملوديين

٢ـ التركيبة النوعية والكمية

أملور ٥ مجم

أملوديين (بيبلات)	٩,٩٤٥	مجم
مكافئ الأملوديين	٥,٠٠٠	مجم
بلورات نقية من الميلوز	٧٢,٥٥٦	مجم
نشا فلترة و صبغة	٢٠,٠٠٠	مجم
اسبارات المغنسيوم	٠,٥٠٠	مجم
كبسولة ولبدة رقم ٢	١٠٠	مجم

أملور ١٠ مجم

أملوديين (بيبلات)	١٩,٨٩٠	مجم
مكافئ الأملوديين	١٠,٠٠٠	مجم
بلورات نقية من الميلوز	٧٢,٥٥٦	مجم
نشا فلترة صبغة	٢٠,٠٠٠	مجم
اسبارات المغنسيوم	٠,٥٠٠	مجم
كبسولة ولبدة رقم ٢	١٠٠	مجم

مكونات غطاء الكبسولة:

الجيلاتين الصلب الصبغة تتكلمات تيتانيوم ـ أكسيد الحديد الأحمر
الغطاء : جيلاتين ، أوكسيد التيتانيوم و أصفر

٣ـ الشكل الدوائي و الاحتواء

أملور ٥ مجم

كبسولة (أحمر / أبيض) ٥٠٠ كبسولة
أملور ١٠ مجم
كبسولة (أحمر ـ أحمر) ٥٠٠ كبسولة

٤ـ الخواص الاكلينيكية

٤ ـ ١ دواعي الاستعمال:
ـ العلاج الوقائي للنوبة الصدرية الذبحة الصدرية الصغيرة والمتقلبة.
ـ ارتفاع ضغط الدم.

٤ ـ ٢ الجرعة وطريقة العلاج:
ـ ارتفاع ضغط الدم:
الجرعة الابتدائية كبسولة واحدة(٥ مجم) مرة واحدة يوميا ،يمكن زيادتها الى ١٠ مجم
جرعة واحدة يوميا حسب الاستجابة للعلاج
ـ النوبة الصدرية:
الجرعة الابتدائية كبسولة واحدة(٥ مجم) مرة واحدة يوميا،يمكن زيادتها الى ١٠ مجم جرعة واحدة يوميا حسب الاستجابة للعلاج
ـ الجرعة اليومية القصوى ١٠ مجم.
ـ للمسنات ملاحظات الاعتناء الحديث لصلة الفشل ـ و يمكن تخطي الأمنوديين أي كانت درجة فشل الطحال الأبيض للقلب.
ـ الجرعة الواحدة يكفي اليوم.
تعاطي درجة في الشخص عند الجرعتين يكفي اليوم و التنبيه.
ـ الاستخدام في حالات الفشل الكلوي:
يمكن وأما الأملوديين بالجرعة الطبية التي يوصى بها و لا تؤثر تحريات مركز الأمنوديين في الفشل ـ على سبيل المثال الكلوي ، كما لا يمكن التنظير عند بولينة تشمل الكلوي.
بينما هذه جميعة تنصح جرعة الأمنوديين عند تناوله في هي توقف مع تحذرات التي من مجموعة الإنزاع أو مشاكل مستطلات بينما أو مشاكلات الإنزاع المعمول للأميلوتيوس.

٤ـ ٣ موانع الاستخدام:

ـ يحظر تناول هذا الدواء في حالات الصدمة المتعدد لمركبات الديهيدروبايريدين.
ـ لا يتصح بتعاطي هذا الدواء لوجه عام مع الفلتروتين (فشل قلوي ٤٠ ـ ٥ التفاعلات مع الأميوديين الأخرى).

٤ ـ ٤ تحذيرات واحتياطات خاصة من أجل الاستخدام:

تحذيرات خاصة:

لم يتم التوصل بعد إلى معلومة بعد أن يتعلقه هذا المستحضر الدوائي من أثر فعال وما نحكمه من حالت الأمنية بالأطفال ، ولذلك لا ينصح باستعمال الأطفال للأملوديين.
عند ظهور العلامات الإكلينيكية الصحيحة أو فقدان تنبيه أو انخفاض ضغط الدم (واضح باعراض الكلية) فإن هذه الأعراضات تكون ، وفي هذا الوقت بعد الأرتفاعها ، وخاصة في حال حدوث الوفاة.

يفيض أيات الأعراض في الدم.

احتياطات الاستخدام:

ـ الاستخدام بواسطة المرضى الصحيين بالعطاش في وظائف الكلوية:
تزيد مدة نصف العمر الخاصة بمركب الأمنوديين في المرضى الصحيين بالعطاش في وظائف الكلوية (فشل قلوي ٣٠ ـ ٦٠ ، خواص حركة الدوام) ، ليست هناك توصيات عند خفض بالجرعة ، وبالتالي ينبغي إعطاء الأمنوديين بحذر إلى هؤلاء المرضى.
ـ الفعل الطويل لا يصلح به ٤٠ ـ ٦٠.

٤ ـ ٥ التفاعلات مع الأدوية الأخرى و أنواع أخرى من التفاعلات:

ـ تحذير إلى يصلح به (اجراءات الطوارئ):

ماتزوفون (ويريا): وجدت عند خلو خلوبلمول والفاتوفون وتجربه على عض الحيوانات وبدنيا ، هذه الأدوية تحدث مشاكل عديدة من الأنفاس القلبي غير المنتظم ، لذلك فإن هناك خطورة محتملة في التنزع بين موقفان: فلوت الكلسيوم والفاتوفون مع ذلك ، فقد منع استخدام مرضى الديهيدين والفاتوفون معا دون حدوث أية مشاكل.
ـ التنبيه الذي يحتاج لاحتياطات:
مشتلات مستطلات قلبا (الفلوتوتين وبروتوسين): ، الزيادة في ارتفاع ضغط الدم ومخاطر الاندفاع تحدث في الدم (الفشل ، الموقف ، الغرائق الأكليكية يحتاج إلى انخفاض في ضغط الدم المنتظر ، خلال الساعات التي تلي تناول الفشل المستطلات أقلها ٢ (خلسة عند بدء الفشل).
بالكلوفين: زيادة في الأثر المضاد لارتفاع الضغط مخاطرة ضغط الدم الشريانى وتعدل حدوث الدواء مخاطر لارتفاع الضغط الذي تحدث ما قلصت الضرورة.
ـ بيتاسمبات: ، وكذلك الفيراميل والفلتاروم والديلتيازيم ، وخاص سميوت موقعت عدل الفشل في قلبه تنبيه الدواء يحتاج أيضا في الكبد ، الزيادة الأكليكية في تعديل جرعات موقفت ، عدت الكلسيم ، فلته العلاج بالزيادة بتنبيه ، وبعد تنبيه عن قلبه.
ـ الزافاتوزول: ، منتج من الهيدروين والديهيدروين والزوبرين ، زيادة خط سميوت الأوروبا تنبيه الأنفاس الأعصى الكلي لأنه يهدد ويعدس ، الموقفه الأكليكية تم تعديل جرعات الديهيدروبايريدين أثناء العلاج بواسطة الأنزوكوتازول وبعد التوقف ، عن تناوله.

ـ مزج ينبغي أخذه في الاعتبار:

مثبطات مستطلات بيتا: تحدثان ضغط قلبه أو مبرد قلب في المرضى الصحيين بشكل قلب ، فحدوث أو غير قياسي للمبرد: (ضعوط تعصبي قلب على قلبه في المبرد الديهيدروبايريدين ، يكون تدبيه بعدا: اعتبارا على ضحوطات والجرعة ترفع أطول قبل قلب الطب قلب لمثبطات مستطلات سيئة) هذا بالإضافة إلى أن قلب مثبطات مستطلات بيتا قد يقلل من زيادة ضغط الدم الذي يحدث في حالة انتقال تنشيط ، في جلوكيميا في حركات الأميرمبي الصبغة الكلب (حركات بلاتية التنشيط) ، تزيد من الأثر المضاد لارتفاع ضغط الدم وخطر الإصابة بالضغوط ضغط الدم المرتبط بالوقوف (أثر أرتماني) (الاحتقان بالجلوتيوم تنبيه الكلوي بالكوكتيل).

المنظومات العصبية : زيادة في الأثر المضاد لارتفاع ضغط الدم مع وظيفة الإسابة بانخفاض ضغط الدم المرتبط بالوقوف (أثر إرتماني).
إضافة إلى هذا لا يقوم الأمنوديين بتحليل مسلوبات: للديهيدكين في الهلاك ما أو تبعية الكلي له (في المنظومتين الإصباء.

٤ ـ ٦ الحمل والرضاعة

ـ الحمل:
أم تظهر الزرافات: قدم أجريت على الحيوانات أي أثار مسندة فسوخ أو تشوهات، ودون أثار أثار فسوخ أو تشوهات على الزرافات ، فإنه لا يظهر تشوهات في الإنسان. وقد وجد ، ذي يهتما هنا ، أي يتعرض صغيرة: عن حدوث أخرجت في الإنسان تسبب ظهور الفسوخ والتشوهات في الحيوانات وقتما تناقض التجارب التي تم إجراءها بشكل صحيح على كل من الجنسين.

ـ مستحضر يؤثر على صحتك، ولهذا فإنك خلافا للتعليمات يرجعك الخطر.
ـ لا تبيع دقة وصفة الطبيب وطرقه الاستخدام، المفحوص بطلبها وتنظيمات الصيدلانى الذي صرفها لك.
ـ فاتخبيت والصيدلانى هذا المحذرين بالأدوية وتنفيه وصرورة.
ـ لا تتوقع منه العلاج المحددة لك ، وقت وصفك.
ـ لا تعطى صرف الدواء بدون وصفة طبية.
لا تترك الأدوية في متناول أيدى الأطفال.

ولا تجوز في الوقت الحالي بيانات متممة أو كافية لتقييم المنتوجات: التفاعلية أو الآثار السامة على الأدوية للمتاحى الأمنوديين لقد لم تفعل.
وعند ٧ لا يصلح لاستخدام للمنتوجين قتله قد مل وتنكه كاوجاز، وتكلى
ـ الرضاعة:
بسبب هناك بيانات فيما يتعلق بعبور الأمنوديين في لبن الثدي مع ذلك ، وكما هو الحال مع مركبات الديهيدروبايريدين الأخرى، فإن الكميات الموجودة في لبن الثدي قليلة جدا ولم يتم الإبلاغ عن أي ذكر غير مرغوب فيها بناء على ترفيع الكثف على بعض الحالات الفردية وكاوجاز وتكلى ، يتصح بمقدى إعطاء هذا الدواء في الرضعات بالأمهات.

٤ ـ ٧ الآثار على القدرة على القيادة واستخدام الماكينات:

ينبغي عند قدم في العلاج أن يوصى المتقلبين أو مدخدم هايكيات الفرص بدرجة كافية خدمة الإصابة بالدوار (انظر الجرعه ٤ ـ ٤ الآثار غير المرغوب فيها)

٤ ـ ٨ الآثار غير المرغوب فيها:

الآثار المهمة الأكثر شيوعا فيرمنتلة تتأثر المثانة المرتج للأوعية ، وعادة على سبيل المثال: الصداع وخمار الرأس أو الشعور بالمبات الدوار منه ويمكن تكرار حدوث هذه الأعراض الجانبية خلال الأسبوع الأول للعلاج ويقل حدوثها مع استمرار العلاج.
كما هو الحال مع مركبات الديهيدروبايريدين الأخرى ، قد تكون الأوديما حول الكاحل أو في الوجه ، ويزيد حدوث هذا بعد تناول جرعات كبيرة من الدواء
وقد كانت هناك تقارير نادرة بعد ما يلي:
ـ آثار على القلب : سرعة خطان القلب ، الشعور بدقات القلب ، خفان الوجي.
ـ آثار على الجلد والأغشية المخاطية: تقرح، زيادة بعرق الوجي، تفاعل الحساسية بما فيه الهرش والسعال والأوديما. وكما هو الحال مع مركبات الديهيدروبايريدين الأخرى، تم الإبلاغ عن حدوث تحديد سميط في الفك في المرضى المصابين بالسبات خلية في الثلاثة أو الشهاب جوب الفم ، وعادة التقدي ، قل هذا المتحسم أو التقدم بعد عن طريق العناية الطبية بالفم.
ـ آثار على الجهاز الهضمي: عسر هضم ، عطب حالت التثوى، هذه الشهية، الغثيان، الإسهال، الإمساك ، مغالب الفم.
ـ الآثار العصبية المحيطية: تتقلصات عضلية، ألام بالعضلات، ألام بالمفاصل.
ـ آثار على الجلد والأغشية المخاطية: تقرح، زيادة بعرق الوجي ، وذلك للتوقف ولارتفاع تركيز تأثيرات الكبد. (ما يتفق بشكل كبير وركود الصفراء) مع وجود حالات نقاط تحقيق المخطئ في المستشفى. ويتم التشاء عند التوقف، عن تناول العلاج.
ـ الآثار على الرئة: صعوبة التنفس.
ـ الآثار الرئوية الشديدة: نادرة ، فيما عدا ما تم الإبلاغ عن حدوثها مع العقار الأخري المصنف الإنزاع مستحدثه ، مستحدث الفتى في الفكر.
ـ الآثار العصبية النفسية: الوهن، الدوار، اضطرابات في الذاكرة، تشوش الذهن، الارتباك، الاضطرابات البصرية، الاكتئاب.
ـ آثار على الدم: فرصات التصحي
ـ آثار على الدم: انخفاض عدد الصفائح الدموية
ـ آثار على الأوعية الدموية: الأوعية الدموية الدموية
كما هو الحال مع مركبات هذا الدواء الكالسيوم الأخرى، تم الإبلاغ عن حدوث ما يلي، بصورة نادرة، التعرض: الألم الذبحة الصدرية، انخفاض ضغط الدم، اضطراب ضربات القلب، ويمكن الربط بينها وبين الحالة الوخيمة المسببة للقدم في العلاج ويتدمى أي تدوي إلى النظر في ضمن أو العلاج.

٤ ـ ٩ زيادة الجرعة:

قد تؤدي الزيادة الكبيرة في الجرعة التي يتم بتناولها إلى اتساع مفرط للأوعية الدموية الطرفية بما تؤدي إلى هبوط شديد ومفاجئ في ضغط الدم. وقد حدثت أيضا تشنجات في منطقة الدم بسبب هذا. ينطلب الرعاية في رعاية الرعاية، فيركز: الفك. ويمكن استخدام الدواء الفاتحة للأرعية الدموية لاستعادة التوتر في الأوعية ورفع ضغط الدم ، لا يمكن التخلص من الأمنوديين عن طريق غسيل الكلوي.

٥ ـ الخواص الفارماكولوجية:

٥ ـ ١ التنوعات الفارماكولوجية:

ـ هذا المنتج الكلسيوم هو الأحد الأدوية الدموية: (مستحدث من الديهيدروبايريدين) الأمنوديين هو مشتق الكلسيوم وبنطى من الديهيدروبايريدين الذي تؤثر على عرض الأرتماني في قنوات الكلسيوم لكل من ٤ ـ ديهيدروبيريدين ، وتشتقرقم ، وقد يوقف في التنشيط قدم لدخول الكلسيوم عبر طرات الكلسيوم في الخلايا الأرتماني وعدايا عملات القلب. وكما هو الحال مع مركبات الديهيدروبايريدين الأخرى، فإن الأمنوديين له خواص مقدرة للبول ومعزقة لأعينات الصوديوم في البول في الحيوانات.
ترتبط قوة مضاد كمضد لارتفاع ضغط الدم الدموية بقدرتهم المثبطة على فصلات الكالوفوت في الأوعية الدموية في جوفها مرتفعا.
يقوم إعطاء قدرة واحدة يوميا في المرضى الصحيين بإنتاج مستقر لانخفاض ضغط الدم ، ذهاب ملحوظا في مدى ضغط الدم في وضع الوقوف أو الوقوف على مدى ٢٤ ساعة ، دون حدوث زيادة مصاحبة في عدد ضربات القلب. ويصل الحد الأدنى للأمنوديين من حدوث نوبات هبوط الضغط.
يقال الأمنوديين من أو مثالي الفارماكولوجية الدون التدوب، في زيادة ضربات القلب كرد فعل. ويصاحب هذا انخفاض في استهلاك الطاقة وتمكنه الأوكسجين المطلوبة ويسبب العقار أنتاج الشرايين الأنابية والتزايين الصغيرة بما يؤدي من إيقاف عضلة القلب من الأوكسجين.
يزيد تناول المرضى الصحيين بالنوبة الصدرية للأمنوديين من زمن بدء تمدد الزمن الأدنى وحتى ظهور أعراض النبضة وتطور الضغط الصغير في زمن إيقاف عمل من كل من حمل مجهود للحدث والمؤلاك القلوب.
كما هو الحال مع مستطلات الكالسيوم الأخرى، فإن الأمنوديين مخاير من حيث الفائدة على صحة الأوعية وليس إيه تؤثر على مستويات الدهون في الطلاب.
المرضى الذين يعانون من داء القلب الفكري، أو الفرض.
في حالات المرضى الذي تجرت لهم عمليات قلبية أو يتم علاجهم بشكل مجبور، تزيدي الجرعات المطلقة من الأمنوديين في المستشفى مستطلع الدم وبإدة مزيان الدم في الكلي ويقدر محل الفرنتيج المستشفى المستطلع الدم الأمنوديين في الطلاب ، ولا يتم تعليم عشتي صبيه الأمنوديين للحيلات على عين لتصر فروزوع.

٥ ـ ٢ خواص تحرك الدواء

يتم الامتصاص التام للجرعة العلاجية من الأمنوديين في الأمعاء ، وتتم بعدها بعد ٦ ساعات ، وقد تم تقدير الفراحة الميوولوجي (الفلتمس) للأمنوديين بما يدارج من ٦٤ و ٨٠٪ مع وصول الذروة في الدم خلال ٦ إلى ٩ ساعات بعد ٦ ـ ١٢ ساعة من التناول. ويقدم نوتريج الجرعة في جرعة مقدار ٢٠ أثر أركيم.
ويصل نصف عمر التخلص من الدواء في ٣٥ ـ ٥٠ ساعة ويتبع إعطاء الدواء مرة واحدة يوميا، بحيث يصل إلى مرحلة التركيز ضيتر في الدم بعد ٧ ـ ٨ أيام من بدء التعاطي.
يتم تمثيل الأمنوديين بالكامل بواسطة الكبد إلى مركبات غير نشطة وتتم بمقدار ٦٠ إلى ٧٠٪ من مرفوع التمثيل في الدم وقد أظهرت الدراسات المصابة أن ٩٧ و ٢٪ من الأمنوديين الدم الدموية بروتينات الملازمة.
يزيد تركيز الأمنوديين في البلازما في كبار السن عنه في المرضى الأصحاء مثلا ولا يصاحب هذا أية مؤشر إكلينيكية ، ولا ينتج نصف عمر التخلص من الجسم يلاحظ زيادة في نصف العمر في وجود الفشل الكلوي.
مرضى الفشل الكلوي: إذا تدرجت مجالات الأمنوديين في البلازما بدرجة الفشل الكلوي، يجب تعديل المستخدم بحسب مدة انتهاء تاريخ على الصلاحية المطبوع على الكرتون الخارجية.

٥ ـ ٣ احتياطات خاصة للتخزين:

يحفظ بعيد درجة حرارة ٢٥° درجة مئوية.

٥ ـ ٤ طبيعة ومحتويات العبوة:

٣٠ كبسولة ، في علاف مشكل حراريا (PVC أو الأمنوديوم).

تاريخ تعديل على النص الطبي أمراجعة : ٨ أغسطس ٢٠٠١.

صنع بواسطة ٥٥٥ ـ فرنسا.

٥٠ الملاك: الشركة فايزر العالمية ـ نيويورك ـ الولايات المتحدة الأمريكية

مجلس وزراء الصحة العرب
وقطاع الصيدلة العرب.