

Principe actif: Aciclovir

COMPOSITION: Principe actif: 1 comprimé contient 200 mg d'aciclovir. Principes inactifs: amidons, cellulose, povidone, silice, stéarate de magnésium.

INDICATIONS: Infections de la peau et de la muqueuse dû au virus herpes simplex, en particulier herpès génital, (primo-infections et des infections récurrentes réquémment de la région génitale).

Chez l'adulte souffrant de formes très graves d'infections génitales, dû au virus herpes simplex, récurrentes fréquemment, il est recommandé d'effectuer un traitement prophylactique.

CONTRE-INDICATIONS: Hypersensibilité à l'aciclovir. Un traitement prophylactique avec WARIVIRON 200 mg n'est pas recommandé chez les sujets ayant une insuffisance rénale ou une excréation urinaire réduite (moins de 100 ml d'urine/24 heures).

Au cas où un traitement semble absolument nécessaire pendant la grossesse, le médecin doit soigneusement peser le bénéfice par rapport aux risques éventuels. Après utilisation de médicaments contenant de l'aciclovir, la présence d'aciclovir a été prouvée dans le lait maternel.

C'est pourquoi il faut discontinuer l'allaitement pendant le traitement avec l'aciclovir.

Parce que les sujets âgés souffrent assez souvent d'une insuffisance rénale que chez les autres sujets, il est recommandé de surveiller la fonction rénale et d'assurer un apport suffisant de liquide pendant le traitement avec l'aciclovir.

INTERACTIONS: Les indications suivantes sont aussi valables au cas où d'autre médicament a été appliqué récemment.

Le probénécide réduit l'élimination de l'aciclovir par voie rénale, ce qui peut prolonger la durée de la présence d'aciclovir dans l'organisme.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE, DUREE DU TRAITEMENT: Sauf prescription contraire, les adultes en cas d'infections dû au virus herpes simplex prennent 5 comprimés par jour à prendre à intervalles réguliers de 4 heures.

Pour la prophylaxie contre les infections génitales dû au virus herpes simplex, récurrentes souvent et d'une forme grave, les adultes avec un système immunitaire sain prennent 4 comprimés par jour à prendre à intervalles réguliers de 6 heures. En cas isolés, il est possible d'effectuer un traitement prophylactique plein de succès avec 3 comprimés par jour à prendre à intervalles réguliers de 8 heures ou 2 comprimés par jour à prendre à intervalles réguliers de 12 heures.

Les adultes avec un système immunitaire malade prennent comme traitement prophylactique 4 comprimés par jour à prendre à intervalles réguliers de 6 heures et celles avec un système immunitaire très malade (par exemple après de transplantations d'organes) prennent 2 comprimés 4 fois par jour à prendre à intervalles réguliers de 6 heures.

Chez l'enfant de plus de 2 ans la posologie est la même que chez l'adulte en cas d'infections dû au virus herpes simplex; chez l'enfant de moins de 2 ans la posologie prévue pour l'adulte est à diviser par deux.

Une posologie réduite est possible chez les sujets avec une fonction rénale insuffisante. Il faut que le médecin adapte la posologie au cas individuel :

En cas d'une clairance de la créatinine < 10 ml/min/1,73 m² et une créatininémie > 550 µmol/l (> 6,22 mg/dl) chez les femmes ou > 750 µmol/l (> 8,48 mg/dl) chez les hommes la posologie est 2 comprimés par jour à prendre à intervalles réguliers de 12 heures pour traiter des infections dû au virus herpes simplex.

A prendre sans le mâcher avec une quantité suffisante de liquide, de préférence après les repas.

En cas d'une insuffisance rénale, il faut prendre soin d'un apport suffisant de liquide pendant le traitement.

NOTE IMPORTANTE: La prise de WARIVIRON 200 mg doit se faire le plus rapidement possible après l'apparition des premiers symptômes d'infection, en particulier en cas d'infections dû au virus herpes simplex récurrentes, où la prise doit avoir lieu dès les premiers symptômes (p. ex. démangeaison, sensation de tension, vésiculation).

Il faut traiter habituellement des infections dû au virus herpes simplex pendant 5 jours. Le traitement peut être prolongé en cas de besoin.

La durée d'un traitement prophylactique chez les sujets avec un système immunitaire sain dépend de la gravité et de la récivité des infections. Elle ne doit pas excéder une période de 6 à 12 mois.

Chez les sujets avec un système immunitaire gravement défectueux la durée d'un traitement dépend du degré de l'insuffisance et doit être déterminée par le médecin et adaptée au cas individuel.

Si trop de WARIVIRON 200 mg a été pris (surdosage), informez immédiatement votre médecin! Si vous avez pris trop peu de WARIVIRON 200 mg ou oublié la prise, ne prenez pas plus que la quantité prescrite avec la prochaine prise et informez votre médecin.

EFFETS SECONDAIRES: Les effets secondaires suivants ont été observés, disparaissant à l'arrêt de l'application:

Occasionnellement: éruptions cutanées, troubles gastro-intestinaux tels que nausée, vomissement, diarrhée et douleurs abdominales; symptômes neurologiques, surtout sous forme de vertige, d'états de confusion, d'hallucinations et de somnolence. Ces effets secondaires se présentent généralement chez les sujets avec une fonction rénale troublée ou d'autres maladies favorisant ces effets secondaires; chute des cheveux augmentée (alopécie diffuse) sans relation claire avec l'application d'aciclovir.

Rarement: de changements temporaires des résultats d'analyse déterminés pour le foie, les reins et l'hémogramme (augmentations de la bilirubine, des enzymes du foie, de l'urée sérique et de la créatinine ainsi qu'une légère baisse des paramètres hématologiques); maux de tête, épuisement, insomnie et fatigue; troubles respiratoires.

Cas isolés: d'états de désaffection; des crises de convulsions temporaires et des psychoses, surtout pendant d'administration d'aciclovir sous forme d'injection intraveineuse en cas d'évolutions cliniques compliquées.

Mise en garde: le médicament ne doit pas être utilisé après la date d'expiration.

Médicament ne pas laisser à la portée des enfants!



WALTER RITTER GmbH & Co. KG
Germany / Alemania / Allemagne