

نشرة العبوة: معلومات للمريض

مرهم فيوسيدين® 2%

حمض الفوسيديك

اقرأ هذه النشرة بالكامل بعناية قبل البدء في استخدام هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة بالنسبة إليك.

- احتفظ بهذه النشرة. قد تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى.
- إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية، فاسأل طبيبك أو الصيدلي.
- تم وصف هذا الدواء لك أنت فقط. لا تقدمه إلى آخرين. فقد يضرهم، حتى لو بدت لك علامات مرضهم مماثلة لمرضك.
- إذا ظهرت عليك أي آثار جانبية، فتحدث مع طبيبك أو الصيدلي. يتضمن ذلك أي آثار جانبية محتملة غير مدرجة في هذه النشرة. راجع القسم 4.

محتويات هذه النشرة

1. ما فيوسيدين® وفيم يُستخدم
2. ما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام فيوسيدين®
3. كيفية استخدام فيوسيدين®
4. الآثار الجانبية المحتملة
5. كيفية تخزين فيوسيدين®
6. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

1. ما فيوسيدين® وفيم يُستخدم

يحتوي فيوسيدين على مضاد حيوي يعمل على البكتيريا التي يمكن أن تسبب التهابًا في الجلد.

يمكنك استخدام فيوسيدين للالتهابات التي تسببها البكتيريا التي يعمل عليها فيوسيدين.

من الممكن أن يكون طبيبك قد وصف استخدامات أخرى. اتبع تعليمات طبيبك دائمًا.

اتصل بطبيبك إذا ساءت حالتك أو إذا لم تتحسن.

2. ما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام فيوسيدين®

قد يكون طبيبك قد وصف استخدامات أو جرعات أخرى بخلاف تلك الموصوفة في هذه المعلومات. اتبع دائمًا تعليمات طبيبك والمعلومات الموجودة على ملصق الجرعة.

لا تستخدم فيوسيدين:
إذا كنت تعاني من حساسية تجاه فوسيدات الصوديوم أو أي من مكونات فيوسيدين الأخرى (المدرجة في القسم).

المحاذير والاحتياطات

لا تستخدم المرهم حول العينين لأنه قد يؤدي إلى تهيج العين.

الحمل والرضاعة

إذا كنت حاملاً أو مرضعاً، أو تعتقد أنك قد تكونين حاملاً أو تخططين لإنجاب طفلاً، فاسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على المشورة قبل استخدام هذا الدواء.

الحمل

ينبغي لك استخدام فيوسيدين وفقاً لتعليمات طبيبك فقط.

الرضاعة الطبيعية

يمكنك الإرضاع طبيعياً حتى لو كنت تستخدمين فيوسيدين، لكن لا ينبغي لك وضعه على ثديك.

السلامة في الطريق والسلامة المهنية

لا يؤثر فيوسيدين على السلامة المهنية والقدرة على القيادة بأمان في حركة المرور.

الأدوية الأخرى مع فيوسيدين

أخبر طبيبك أو الصيدلي دائماً إذا كنت تتناول أي أدوية أخرى أو قد تناولتها مؤخراً. يمكنك استخدام فيوسيدين مع أدوية أخرى.

يحتوي فيوسيدين على بوتيل هيدروكسي تولوين وكحول سيتيل ولانولين
يمكن أن يسبب محتوى كحول سيتيل وبوتيل هيدروكسي تولوين E321 طفحاً جلدياً موضعياً (مثل التهاب الجلد التماسي). يمكن أن يسبب اللانولين طفحاً جلدياً موضعياً لدى من يعانون من الحساسية تجاه اللانولين.
قد يسبب بوتيل هيدروكسي تولوين E أيضاً تهيجاً للعين والأغشية المخاطية.

3. كيفية استخدام فيوسيدين

استخدم هذا الدواء دائماً كما أخبرك طبيبك أو الصيدلي بالضبط. إذا راودك شك، فاسأل طبيبك أو الصيدلي.

الجرعة المعتادة هي:

الأطفال والكبار:

ضع المرهم 2-3 مرات في اليوم.

إذا استخدمت فيوسيدين أكثر مما ينبغي

اتصل بطبيبك أو قسم الطوارئ أو الصيدلي إذا كنت قد استخدمت فيوسيدين أكثر مما هو مذكور في هذه المعلومات، أو أكثر مما قد وصفه طبيبك (وتشعر بتوسع).

لا تتوفر معلومات بشأن التسمم بعد استخدام فيوسيدين.

إذا نسيت استخدام فيوسيدين

لا تستخدم جرعة مضاعفة لتعويض جرعة منسية. استمر بالجرعة المعتادة فحسب.

4. الآثار الجانبية المحتملة

مثل جميع الأدوية، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثاراً جانبية، على الرغم من عدم حدوثها للجميع.

آثار جانبية غير شائعة (قد تظهر لدى عدد يصل إلى 1 من كل 100 شخص):

- الإكزيما
- الطفح الجلدي
- الحكة
- احمرار الجلد
- الألم في مكان وضع المستحضر (بما في ذلك الإحساس بالحرقان أو الوخز في الجلد)
- التهيج في مكان وضع المستحضر

آثار جانبية نادرة (قد تظهر لدى عدد يصل إلى 1 من كل 1,000 شخص):

- فرط الحساسية
- التهاب العين مع احمرار العينين والدموع.
- الطفح الجلدي (الشرى) والتورم: قد يكونان شديدين. تحدث إلى طبيبك. إذا كان هناك تورم في الوجه والشفة واللسان، فقد يكون ذلك مهدداً للحياة. اتصل بالرقم .
- الشرى
- البثور

التبليغ عن الآثار الجانبية

إذا ظهرت عليك أي آثار جانبية، فتحدث إلى طبيبك أو ممرضتك أو الصيدلي. يتضمن ذلك أي آثار جانبية محتملة غير مدرجة في هذه النشرة. من خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية، يمكنك المساعدة في توفير مزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.

5. كيفية تخزين فيوسيدين®

احفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال.

فترة التخزين: 3 سنوات.

كلمة EXP.

اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد مطلوبة. حافظاً على البيئة، لا تلقِ بقايا الدواء في البالوعة أو المراض أو سلة القمامة.

6. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

يحتوي فيوسيدين على:

المادة الفعالة: فوسيدات الصوديوم.

المكونات الأخرى هي: كحول سيتيل، لانولين لا مائي، زيت بارافين، بارافين أبيض ناعم، بوتيل هيدروكسي تولوين E، توكوفرول ألفا الراسمي بالكامل.

المظهر وأحجام العبوات

فيوسيدين هو مرهم شفاف لونه أبيض إلى أبيض مصفر.

أحجام العبوات: 15 جم و30 جم

للإبلاغ عن أي أثر (آثار) جانبي

- المملكة العربية السعودية:
- المركز الوطني للتبليغ الدوائي (NPC):
- مركز اتصال الهيئة السعودية للغذاء والدواء: 19999
- البريد الإلكتروني: npc.drug@sdfa.gov.sa
- الموقع الإلكتروني: https://ade.sdfa.gov.sa

- دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى:
- يرجى التواصل مع الهيئة المختصة ذات الصلة.

الجهة الحاصلة على ترخيص التسويق:

LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 Ballerup

جهة التصنيع

LEO Laboratories Ltd., 285 Cashel Road, Dublin 12, أيرلندا

تم إجراء آخر تعديل على هذه النشرة في يونيو 2018.

هذا دواء

- الدواء منتج، لكن ليس مثل غيره من المنتجات.
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك وتناوله بما يخالف التعليمات يشكل خطورة عليك.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال وتعليمات الصيدلي الذي باع لك الدواء. الطبيب والصيدلي خبيران في الأدوية وفوائدها ومخاطرها.
- لا تقطع فترة العلاج الموصوفة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر الدواء نفسه ولا ترفع الجرعات من دون استشارة طبيبك.
- لا تترك الدواء في متناول الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب
اتحاد الصيدالة العرب



LEO