

بانادول أدفانس أقراص مغلفة (مسكن / خافض للحرارة) معلومات حول المنتج

الوصف

يحتوي كل قرص على:

باراسيتامول ٥٠٠ ملغم

مكونات أخرى، نشاء ما قبل الهلام، كربونات الكالسيوم،

حمض الألجينيك، كروميويدون، بوفيدون

(k-25)، مستحبات المغنيزيوم، السليكا

اللامائية الغروية، صوديوم مكوّن من الميثيل

باراهيدروكسي بنزوات (E219)، صوديوم

إثيل باراهيدروكسي بنزوات (E215)،

صوديوم بروبييل، باراهيدروكسي بنزوات

(E217)، صمغ الكارنوبا، أبيض الأوبادراي

(YS-1 - 7003) الذي يحتوي على ثاني

أكسيد التيتانيوم (E171)،

3cp / HPMC 2910 / هايبروميلوز

6cp / HPMC 2910 / هايبروميلوز

ماكروجول، بولييسوربات 80.

ما هو بانادول أدفانس وما هي دواعي استعماله؟

بانادول أدفانس هي أقراص مغلفة تحتوي على الباراسيتامول وهو

مسكن للألم وخافض للحرارة.

يستخدم بانادول أدفانس لتسكين مؤلمة للألم البسيط إلى المعتدل

المنتج من:

- انصداع،

- آلام العضل،

- آلام الدورة الشهرية،

- آلام الأسنان،

- التهاب المفاصل

كما أنه يخفف الحمى المرتبطة بنزلات البرد والإنفلونزا.

كيفية تناول بانادول أدفانس:

لتناول عن طريق الفم فقط.

للبالغين (بما فيهم المسنين) والأطفال ما فوق ١٢ سنة من العمر:

- تناول قرصين حتى أربع مرات يومياً عند الحاجة.

- لا تتناول أكثر من مرة كل ٤ ساعات.

- لا تتناول أكثر من ٨ أقراص خلال ٢٤ ساعة.

للأطفال ما بين ٦ - ١٢ سنة من العمر:

- نصف القرص أو قرصاً واحداً (٢٥٠ ملغم - ٥٠٠ ملغم)، ٣

إلى ٤ مرّات في اليوم (٢٤ ساعة) عند الحاجة.

- لا تتناول أكثر من مرة كل ٤ ساعات.

- لا تتناول أكثر من ٤ أقراص خلال ٢٤ ساعة.

- لا تستخدم لأكثر من ٣ أيام من دون استشارة الطبيب.

للأطفال دون ٦ سنوات:

- لا ينصح باستخدامه للأطفال دون ٦ سنوات من العمر.

قبل أن تتناول بانادول أدفانس:

أ- لا تتناول بانادول أدفانس في حال:

- تعاني من حساسية للباراسيتامول أو أي من مكونات

المستحضر.

ب- توخي الحذر عند استعمال بانادول أدفانس في حال:

- كنت مصاباً بقصور في الكبد أو الكلى.

راجع طبيبك في حال:

- في حال تعاني من حالات استفاد انفولونايون أو من التهاب حاد

ككون استخدام الباراسيتامول قد يزيد من خطر الإصابة

بالحمى الأيضي.

إن علامات الحمى الأيضي تشمل:

- التنفس السريع والمميق والصعوبة في التنفس

- الغثيان، والتقيؤ

- فقدان الشهية

- اتصل بالطبيب فوراً في حال الشعور بهذه الأعراض.

- يرجى مراجعة طبيبك في حال عدم تحسّن الأعراض أو تفاقمها

أو ظهور أعراض جديدة لأن ذلك قد يدل على حالة خطيرة.

- احفظ هذا المنتج وجميع الأدوية بعيداً عن متناول ونظر

الأطفال.

- لا تتجاوز الجرعة المذكورة.

- هذا المنتج يحتوي على الباراسيتامول. لا تتناوله مع أدوية أخرى

تحتوي على الباراسيتامول.

- هذا المنتج يحتوي على الصوديوم ميثيل، الصوديوم إيثيل-

والصوديوم بروبييل- باراهيدروكسي بنزوات التي قد تسبب

الحساسية (ربما تتأخر).

ج- تناول أدوية أخرى:

- تناول الباراسيتامول مع الكحول قد يزيد من الآثار السامة على

الكبد.

- يمكن تمييز تأثير الأدوية المضادة للتجلط والنوارفارين وغيرها

من الكومارينز إثر الاستعمال اليومي الطويل المنتظم

للباراسيتامول مع زيادة في خطر النزيف؛ الجرعات العرضية

ليس لها أي تأثير ملحوظ.

د- الحمل والرضاعة:

يجب الحصول على الاستشارة الطبية قبل تناول هذا المنتج خلال

فترة الحمل أو الرضاعة.

إن الدراسات التي تم إجراؤها مع الباراسيتامول على البشر

والحيوانات لم تسجّل أي خطر على الحمل أو تطور الجنين.

إن الدراسات التي تم إجراؤها مع الباراسيتامول على البشر لم

تسجّل أي خطر على الرضاعة أو الرضيع بالرضاعة الطبيعية.

يتجاوز الباراسيتامول حاجز المشيمة ويتم إفرازه في حليب الأم.

هـ- القيادة والعمل على الآلات:

من المستبعد أن يكون له أي تأثير على القدرة على القيادة أو العمل

على الآلات.

التأثيرات الجانبية المحتملة

توقف عن استخدام بانادول أدفانس واستشر طبيبك فوراً في حال:

- حدوث ردود فعل حساسية مثل الطفح الجلدي أو الحكة،

وأحياناً مشاكل في التنفس أو تورم في الشفتين واللسان والحلق

أو الوجه.

- في حال نماني من الودمة الوعائية أو متلازمة ستيفن جونسون،

حدوث طفح جلدي أو تقشير أو تقرحات في الفم.

- واجهت مسبقاً مشاكل في التنفس أو تشنج قهصي مع تناول

الأسبيرين أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، وحدث ردة

فعل مشابهة مع هذا المنتج.

- ظهور كدمات غير مبررة أو نزيف.

- قصور في وظيفة الكبد أو أي أعراض أو علامات مرتبطة بذلك.

هذه التأثيرات الجانبية لا تحدث سوى نادراً جداً.

الجرعة المفرطة

إن تناول جرعة مفرطة من الباراسيتامول قد يؤدي إلى تلف الكبد

حتى وإن لم تظهر أعراض الجرعة المفرطة. يتطلب اتخاذ تدابير

طبية فورية في حالة الجرعة المفرطة، حتى وإن لم تظهر أعراض

الجرعة المفرطة.

في حالة تناول جرعات مفرطة عالية تتجاوز ١٠ غرام من

باراسيتامول قد يسبب تلف الكبد. والأعراض المبكرة قد تشمل

الشحوب، والغثيان، والقيء، (التمرق الغزير) والوعكة العامة.

الأعراض السريرية والمخبرية لتلف الكبد قد لا تكون واضحة إلا

بعد ٤٨ إلى ٧٢ ساعة عقب الابتلاع، حتى في حال عدم ظهور

الأعراض ينبغي أن تعالج الجرعة المفرطة فوراً عن طريق غسل

المعدة يليها إعطاء الترياق إن-أسيتيل - سيستايين أو ميثيونين

بالوريد دون انتظار نتائج مستويات الباراسيتامول في البلازما.

يجب توفير تدابير داعمة، عادة يجب إعطاء ترياق إضليل لتفادي

مستويات الباراسيتامول المرتفعة في البلازما والوقت المنقضي بعد

التسمم. في جميع الحالات التي يشتبه فيها تناول جرعة مفرطة،

تكون العناية الطبية العاجلة أمراً حاسماً للكبار وكذلك للأطفال.

حتى وإن لم تلاحظ أية علامات أو أعراض.

كيف يحفظ بانادول أدفانس؟

يحفظ في درجة حرارة أقل من ٣٠ درجة مئوية.

يحفظ في العبوة الأصلية بعيداً عن الضوء والحرارة.

هذا المنتج محمي في بطور مختومة. لا تتناوله إذا كان هناك تلف في

البثور.

هذا منتج دوائي

• الدواء هو منتج له تأثير على صحتك، و تناوله بشكل مفاير للتعليمات قد يعرضك للخطر.

• اتبع وصفة الطبيب بدقة وكذلك إرشادات الاستعمال المطبوعة لك من الصيدلي.

• إن الطبيب والصيدلي كلاهما خبيرين في الأدوية و فوائدها و مخاطرها.

• لا توقف فترة العلاج المحددة في الوصفة الطبية من تلقاء نفسك.

• لا تكرر نفس الوصفة من دون استشارة طبيبك.

احفظ الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب
 واتحاد الصيدلة العرب

للإبلاغ عن أي تأثيرات سلبية أو جانبية مرتبطة بأي منتج من منتجات جلاكسو سميث كلاين، يرجى الاتصال بنا على: contactus-me@gsk.com

بانادول TM علامة مسجلة لمجموعة شركات جلاكسو سميث كلاين.

صنع من قبل جلاكسو سميث كلاين دنجارفان ليميتد، أيرلندا.

Knockbrack, Dungarvan, Co. Waterford, Ireland

gsk GlaxoSmithKline

تم التحديث على أساس GDS V3، تاريخ مراجعة النشرة: أكتوبر ٢٠١٤