



Airtal Difucrem 1.5%

Crème Acéclofénac

Composition par 100 g de crème:

Acéclofénac (DCI).....1,5g
Excipients: cire émulsifiante 10g; paraffine liquide 4g; parahydroxybenzoate de méthyle 0.2g; parahydroxybenzoate de propyle 0.05g; eau purifiée q.s.

Forme pharmaceutique et contenu

Crème à usage topique. Tube de 60 g de crème (1,5%).

Propriétés

L'acéclofénac possède une activité analgésique, anti-inflammatoire et antirhumatique. L'administration d'acéclofénac sous forme de crème permet le traitement local des processus douloureux et inflammatoires.

Indications

Tous types de processus douloureux et inflammatoires locaux, compris les traumatismes et les pathologies inflammatoires musculo-squelettiques aiguës ou chroniques, telles que tendinite, tenosynovite, entorse, luxations, périarthrite, distensions, lumbago et torticolis.

Contre-indications

Ne pas administrer aux patients souffrant d'hypersensibilité à l'acéclofénac ou à d'autres anti-inflammatoires non stéroïdes, compris l'acide acétyl-salicylique.

Précautions d'emploi

Ne pas appliquer sur les yeux, les muqueuses ou les blessures ouvertes. Ne pas l'utiliser si la zone d'application présente une irritation cutanée. En cas d'hypersensibilité suspendre le traitement.

Interactions

On ne connaît pas d'interactions de l'Airtal Difucrem avec d'autres médicaments.

Mises en garde

Grossesse et allaitement

Son utilisation n'est pas recommandée pour les femmes enceintes ou qui allaitent, car sa sécurité n'est pas bien définie.

Effets sur l'aptitude à conduire

L'application d'Airtal Difucrem ne diminue pas cette capacité.

Utilisation chez les sujets âgés

Le traitement à l'Airtal Difucrem n'exige pas de précautions spéciales.

Utilisation chez les enfants

Les doses ou les indications recommandées pour les enfants n'ont pas encore été définies.

Posologie et mode d'emploi

Appliquer par voie topique en massant légèrement la zone affectée avec 1,5 à 2 g de crème trois fois par jour, en fonction de l'extension de cette zone.

Surdosage

Ne s'est pas présenté jusqu'à présent. En cas d'ingestion massive accidentelle, traiter au point de vue symptomatique.

Effets indésirables

Il peut se produire dans certains cas une irritation légère ou modérée, des rougeurs ou des démangeaisons qui disparaissent avec l'interruption du traitement. Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien.

Durée de conservation

Ce médicament ne doit pas être utilisé après la date de péremption figurant sur la boîte.

Autres présentations

Airtal Comprimés: Boîtes de 10, 20, 40 et 100 comprimés.

Airtal Injectable: Boîte de 4 flacons lyophilisés et 4 ampoules de solvant.

Ni toutes les présentations ni toutes les formes pharmaceutiques sont disponibles dans tous les marchés.

Sur ordonnance médicale

Garder hors de portée des enfants

Fabricant

Almirall Hermal GmbH
Reinbek, Allemagne



Almirall, S.A. 08022 Barcelona (España / Spain / Espagne)