

براكسيلين® 200 ملغ

أوكسالات هيدروجين النفثيدروفوريل أقراص مغلقة

التركيب

يحتوي كل قرص مغلف من براكسيلين 200 ملغ على 200 ملغ من أوكسالات هيدروجين النفثيدروفوريل كمادة فعالة. سواغات: أودراجيت RSPO، كومبريتول 888، لكتوز، تالك، ستيرات المغنيزيوم، أودراجيت NE 30 D، هيبروميلوز، ماكروغول 4000.

الخصائص

براكسيلين دواء موسَّع للأوعية ومضاد إقفاري.

حالات الاستعمال

يستعمل هذا الدواء لعلاج أعراض:

- مرض الانسداد الشرياني المحيطي في الطور الثاني (مرض شرايين الساقين المؤدي إلى تشنجات مؤلمة عند السير على الأقدام)،
- اضطرابات دماغية وعائية صغيرة عائدة إلى التقدّم في السن،
- متلازمة رينو (تشنجات الشرايين الصغيرة، وبنوع خاص في أصابع اليدين والقدمين).

حالات منع الاستعمال

لا يجوز استعمال براكسيلين لدى المرضى الذين يعانون من:

- حساسية مفرطة تجاه النفثيدروفوريل أو أي من المسوّغات،
- سوابق لتواجد أجسام بلورية للأوكسالات في البول،
- سوابق حساسة كلوية معاودة محتوية على كلسيوم.

الحمل والإرضاع

يستعمل براكسيلين بصورة رئيسية لدى الأشخاص المسنّين. ليس هناك برهان كاف عن سلامة براكسيلين لدى المرأة الحامل. بالتالي ينصح بعدم استعمال براكسيلين لدى المرأة الحامل. وليس هناك معلومات متوفرة فيما يخص النساء المرضعات. لا يجوز إذا استعمال براكسيلين لدى النساء المرضعات.

تحذيرات واحتياطات خاصة

قد يؤدي تناول براكسيلين دون شرب سائل ساعة النوم أو قبل التمدد الى جرح البلعوم. بالتالي يجب دائماً بلع الأقراص مع كأس ماء كبيرة.

يحتوي هذا الدواء على 38 ملغ من الأوكسالات في كل قرص معيار عند 200 ملغ. احتواء الدواء على أوكسالات قد يعدل البول ويزيد خطر الحصى الكلوية. بالتالي يوصى بشرب الكثير من الماء طوال فترة العلاج من أجل الحفاظ على مستوى إباله ملائم. نظراً لاحتواء براكسيلين 200 ملغ أقراص مغلقة على لكتوز، لا يجوز استعماله في حال الغلكتوسيمية الخلقية، أو متلازمة سوء امتصاص الغلوكوز والغلكتوز، أو نقص اللكتاز.

التأثير على الأهلية لقيادة السيارات واستخدام الآلات

ليس هناك معلومات متوفرة عن تأثير براكسيلين على الأهلية لقيادة السيارات واستخدام الآلات.

استثنائي:

-اضطرابات معدية معوية (إسهال، غثيان، تقيؤ، وجع في المعدة)؛
-طفح جلدي؛

التأثيرات غير المرغوبة

مثل كل الأدوية، قد ينجم عن تناول براكسيلين بعض التأثيرات الجانبية، حتى ولو أن ذلك لا يحصل لدى كل شخص يتناوله. سجلت التأثيرات غير المرغوبة التالية في دراسات سريرية أو معالجة المرضى الروتينية:

نادر: التهاب كبدي؛

نادر جداً: حساسة كلوية محتوية على أوكسالات الكلسيوم؛

لدى بعض المرضى القليلين الذين تناولوا براكسيلين دون شرب سائل، صعوبة في البلع ناتجة عن التهاب موضعي للبلعوم.

المريض إعلام الطبيب بكل تأثير غير مرغوب أو مزعج. لتفادي ردود الفعل الخطيرة، على المريض إشعار الطبيب على الفور في حال حصول تأثير حاد غير مرغوب أو مفاجئ أو متفاقم بسرعة.

التفاعلات مع أدوية أخرى

بصورة عامة، على المريض مراجعة الطبيب إذا كان يتناول أو تناول حديثاً دواء آخر، بما في ذلك الأدوية التي يمكن الحصول عليها بدون وصفة طبية.

في حال الجرعة المنسية، يجب تناول الجرعة التالية في موعدها المعتاد. لا يجوز تناول جرعة مضاعفة من براكسيلين.

المقادير وطريقة الاستعمال

قرص واحد مرتين أو ثلاث مرات في اليوم.
تبلع الأقراص أثناء وجبات الطعام دون قضمها ودائماً مع كأس ماء كبيرة.

الجرعة المفرطة

قد يحصل انخفاض في التوصيل القلبي، ارتباك، اختلاجات. في حال الجرعة المفرطة، يجب إفراغ المعدة بواسطة الغسل المعدي والإقياء. بالإمكان إعطاء المريض فحماً مفعلاً عند الاقتضاء. يجب مراقبة الوظيفة القلبية الوعائية وبالإمكان التفكير في إعطاء علاج أعراض. يمكن معالجة الاختلاجات بواسطة الديازيبام.