

بروفين®

إيبوبروفين

إسم المستحضر الدوائي
بروفين ٤٠٠ ملجم أقراص
بروفين ٦٠٠ ملجم أقراص
بروفين ريتارد أقراص
بروفين شراب

التركيب
بروفين ٤٠٠ ملجم : يحتوي كل قرص على ٤٠٠ ملجم إيبوبروفين BP
بروفين ٦٠٠ ملجم : يحتوي كل قرص على ٦٠٠ ملجم إيبوبروفين BP
بروفين ريتارد : يحتوي كل قرص على ٨٠٠ ملجم إيبوبروفين BP
بروفين شراب : يحتوي كل ملعقة صغيرة (٥ مل) على ١٠٠ ملجم إيبوبروفين BP
الشفط المائي
بروفين ٤٠٠ و ٦٠٠ ملجم : أقراص غنية بجليم
بروفين ريتارد : أقراص صلبة المتصلب
بروفين شراب : شراب معلق بلون وطعم البرتقال.

الخصائص الطبية

الاستعمالات
يوصى باستخدام بروفين للإسبابة من تأثيراته المزيلة للألم والمضادة للإلتهاب في معالجة الروماتويد العنقي (وهذا يتضمن الروماتويد العنقي بالتهابي أو داء ستيل)، التهاب العنق التصلبي، التهاب العنقي العنقي والإعتلالات المصطنعة غير اليرقانوية (سلبية الحمل).

في معالجة الحالات الآتية يوصى بزيادة غير المصطنعة، ويوصى باستخدام بروفين في معالجة الإصابات حول المصطنعة، مثل حالة التهاب المفاصل (التهاب المصطنع)، التهاب الجراب، التهاب الأوتار المصطنعة، التهاب عمود الفقر، وآلام أسفل الظهر، كما يمكن استخدام بروفين لمعالجة إصابات الأوتار والأنسجة الرخوة كالإلتقادات.

ويوصى أيضا باستخدام بروفين لتأثيراته المزيلة للألم في معالجة الآلام الطفولة والمعتدلة الشدة كما في حالات حسر العنق، ألم الأسنان والآلام التالي للجراحة ولزلازل العنق الصداع فيما فيها الصداع النصفي.

بروفين شراب: يستعمل بروفين شراب على المدى القصير لعلاج الحمى عند الأطفال الذين يزيد عمرهم عن عام.

طريقة الاستعمال

البالغون
أقراص، بروفين ٤٠٠ ملجم و ٦٠٠ ملجم: يبلغ مقدار جرعة بروفين الموسمي بما ١٢٠٠-١٨٠٠ ملجم يومياً تقسم على جرعات، مفضلة قد يكون مقدار ٦٠٠ - ١٢٠٠ ملجم يومياً كإثباتا ليعنى المرضي في الحالات الشديدة أو الحادة قد يكون من المفيد زيادة الجرعة إلى أن يتم السيطرة على الحالة. على ألا تتجاوز الجرعة اليومية مقدار ٢٤٠٠ ملجم على جرعات مفضلة.

بروفين ريتارد: الرصاص يوزن معاً كجرعة واحدة يومياً، ويفضل أن يتم تناولها مع وجبة قبل الذهاب إلى النوم بحيث تكاف في الحالات الشديدة أو الحادة، يمكن زيادة الجرعة اليومية الكلية إلى ثلاث أقراص تقسم على جرعتين متساويتين.

ملاحظة: لا يوصى بإعطاء بروفين ريتارد للأطفال الذين يقل عمرهم عن ١٢ سنة.

المسنون
لا توجد توصيات خاصة على الجرعة إلا في حالات إضراب وظائف الكلية أو الكبد حيث يجب تعديل الجرعة حسب كل حالة.

الأطفال
بروفين شراب: يبلغ مقدار الجرعة اليومية ٧٠ ملجم/كجم من وزن الجسم تقسم على جرعات مفضلة ويمكن تحقيق ذلك على النحو التالي:

٢-٣ سنة : ٢.٥ مل (ملجم ٥٠) ٣-٤ مرات في اليوم
٣-٦ سنوات : ٥ مل (ملجم ١٠٠) ٣-٤ مرات في اليوم
٦-٨ سنة : ٥ مل (ملجم ٢٠٠) ٣-٤ مرات في اليوم

لا يوصى بإعطاء بروفين للأطفال الذين ينقص وزنهم عن ٧ كجم

في حالات الروماتويد العنقي الشبابي، يعطى مقدار لا يتجاوز ٤٠ ملجم/كجم من الوزن على جرعات مفضلة.

موانع الاستعمال

المرضى المصابون بحرقنة شديدة شدة أو الذين أصيبوا سابقاً بها. المرضى الذين ظهرت لديهم سابقاً حساسية مفرطة (كالإسبابة محاللة، الربو أو الحكة الشديدة) عند تناول الإيبوبروفين، أو الأفيون أو مضادات الإلتهاب غير الستيرويدية القصور الشديدة في عمل القلب

المحاذير والأحتمالات الواجب اتخاذها

يمكن تقليل الآثار الجانبية باستخدام أقل جرعة فعالة لازمة لعلاج الأعراض وذلك لأقل مدة ممكنة. يجب توخي الحذر عند إعطاء بروفين لمرضى يعانون أو سبق لهم المعاناة من الربو نظراً لحدوث تظاهرات ذكر فيها الحساسية للبروفين. يجب تجنب تناول بروفين مع مسكنات الألم الأخرى كالكودين والبارالدين.

يجب توخي الحذر لدى المرضى المصابين بإضطرابات في وظائف الكلية أو الكبد أو القلب لأن استعمال مضادات الإلتهاب غير الستيرويدية قد يؤدي إلى تدهور وظائف الكلية ويجب الإبقاء على الجرعة في حدها الأدنى ما أمكن ذلك. مع مراقبة وظائف الكلية لدى هؤلاء المرضى.

يجب إعطاء بروفين بحذر للمرضى الذين يعانون من قصور في عمل القلب أو من ارتفاع ضغط الدم نظراً لحدوث تظاهرات باربعها حدوث الأديوما مع إعطاء الإيبوبروفين.

التفاعلات الدوائية المحتملة
التي عالجها أو عالجها مع الأدوية المضادة للحموضة، يجب تجنب تناول بروفين مع مضادات الإلتهاب غير الستيرويدية قد تؤدي إلى تفاقم حالة القصور الكلوي، وتتضمن من معدل الخصية الكلوية ورفع من مستويات الطليكويد الغلوبين في المصل.

الألم، ينقص معدل إخراج الدواء من الجسم.

ميثوتريكسات، ينقص معدل إخراج ميثوتريكسات من الجسم.

سيكلوسبورين: يزيد من احتمال حدوث القصور الكلوي الذي تعدله مضادات الإلتهاب غير الستيرويدية.

الستيرويدات، يجب عدم استعمال مضادات الإلتهاب غير الستيرويدية قبل ٨ - ١٢ يوماً على إعطاء ميثوتريكسات، لأن مضادات الإلتهاب غير الستيرويدية تنقص من تأثيرات ميثوتريكسات.

مضادات الألم الأخرى: تجنب تناول نوعين أو أكثر من مضادات الإلتهاب غير الستيرويدية.

الكورتيكوستيرويدات: يزيد احتمال حدوث النزف، الهضبة.

مضادات التخثر: يزيد من تأثير مضادات التخثر.

المضادات الحيوية: من زيادة الكوليسترول، أشارت الدراسات السابقة من الدراسات السريرية على الموانع أن مضادات الإلتهاب غير الستيرويدية تسبب أن تزيد من احتمال حدوث التخثرات المرتبطة باستخدام المضادات الحيوية من زمره الكوليسترول. المرضى الذين يتناولون مضادات الإلتهاب غير الستيرويدية مع الكوليسترول: قد يكون أكثر عرضة للإصابة بالتخثرات.

الحمل والإرضاع

في حين لم تظهر آثاراً سامة للأجنة في الدراسات السمية المصنفة على الحيوانات، إلا أنه من الواجب تجنب استعمال الإيبوبروفين أثناء الحمل إذا أمكن. ذكرت التقارير حدوث التخثرات العنقية لدى الإنسان بالإشتراك مع تناول الإيبوبروفين، وعلى أية حال، فهذه التخثرات عادة الحدوث ولا تفسح لأي علاقة واضحة. أما فيما يتعلق بالتأثيرات المعروفة لمضادات الإلتهاب غير الستيرويدية على الجهاز القلبي الوعائي للجنين (زيادة القناة الشريانية)، فمنها يجب تجنب استعمالها في الثلث المتأخر من الحمل. في الدراسات السريرية المدونة المتوفرة حتى الآن، يبدو أن للتأثيرات المحتملة على الأجنة المرضية بتركيزات شديدة الانخفاض ويبدو أن احتمال تأثيره السمي على الطفل الرضيع ضئيل.

التأثير على إمكانية الإخصاب واستخدام الألبان.

لا توجد تأثيرات عكسية معروفة.

التأثيرات الجانبية

التأثيرات المصنفة معظم التأثيرات العكسية الملاحظة ذات طوعية عشوائية. وقد ذكرت التقارير حدوثها بعد تناول الإيبوبروفين وهي: القيء، الغث، الإسهال، حسر الهضم، ألم البطن، البراز الأسود، الحمى الدورية، إلتهاب الدم القلبي، النزف، الهضبة، أما التأثيرات العكسية المعروفة فقد لوحظت بمعدل أقل من سابقها وهي: إلتهاب، الصداع، القرحة الإثنية، عينية، قرحة المعدة، حدوث إلتهاب في الجهاز الهضمي، تغير المعومات إلى أنه من بين مضادات الإلتهاب السامة، غير الستيرويدية وغير الأفيون، الأكثر استعمالاً فإن الإيبوبروفين يعد أقلها احتمالاً لحدوث تسببها في الجهاز الهضمي من الجهاز الهضمي.

الحساسية المفرطة ذكرت لتقارير حدوث حساسية مفرطة بعد العلاج بالإيبوبروفين. وهذه التأثيرات قد تتأخر عن حدوثها، إرتفاع ضغط الدم وقصور في عمل القلب، عند استعمال مضادات الإلتهاب تتشعب في الربو، إلتهاب الربو، التشنج القصبي أو صعوبة التنفس، أو (ج) إضرابات جلدية مختلفة وتتصل طبعاً بحدوث حساسية الأشكال، الحكة، الحرق، القرضية، الحزب الوعائي، ودرجة أقل شوعاً إلتهاب الجلد الفقاعي (ويشمل الإلتهاب المائي للبشرة والسما، متعدد الأشكال).

التأثيرات الكلوية الوعائية: وردت تقارير تفيد بعد واثق أيضاً عند استعمال الإيبوبروفين. كما وردت تقارير عن حدوث أديوما، إرتفاع ضغط الدم وقصور في عمل القلب، عند استعمال مضادات الإلتهاب غير الستيرويدية. وقد وردت دراسات طبية أن استعمال إيبوبروفين، خاصة بجرعة كبيرة (٢٤٠٠ ملجم في اليوم، وأمدت حويلة في حالات: جلطة الشرايين (مثل إلتهاب عضلة القلب والسكتة القلبية).

تشمل التأثيرات العكسية الأخرى التي ذكرت التقارير حدوثها بدرجة أقل شوعاً والتي ما ثبت علاقتها السببية بالضرورة بتناول الإيبوبروفين ما يلي:

التأثيرات الكلوية: نقص الكلوي بأشكال مختلفة. ومنها إلتهاب الكلية العنقية، التلازمة الكلوية والقصور الكلوي.

التأثيرات الكبدية: وظائف كبدية غير طبيعية، إلتهاب الكبد واليرقان.

التأثيرات العينية والتأثير على الأوعية الخاصة: إضرابات في الرؤية، إلتهاب العصب البصري، الصداع، تشوش المرء، الإكتئاب، الإرتعاش، الطفولة، الطفون، الدوار، الدوخة، التنب العام، الضلال، والوهة.

التأثيرات الدموية: نقص الصفائح، نقص كريات الدم البيضاء، نقص شديد في كريات الدم البيضاء الصمبة، فقر الدم الانحامي وفقر الدم الانحلالي.

التأثيرات الطفوية: الحساسية للضوء

الجرعات المتزايدة
تشمل أعراض زيادة الجرعة التقيان، القز، البوخة وتنادرو ما يحدث الغياب عن الوعي، ويشكل عام فإن تجاوز الجرعة وكثيراً ما تكون شديداً تتصلب بصورة جيدة عندما لا تتشارك أدوية أخرى في الأمر. يشمل العلاج غسل المعدة، مع اللجوء إلى تصحيح الإلكتروليتات في المصل والمعالجات الداعمة المناسبة إذا لزم الأمر. لا يوجد ترياق خاص للإيبوبروفين.

معلومات صيدلانية

عدم التوافق

لا يوجد.

تعليمات التخزين

بروفين أقراص : يحفظ في مكان جاف، على درجة حرارة أقل من ٢٥°م
بروفين شراب : يحفظ على درجة حرارة أقل من ٢٥°م، بعيداً عن الضوء.

المعدية

يتوفر هذا الدواء في العبوات التالية:
بروفين ٤٠٠ ملجم أقراص : ٣٠ / ٢٥ / ٢٠ / ١٥ / ١٠ / ٥
بروفين ٦٠٠ ملجم أقراص : ٣٠ / ٢٥ / ٢٠ / ١٥ / ١٠ / ٥
بروفين ريتارد أقراص : ٣٠ / ٢٥ / ٢٠ / ١٥ / ١٠ / ٥
بروفين شراب : زجاجات تحتوي على ١٠٠ مل مع ملعقة خاصة للإعطاء.

قد لا تتوفر جميع الأحجام.

إن هذا دواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحته، وإستخدامه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- أنتج بدقة وصفاً طبيه وطريقة الإستعمال والنحوص عليها والتعليمات الصيدلي الذي وصفها لك.
- الطبيب والصيدلي هما الصيوان في الدواء وفي تقعه وشربه.
- لا تطبخ مدة العلاج المصنفة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

لا تفرق الأدوية في متناول أيدي الأطفال

نوزيب فارما لين - لبنان
بإجازة من أبوت أيبورتوز ليند - المملكة المتحدة
مجلس وزراء الصحة العرب
ولتزام الصناديق العرب

