

- اقرأ هذه النشرة بأكملها بعناية قبل أن تبدأ في استعمال هذا الدواء
- احتفظ بهذه النشرة. فقد تحتاج إلى قرائتها مرة أخرى.
 - إذا كانت لديك أسئلة أخرى، فنرجو أن تسأل طبيبك أو الصيدلي الذي تتعامل معه.
 - لقد وصف هذا الدواء لك شخصياً ويجب ألا تعطيه لأشخاص آخرين. فقد يؤذن لهم، حتى ولو كانت أعراضهم مماثلة لأعراضك.
 - قم بالإتصال بطبيبك المعالج أو الصيدلي في حال زيادة حدة الأعراض الجانبية أو الاصابة بعرض جانبي لم يتم ذكره في هذه النشرة

AVONEX® 30 µg/0,5 ml إنترفيرون بيتا-1أ

النشرة المرفقة بالعبوة

أفونيكس 30 ميكروغرام / 0.5 ملليلتر
(إنترفيرون بيتا-1أ)
 محلول للحقن

في هذه النشرة:

1. ما هو أفونيكس AVONEX ولماذا يستخدم
2. قبل أن تستخدم أفونيكس
3. كيف تستخدم أفونيكس
4. الآثار الجانبية الممكنة
5. تخزين أفونيكس
6. مزيد من المعلومات

اسم هذا الدواء هو أفونيكس 30 ميكروغرام / 0.5 مل محلول للحقن إنترفيرون بيتا-1أ.

كل محقن 0.5 مل معبأ مسبقاً بمحلول الحقن أفونيكس يحتوي على 30 ميكروغرام (6 ملايين وحدة دولية) من المادة الفعالة إنترفيرون بيتا-1أ.

والمكونات الأخرى هي: ثلاثي هيدرات أسيتات الصوديوم؛ حامض أسيتيك الجليدي؛ هيدروكلورايد الأرجينين، بولي سوربات 20، ماء للحقن.

الشركة المرخص لها بالتسويق:

شركة بيوجين آيديك المحدودة
Biogen Idec Limited

Innovation House
70 Norden Road
Maidenhead, Berkshire, SL6 4AY
المملكة المتحدة

الشركة الصانعة:

شركة بيوجين آيديك

Hillerød

DK-3400

данмарك

Biogen Idec Denmark Manufacturing ApS

1. ما هو أفونيكس ولماذا يستخدم؟

يتوفر أفونيكس على شكل محلول جاهز للاستعمال في الحقن. تحتوي كل علبة من أفونيكس على أربع حقن معبأة مسبقاً، كل منها يحتوي على 0.5 مل من محلول صاف عديم اللون. وكل محقن مغلف ضمن حامل

بلاستيكي محكم الإغلاق، يحتوي أيضاً على إبرة واحدة للحقن في العضل.

ينتمي إنترفيرون بيتا-1أ إلى مجموعة من المواد التي تساعد على تنظيم نظام المناعة في جسمك.

ويستخدم أفونيكس في معالجة الأنماط المختلطة من التصلب المتعدد MS. وتحت الاختلاص حينما تحدث أعراض التصلب المتعدد ثم تتحسن أو تزول. وقد ثبت أن أفونيكس فعال في إبطاء تقدم المرض وتقليل وتيرة تكرار الانتكاسات.

كما يمكن أن يستخدم أفونيكس أيضاً إذا حدثت لك الآثار المحتملة للتصلب المتعدد مرة واحدة فقط، ولكن طبيبك يعتبر أنك ستصاب بالتصلب المتعدد.

الصرع أو غيره من النوبات التشنجية التي لا تسيطر عليها الأدوية
مشكلات خطيرة في الكلى أو الكبد
اضطراب في نخاع العظام، قد يسبب زيادة خطر حدوث التهابات
أو نزف أو أنيميا (فقر الدم)
مشكلات في القلب، قد تسبب أعراضًا مثل ألم في الصدر (ذبحة
صدرية) خصوصاً بعد أي نشاط، أو لديك تورم في الكاحل، أو
ضيق في التنفس (قصور القلب الاحتقاني)، أو عدم انتظام النبض
(اضطرابات ضربات القلب).

ينبغي أن تبلغ الطبيب فوراً عن أي تقلبات في مزاجك، وعن الأفكار
التي تراودك بالانتحار، وعن أي شعور غير عادي بالحزن أو القلق
أو عدم الفائدة

2. قبل أن تستخدم أفونيكس

لا تستعمل أفونيكس إذا كان أي مما يلي ينطبق عليك:

- إذا كنت مصاباً بحساسية لإنترفيرون بيتاً أو لأي من المكونات الأخرى في أفونيكس.
- إذا كنت مصاباً باكتتاب شديد أو تفكير في الانتحار.

لا تبدئي باستعمال أفونيكس إذا كنت حاملاً (للنساء).

توكِّ العناية والحرص بصفة خاصة عند استعمال أفونيكس إذا كنت تشكو اليوم، أو سبق أن كنت تشكو، مما يلي:

- الاكتتاب أو المشكلات المماثلة التي تؤثر على أحوالك المزاجية
- تراودك أفكار بالانتحار

الحمل والإرضاع بالثدي:

- (النساء) لا تبدئي باستعمال أفونيكس إذا كنت حاملاً.
- إذا كنت في سن الإنجاب، يجب أن تستعمل وسيلة ملائمة لمنع الحمل أثناء تناولك أفونيكس.
- إذا كنت تخططين لإنجاب طفل أو لتصبحي حاملاً أثناء استعمال أفونيكس، يجب أن تستشيري طبيبك. وبإمكانك أنت والطبيب أن تناقشما إذا كان عليك متابعة العلاج أو إيقافه.
- إذا كنت تريدين أن ترضعي طفلك من الثدي، تحدثي أولاً إلى طبيبك.

قيادة السيارات واستعمال الألات:

بعض الآثار الجانبية مثل الدوخة/ الدوار، والتي شعر بها بعض

إذا كانت قد حدثت لك أي من الحالات المذكورة أعلاه، استشر طبيبك لأنك قد تحتاج إلى مشورة إضافية أو قد تحتاج إلى متابعة أكثر دقة لحالتك. إذا ساءت أي من الحالات المذكورة أعلاه أثناء استعمالك لأفونيكس، استشر طبيبك فوراً.

إذا كنت تتعاطى حالياً أحد الأدوية التي قد تسبب مشكلات في الكبد، أو كنت تشرب كميات زائدة من الكحول، قد يطلب طبيبك منك إجراء اختبارات للدم للتأكد من أن كبدك مازال يؤدي وظائفه جيداً.

إذا كان عليك أن تزور المستشفى أو طبيب الأسرة لأي علاج أو فحص للدم، تذكر أن تخبر مسؤول الرعاية الصحية/ الطبيب بأنك تتناول أفونيكس حيث أنه قد يؤثر على نتائج تلك الفحوص.

يجب ألا يستعمل أفونيكس للأطفال تحت سن 12 سنة.

تقلل الأدوية الأخرى المحتوية على الإنترفيرون من قدرة الجسم على التخلص من بعض تلك الأدوية، مما قد ينجم عنه زيادة خطر التعرض لتأثيرات جانبية. ومن الممكن أن يكون لأفونيكس تأثير مماثل.

يرجى إبلاغ طبيبك أو الصيدلي الذي تتعامل معه إذا كنت تتناول، أو تناولت مؤخراً، أية أدوية أخرى بما فيها الأدوية التي تؤخذ بدون وصفة طبية، أو أدوية الأعشاب.

يجب تناول أفونيكس وحده؛ لا تخلطه مع سوائل أخرى معدة للحقن.

معلومات مهمة عن بعض مكونات أفونيكس:

هذا الدواء يعتبر خالياً من الصوديوم تقريباً. فهو يحتوي على أقل من 23 ملغ (1 ملي مول) من الصوديوم في كل جرعة أسبوعية.

المرضى الذين يستخدمون هذا الدواء، قد تؤثر على القدرة على قيادة السيارات وتشغيل الآلات. إذا تأثرت وشعرت بأن قدرتك قد تضعف، يجب تجنب القيادة أو استعمال الآلات.

تناول أدوية أخرى:

لم تجر أبحاث رسمية عن التفاعلات الدوائية مع أفونيكس لدى البشر ولكن التجارب تشير إلى أن أفونيكس لا يتدخل عادة مع الأدوية الأخرى. وقد أشارت الدراسات السريرية بصفة خاصة إلى أن مرضي التصلب المتعدد يمكن أن يتم إعطاؤهم أفونيكس والإكورتيكوسستيرويدات corticosteroids أو الهرمون المُوجّه لقشرة الكظر (ACTH) (وهو علاج يستخدم لتقليل الالتهابات) أثناء انتكاسات التصلب المتعدد. استشر طبيبك إذا كنت تتعاطى أي دواء لعلاج الصرع أو الاكتئاب. قد

3. كيف تستخدم أفونيكس

يجب عدم استعمال هذا الدواء إلا تحت إشراف دقيق من أحد الأطباء. استخدم أفونيكس دائماً حسب تعليمات طبيبك بالضبط. يجب أن تراجع طبيبك أو الصيدلي الذي تتعامل معه إذا كنت غير متيقن.

الجرعة:

للبالغين والراهقين (في سن 12 سنة وما فوق): الجرعة المعتادة من أفونيكس هي محتويات محقنة مملوقة جاهزة (0.5 مل) أي ما يعادل 30 ميكروграмм (6 مليون وحدة دولية) من إنترفيرتون بيتا - 1، حيث يتم حقنها مرة في الأسبوع. ويجب استعمال هذا الدواء في نفس الوقت من نفس اليوم في كل أسبوع.

للاطفال: يجب ألا يستعمل أفونيكس للأطفال تحت عمر 12 سنة.

يحتوي كل محقن من أفونيكس على جرعة واحدة فقط. أي سائل يتبقى في المحقن بعد الحقن يجب رمييه والتخلص منه.

إذا قررت بدء العلاج بأفونيكس فقد يزودك طبيبك برمزة المعايرة أفسوتارتكليب. يتصل أفسوتارتكليب بالحقن ويمكنك من زيادة جرعتك من أفونيكس بشكل تدريجي عند بدئك بالعلاج. يتم ذلك للحد من الأعراض الشبيهة بأعراض الإنفلونزا التي يختبرها البعض عند بدئهم باستخدام أفونيكس. سيساعدك طبيبك أو ممرضتك في استخدام رزمة معايرة أفسوتارتكليب.

تعليمات للحقن:

يستعمل أفونيكس للحقن في العضل (الاستخدام بالحقن العضلي). ومن المستحسن أن تستخدِم موقعاً مختلفاً للحقن كل أسبوع لتقليل خطر حدوث تهيج في جلدك وعضلاتك. يجب أن تتجنب آية منطقة من الجلد

بها كدمة أو التهاب أو بها جرح مفتوح.

يجب استعمال أفنونيكس حسب إرشادات أحد الأطباء وتحت إشرافه. يجوز أن تحقن نفسك إذا قرر طبيبك أو ممرضة التصلب المتعدد أن ذلك ملائم، وبعد اعطاءك تدريباً مناسباً على الأسلوب الفني للحقن في العضل. نقدم التعليمات التالية للشخص الذي يقوم بحقن أفنونيكس.

إن عبوة أفنونيكس تحتوي سلفاً على إبرة للحقن. من الممكن أن يصف لك الطبيب إبرة أقصر أو أرفع (أقل سماكة)، حسب نوعية جسمك. قم بالتحدث إلى طبيبك لتعرف ما إذا كانت هذه الإبرة ملائمة لك.

محتويات الحامل البلاستيكي

توضح صورة "محتويات الحامل البلاستيكي" جميع المكونات التي تحتاجها لإعطاء جرعة واحدة من أفنونيكس.

محتويات الحامل البلاستيكي



التجهيز

اسحب حاملاً بلاستيكياً واحداً من البراد (جهاز التبريد). تأكّد من أن المحقن المعباً وابرة الحقن هما في الحامل البلاستيكي المغلق قبل أن تتابع العمل. اتركهما عند حرارة الغرفة (15 إلى 30 درجة مئوية) لحوالي 30 دقيقة، لأن ذلك يجعل الحقن أكثر راحة من الحقن مباشرة بعد سحبهما من الثلاجة.


لا تستعمل مصادر حرارة خارجية، مثل الماء الساخن، لتسخين مجلول الحقن.

اغسل يديك واستخدم سطحاً نظيفاً وصلباً لوضع الأشياء الازمة لاستعمال الحقنة. جهز ماسحات قطنية مبللة بالكحول ولاصقات الجروح (غير مقدمة ضمن العبوة) إذا كان طبيبك أو ممرضة التصلب المتعدد قد نصّحاك باستخدامها.

الحقن

قم بتحقق من المحلول. يجب أن يكون صافياً وعديم اللون. إذا كان المحلول ملوناً أو إذا كانت هناك حبيبات تطفو عليه، يجب عدم استعمال المحقن المعباً مسبقاً.

- 1- المحقن مجهز بغطاء كاشف للعبث (يكشف محاولات الفتح السابقة، إذا حصلت). تأكّد من أن الغطاء مضبوط وسليم وأنه لم يتم فتحه مسبقاً. إذا تبيّن أنه تم فتحه، لا تستعمل ذلك المحقن. أحمل المحقن بحيث يكون الغطاء موجهاً نحو الأعلى. قم بثني الغطاء بزاوية قائمة حتى ينفصل الغطاء عن المحقن.



4- اسحب غطاء إبرة الحقن في خط مستقيم. لا تقم بفتحه أو تدويره.



2- قم بتوصيل إبرة الحقن بالضغط عليها وتدويرها بقوة.



إن إخفاقك في توصيل إبرة الحقن بالمحقن قد يؤدي إلى تسرب محلول للخارج.

5- استعمل يدًا واحدة لتوسيع الجلد حول موقع الحقن (على سبيل المثال، المنطقة في أعلى الفخذ). ولا يُنصح بحقن أفونيكس في الردفين أو المؤخرة. قم بترحية عضلاتك.



3- استعمل ماسحة كحولية لتنظيف الجلد عند أحد المواقع المستحسنة للحقن في العضل، إذا نصحت الطبيب أو نصحتك ممرضة التصلب المتعدد بذلك. دع الجلد يجف.



التخلص من النفايات بطريقة سلية

بمجرد الانتهاء من تناول الحقنة، ضع المحقن وإبرة الحقن في وعاء ملائم مصمم لتخزين الإبر المستعملة بطريقة آمنة (وعاء للأدوات الحادة). يمكن وضع الأوراق المهملة والمساحات المستعملة في سلة عادية للمهملات.

فترة العلاج:

سيخبرك طبيبك عن الفترة التي تحتاج إلى مواصلة تناول هذا العلاج فيها. من المهم الاستمرار في استعمال أفيونيكس بانتظام، وعدم إجراء تغييرات إلا إذا نصحك طبيبك بذلك.

6- أدخل إبرة الحقن بدفعه سريعة مثل السهم بزاوية 90 درجة عبر الجلد نحو العضل. يجب أن تدخل إبرة الحقن بأكملها. الحقن ببطء إلى أن يفرغ المحقن.



7- اسحب إبرة الحقن إلى الخارج فوراً مع إبقاء الجلد موسعاً بقوّة أو اضغط على الجلد حول موقع الحقن. إذا أوصى طبيبك باستخدام ماسحات كحولية، ضع واحدة منها على مكان الحقن. ضع غطاء لاصقاً للجروح على موقع الحقن إن لزم ذلك.



4. الآثار الجانبية الممكنة

كما هو الحال مع سائر الأدوية، يمكن أن تكون لأفونيكس آثار جانبية. أكثر الآثار الجانبية شيوعاً هي أعراض شبيهة بالإإنفلونزا مثل الصداع والحمى والقشعريرة والتعرق وألم وأوجاع العضلات والشعور بالضعف، والإرهاق والغثيان. قد تكون هذه الأعراض أكثر شيوعاً في بداية العلاج ثم تقل مع متابعة الاستعمال. وللمساعدة على تخفيف تلك الأعراض قد يشير طبيبك بتناول دواء لعلاج الألم وارتفاع الحرارة قبل تناول جرعة أفونيكس ثم لمدة 24 ساعة بعد الحقن. استشر طبيبك أو الصيدلي الذي تتعامل معه دائمًا قبل تناول أية أدوية أخرى أثناء استعمالك لأفونيكس. وإذا أوصى بأن تتناول دواء لتخفيف الأعراض الشبيهة بالإإنفلونزا، اتبع النصيحة بعناية: لا تتناول ما يزيد عن الجرعة الموصى بها.

إذا حققت كمية أكبر مما يجب من أفونيكس:

لم ترد تقارير عن أية حالات من الجرعة الزائدة. ومع ذلك، فإذا حققت كمية أكبر مما يجب من أفونيكس، اتصل فوراً بطبيبك أو بالصيدلي الذي تتعامل معه لمزيد من المشورة.

إذا فاتك موعد حقنك الأسبوعية من أفونيكس:

إذا فاتك موعد حقنك الأسبوعية المعتادة، قم بحقن جرعة في أقرب وقت ممكن. ثم انتظر فترة أسبوع بعد ذلك قبل استخدام أفونيكس مرة أخرى. واستمر في الحقن في ذلك اليوم "الجديد" كل أسبوع. لا تضاعف الجرعة لتعويض حقنة فاتتك موعدها.

اضطرابات القلب: خفقان القلب (إحساس بضربات قلبك) أو سرعة أو عدم انتظام في ضربات القلب، أو قصور القلب أو اعتلال عضلة القلب (قد تشمل أعراضه انخفاض القدرة على التمرين أو عدم القدرة على الرقود في وضع مسطح على الفراش أو ضيق التنفس أو تورم الكاحلين).

اضطرابات الأوعية الدموية: أحمرار الوجه

اضطرابات التنفس: "سيلان" الأنف أو صعوبة التنفس

اضطرابات الهضم: تقيؤ، إسهال

اضطرابات الكبد: مشكلات في الكبد تشمل الالتهاب الكبدي والقصور الكبدي (انظر ما يلي لمزيد من المعلومات)

اضطرابات الجلد: زيادة إفراز العرق أو تعرق ليلي أو كدمات أو فقدان الشعر أو طفح (ويشمل طفحا قراسيًا أو شبه النفطات) أو هرش أو تدهور حالة الصدفية

اضطرابات العضلات والمفاصل: تقلص عضلي أو تصلب أو ضعف

قد تحدث نوبة إغماء عقب حقن أفنونيكس، وهي في المعتمد نوبة واحدة تحدث في بداية العلاج ولا تتكرر مع الحقن التالية.

والأثار الجانبية الأخرى الأقل شيوعاً هي:

اضطرابات هرمونية: انخفاض نشاط الغدة الدرقية أو زراعته.

اضطرابات الأيض والتغذية: فقدان الشهية أو زيادة الوزن أو فقدان الوزن.

اضطرابات نفسية: صعوبة النوم، أو الاكتئاب (انظر أيضًا المعلومات الواردة أدناه)، أو العصبية أو القلق أو عدم الاستقرار العاطفي أو أفكار غير منطقية أو هلوسات (رؤيا أو سماع أشياء غير حقيقة) أو الارتباك أو الانتحار.

اضطرابات الجهاز العصبي: التنميل ويشمل تتميلًا أو نحزاً في الجلد، أو دوخة أو تشنجات أو نوبات أو صداعاً نصفيًا.

الأعراض الناجمة عن تلك التغيرات الإرهاق أو نقص القدرة على مقاومة العدوى أو كدمات أو نزف بدون سبب معروف.

هناك احتمال بأن تشعر بتأثيرات مؤقتة عقب الحقن، تشبه انتكاسة لأعراض التصلب المتعدد لديك. قد يشمل ذلك شعورك بتتوتر شديد في عضلاتك أو ضعف شديد فيها، مما يمنعك من الحركة كما ترغب. قد تحدث تلك الإعراض نادراً، في الفترة القريبة من وقت الحقن، وهي لا تستمر طويلاً، ولكنها قد تحدث في أي وقت أثناء العلاج. وفي بعض الحالات ترتبط مع أعراض شبيهة بالإنفلونزا كما وصفت أعلاه.

إذا لاحظت أيّاً من الآثار الجانبية المذكورة أعلاه، استشر طبيبك أو الصيدلي الذي تتعامل معه او ممرضة التصلب المتعدد.

أو تشنج أو آلام؛ آلام في المفاصل أو الظهر أو العنق أو الأطراف (الذراعين والساقيين)؛ التهاب المفاصل أو الذئبة الحمامية *Lupus erythematosus* المُجموَّعة (حالة التهابية تسبب آلاماً وتصلباً في العضلات والمفاصل وأجزاء أخرى من الجسم) **اضطرابات الجهاز التناسلي:** عدم انتظام أو تغيرات في دورتك الشهرية (الحيض)

اضطرابات عمومية ومشاكل موقع الحقن: ردود فعل في موقع الحقن، تشمل احمراراً أو كدمات أو آلاماً أو حرقاناً أو نزفاً (انظر أيضاً المعلومات أدناه)؛ آلم يشمل أوجاع الصدر وشعوراً عاماً بالتوشك **اضطرابات الجهاز المناعي:** تفاعلات الحساسية (انظر أيضاً المعلومات أدناه).

تبين من فحوص الدم وجود انخفاض في عدد كريات الدم الحمراء أو البيضاء أو الصفائح الدموية وتغيرات أخرى متعددة. ويمكن أن تشمل

إذا لاحظت أيَّة تأثيرات جانبية غير مذكورة في هذه النشرة، يُرجى إبلاغ طبيبك أو ممرضة التصلب المتعدد أو الصيدلي الذي تتعامل معه.

إذا لاحظت أيَّاً من الآثار الجانبية التالية، يجب أن تستشير طبيبك فوراً:
إذا شعرت بأيِّ من أعراض الاكتئاب، قم بإبلاغ طبيبك عنها فوراً.

أبلغ طبيبك فوراً إذا شعرت بأيِّ من الأعراض الممكنة التالية لمشكلة في الكبد: اليرقان (قد يظهر جدك أو بياض عينيك مصراً قليلاً) أو تلَهُف للحِكاك في كل مكان أو غثيان أو تقيؤ أو حدوث كدمات بالجلد بسهولة.

تفاعلات الحساسية الخطيرة نادرة. ومن بين الأعراض الممكنة تورم الوجه أو الشفتين أو اللسان، أو صعوبة التنفس أو الطفح الجلدي. إذا حدثت لك هذه الأعراض، اتصل بطبيبك فوراً واطلب عناية طبية عاجلة.

استشر طبيبك أو ممرضة التصلب المتعدد إذا لاحظت أيَّ تهيج أو مشكلات جلدية عقب الحقن.

5. تخزين أفونيكس

احفظه بعيداً عن متناول الأطفال وبعيداً عن نظرهم.
خزن في البراد (جهاز التبريد) عند درجة حرارة بين 2° و 8° مئوية
احفظ الدواء في المحتوى البلاستيكي الأصلي لحمايته من الضوء
يجب عدم تعریضه للتجمد.

يمكن تخزين أفونيكس عند درجة حرارة الغرفة (بين 15° مئوية و
30° مئوية) لمدة أقصاها أسبوع واحد.
لا تستخدمه بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على البطاقة اللاصقة.

لا تستعمل أفونيكس إذا لاحظت ما يلي:

- المحقن المعباً مسبقاً مكسور
- الحامل البلاستيكي المغلق تالف أو مفتوح.
- محلول ملون أو يمكنك رؤية حبيبات تطفو عليه.

- الغطاء الكاشف للعبث مخلوع.

6. مزيد من المعلومات

تتولى شركة بيولوجيكس إف زد مسؤولية توزيع وسلامة الأدوية في
بلدان معينة في الشرق الأوسط.

شركة بيولوجيكس إف زد
المنطقة الحرة في دبي، الطريق
WB 21
المستودع C17، ص ب 54405
الطار، دبي، الإمارات العربية المتحدة

تاریخ مراجعة النشرة الداخلية: أبريل ٢٠١٣

الإبلاغ عن الأعراض الجانبية:

المملكة العربية السعودية:

المركز الوطني للنفاذ والسلامة الدوائية

فاكس: ٠٠٩٦٦١٢١٠٧٣٩٨

البريد الإلكتروني : npc.drug@sfda.gov.sa

الموقع الإلكتروني : www.sfda.gov.sa/npc

دول الخليج الأخرى

الرجاء الاتصال بالمؤسسات والهيئات الوطنية في الدولة

- إنَّ هذَا الدوَاء
- الدوَاء هو منتج يُؤثِّر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتَّعليمات يُشكِّل خطراً عليك.
 - تقِيد تقدِّماً تاماً بوصفة الطَّبِيب وبطريقة الاستعمال وبنَعْليمات الصيَّدلي الذي باعَك الدوَاء.
 - إنَّ الطَّبِيب والصيَّدلي خبيران في الدوَاء ومنافعه ومخاطرِه.
 - لا تُوقِف من تلقِّي نفسك مدة العلاج الموصوفة.
 - لا تكرر الوصفة إِذْ أنتَ بِدون استشارة الطَّبِيب.
 - احْفَظ الدوَاء بعيدها عن متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب
وأتحاد الصيادلة العرب