170 mm

10

٢-٥ الجرعة الفعالة

٢-٥-١ هيلوكوتاين - ٥٠ مجم/٢,٥ مجم لكل قرص مغلف.

هيلوكوتاين - ٥٠ مجم/٥ مجم لكل قرص مغلف.

هيلوكوتاين - ١٠٠ مجم/٢ مجم لكل قرص مغلف.

هيلوكوتاين - ١٠٠ مجم/٥ مجم لكل قرص مغلف.

٢-٥ التركيب الدوائي والكمي

كل قرص مغلف يحتوي على - ٥٠ مجم سيتالوبرام هيدروكلوريد، ما يعادل ٣٠ مجم سيتالوبرام، مع ٢,٥ مجم هيلوكوتاين.

كل قرص مغلف يحتوي على - ٥٠ مجم سيتالوبرام هيدروكلوريد، ما يعادل ٣٠ مجم سيتالوبرام، مع ٥ مجم هيلوكوتاين.

كل قرص مغلف يحتوي على - ١٠٠ مجم سيتالوبرام هيدروكلوريد، ما يعادل ٦٠ مجم سيتالوبرام، مع ٢ مجم هيلوكوتاين.

كل قرص مغلف يحتوي على - ١٠٠ مجم سيتالوبرام هيدروكلوريد، ما يعادل ٦٠ مجم سيتالوبرام، مع ٥ مجم هيلوكوتاين.

سواغ (سواغات) ذو تأثير معروف: لاكتوز.

تحصول على قائمة كاملة من السواغات، انظر النقاط البند ٦-١.

٢-٥-٢ الشكل الصيدلاني

هيلوكوتاين - ٥٠ مجم/٢,٥ مجم لكل قرص مغلف: بيضاوية اللون على شكل كبسولة محددة من الجانبين ومحفور عليها "٢,٥" من جانب واحد.

هيلوكوتاين - ٥٠ مجم/٥ مجم لكل قرص مغلف: مغرات اللون على شكل كبسولة محددة من الجانبين ومحفور عليها "٥" من جانب واحد.

هيلوكوتاين - ١٠٠ مجم/٢ مجم لكل قرص مغلف: بيضاوية الشكل محددة من الجانبين ومحفور عليها "٢" من الجانب الآخر.

هيلوكوتاين - ١٠٠ مجم/٥ مجم لكل قرص مغلف: بيضاوية الشكل محددة من الجانبين ومحفور عليها "٥" من الجانب الآخر.

٣-٥ الاستطبابات العلاجية

٣-٥-١ الاستطبابات الطبية

علاج نوبة الاكتئاب عند البالغين. كبديل لعلاج النوبة الحادة لاضطراب الاكتئاب والجليسيكاليب. يوصى بالجمع بين الأدوية بمستلر وضبوط بشكل جيد.

٣-٥-٢ الجرعة وطريقة الإعطاء

يتم إعطاؤه بالفم.

يمكن تناوله بالطريق الفموي.

لا يتم تقسيم القرص.

يفضل تناوله مرة واحدة في اليوم.

يمكن تناوله سواء خلال سكر الدم، بحيث تعديل الجرعة وفقًا للاستجابة للعلاجية الفردية لنوبة السكر في الدم الخفاف السكري.

الجلايكوجين والكلاك كل طبيعة الشفاء الفموي الكبير - ٢ ساعة / ٤ دقيقة.

٣-٥-٣ العلاج

يجب أن تبدأ العلاج بجرعة من المنتج تركب انخفاض الجرعات الفردية السابقة من الميلوتونين والجليسيكاليب؛ يتم زيادة الجرعة تدريجيًا اعتمادًا على التحكم وفقًا بمعايير تسمية السكر في الدم.

يجب تعديل الجرعة كل أسبوعين أو أكثر، زيادة قدرها قرص واحد حسب نتائج سكر الدم.

قد تساعد الزيادة التدريجية في الجرعة على تحسين الحمل الهضمي ومنع حدوث الغثيان.

الجرعة اليومية القصوى لبولهم بها:

الجرعة اليومية القصوى الموصى بها هي ٨ أقراص من هيلوكوتاين - ٥٠ مجم / ٢,٥ مجم.

الجرعة اليومية القصوى الموصى بها هي ٤ أقراص من هيلوكوتاين - ٥٠ مجم / ٥ مجم في حالات الاكتئاب المقاومة للعلاج.

الجرعة اليومية القصوى الموصى بها هي ٢ أقراص من هيلوكوتاين - ١٠٠ مجم / ٢ مجم.

الجرع مع العلاج بالأسبوعين:

٢ قرص يوميًا، مرة واحدة مع الوجبة، للمرضى الذين لها التجربة مع العلاج بالأسبوعين.

يفضل تناوله مرة واحدة في الصباح الباكر.

يفضل تناوله مرة واحدة في المساء مع الوجبة.

يجب تعديل الجرعة الموصى بها للمرضى الذين لديهم معدل ترشيح كبيبي - ٣٠ دقيقة / دقيقة.

يفضل تناوله مرة واحدة في الصباح مع الوجبة.

يجب تعديل الجرعة الموصى بها للمرضى الذين لديهم معدل ترشيح كبيبي - ٣٠ دقيقة / دقيقة.

٣٠-٥٩ مجم	الجرعة اليومية القصوى ٥٠٠٠ مجم	٢ ساعة بعيدًا عن الجرعة
٢٠-٢٩ مجم	الجرعة اليومية القصوى ٢٠٠٠ مجم	يجب تجنب الجرعة قدر الإمكان
٢٠-٢٩ مجم	الجرعة اليومية القصوى ٢,٥ مجم	يجب تجنب الجرعة
٤٤-٥٩ مجم	الجرعة اليومية القصوى ١٥٠٠ مجم	الجرعة اليومية القصوى ٢,٥ مجم
٥٠ مجم	يجب استعمال الميلوتونين والجليسيكاليب	

تحذير:

يجب تعديل جرعة هيلوكوتاين وفقًا لوظائف الكلى (انظر النقاط البند ٤-٢).

المرضى الذين يعانون من الصمم لا بد أن تأخذ بعين تعديل جرعات الميلوتونين والجليسيكاليب بعناية لتقليل مخاطر نقص السكر في الدم يجب أن يبدأ العلاج بأقل جرعة ممكنة وتتم زيادتها تدريجيًا إذا لزم الأمر (انظر البند ٤-٤).

التفاعلات

يجب استخدام الميلوتونين مع هيلوكوتاين في الطلاق (انظر البند ٤-٥).

الحمل والإرضاع

يجب تجنب هذا الدواء خلال فترة الحمل.

يجب تجنب هذا الدواء خلال فترة الإرضاع.

التأثير على الخصوبة

لا يوجد تأثير على الخصوبة.

التأثيرات على القدرة على القيادة وتشغيل الآلات

لا يؤثر على القدرة على القيادة وتشغيل الآلات.

الآثار الجانبية

الآثار الجانبية الشائعة

الصداع، الدوخة، الغثيان، الإسهال، الأرق، الخمول، الشعور بالنعاس، الشعور بالتعب، الشعور بالجفاف، الحساسية، الطفح الجلدي، الحكة، التعرق، الرعشة، الشعور بالقلق، الاكتئاب، الشعور بالعصبية، الشعور بالارتباك، الشعور بالعدوانية، الشعور بالاضطراب، الشعور بالذعر، الشعور بالاكتئاب، الشعور بالتوتر، الشعور بالتعب، الشعور بالنعاس، الشعور بالخدر، الشعور بالدوار، الشعور بالغثيان، الشعور بالقيء، الشعور بالإسهال، الشعور بالألم، الشعور بالحكة، الشعور بالطفح الجلدي، الشعور بالتعرق، الشعور بالرعشة، الشعور بالقلق