

لوتيبيزندول إيتاينون وتوراميسين) ٠.٣٪/٠.٥٪

مواقع الزيارات المحددة في ٢٤

درايف الاستعمال الشفهي والمستلزم

زنليت هو مزيج سيرينديبيون مع مصاد للعدوى لعلاج حالات الالتهاب العيني التي تستجيب للستيرويدات وصف الكورتيكوسستيرويدات لعلاجها وحالات العدوى الغيئية البكتيرية السطحية

وكذلك عندما يكون المرض عرضة خطر الإصابة بعدوى غيئية بكتيرية.

الجرعة وطريقة التناول

حرارة نفطة أو نقطتين من زنليت في الكيس المنخجي للعين المصابة كل أربع إلى ست ساعات.

أشكل العينات وتركيزها

محبوب زنليت على ٥ مل/مل من لوتيبيزندول إيتاينون و٣ مل/مل من توراميسين.

مواقع الاستعمال

لا يكتفى المستعمل العيني لوتيبيزندول إيتاينون، كما هو الحال مع الأدوية الغيئية الأخرى المكونة من مزيج سيرينديبيون ومصاد للعدوى، مع معظم الأعراض الفيروسية التي تصيب القرنية والمتحمة والتي تشمل التهاب القرنية

الهيسي البيسطي للأجهزة البهلوانية (المتفين)، الرؤوس، المخالق، وكذلك في حالات عدوى العين الفطرية والأعراض الفطرية التي تصيب الكائنات العينية.

غير احتقان وأحياناً احتقان

ضيق نفط زنليت في العين - قد ينبع من استخدام الكورتيكوسستيرويدات لفترات طويلة إضافية باليار، الزقا، مع تلف العصب البصري، وضيق حدة البصر وضيق مجال الرؤية. إذا تم استخدام هذا المنتج لمدة

١ أيام أو أكثر، يجب مراعاة ضغط داخل العين.

إيجاد عيادة عينية

أعجم عيادة العين (الماء البيضا)

قد ينبع من استخدام الكورتيكوسستيرويدات اعتام العين (الماء البيضا) خلف المدة.

تأنيث العين - قد ينبع من استخدام الكورتيكوسستيرويدات بعد المراجعة العينية بعدها بـ٦-٨ أسابيع، يجب أن يقوم طبيب بكلية الوصبة الميدانية وتجيد الدوا، فقط بعد فحص المريض باستخدام وسيلة تكميم مثل الشخص

الشبلية، حيث أن استخدام الكورتيكوسستيرويدات بعد المراجعة العينية بعدها بـ٦-٨ أسابيع، يجب أن يتم ترقى الفزنة أو

المجهري العدوى بالمستلزم

حالات عدوى كيسيكية - قد ينبع من استخدام الكورتيكوسستيرويدات لفترات طويلة الصالحة واستخدام الكورتيكوسستيرويدات عرضة خطر العين الفطرية التي تصيب الكائنات العينية.

الستيرويدات العيني أو زنليت من العدوى المزوجة، إذا تم تحفيز العين المصابة بـ٦-٨ أسابيع، يجب أن يتم ترقى العين المصابة

العديد من حالات عدوى العين الفيروسية لمدة أطول وفقاً لما ذكر في المرضى المستفيض.

حالات العدوى الفطرية - حالات العدوى الفطرية التي تصيب الفرزنة أكثر عرضة بشكلها للحوادث بالتزامن مع استخدام الطويل للكورتيكوسستيرويدات في المرضى الموضعية.

يجب مراعاة إمكانية غزو الفطرات العفنية في حال إصابتها بفرحة مزمنة العين المصابة بـ٦-٨ أسابيع، يجب أن يتم استخدام الكورتيكوسستيرويدات في حال إصابتها بفرحة مزمنة العين المصابة بـ٦-٨ أسابيع،

رود الغسل السليمية

أظافر الغسل السليمية الأكثر شيوعاً لدى العدوى وتم الإبلاغ عنها هي الشعور بالوخز والتهاب القرنية المتقطف السطحي، زياده ضغط داخل العين، الشعور بحرقان ووزع عند التقطير.

أظافر الغسل السليمية

أظافر الغسل السليمية الخاصة بوصف الدوا

٢٠١٧-٢٠١٨: المعلومات الكاملة المخصصة بوصف الدوا: المحظيات

١ دواعي الاستعمال والاستعمال

٢ البراعة وطريق التناول

٣ المركبات الموصى بها

٤ الضروريات الموصى بها

٥ أشكال العينات وتركيزها

٦ موانع الاستعمال

٧ حالات العدوى الفيروسية

٨ حالات العدوى الفطرية

٩ فرط الحساسية للجلوكورونيزات الأمينية

١٠ درجة الحرارة السليمية

١١ الاستعمال مع مجموعات معينة من المرض

١٢ الميل

١٣ الآثار الجانبية

١٤ المركبات الموصى بها

١٥ تأخير الالتباس

١٦ حالات العدوى الكيسيكية

١٧ حالات العدوى الفيروسية

١٨ حالات العدوى الفطرية

١٩ درجة الحرارة السليمية

٢٠ الأقسام أو الأقسام الفرعية المحددة من المعلومات الكاملة الخاصة بوصف الدوا غير مرددة

المعلومات الكاملة الخاصة بوصف الدوا

٢١ دواعي الاستعمال والاستعمال

٢٢ الضروريات الموصى بها

٢٣ تأخير الالتباس

٢٤ حالات العدوى الكيسيكية

٢٥ حالات العدوى الفيروسية

٢٦ حالات العدوى الفطرية

٢٧ فرط الحساسية للجلوكورونيزات الأمينية

٢٨ درجة الحرارة السليمية

٢٩ الأدوية الموصى بها

٣٠ عدم الصيادة

٣١ الاستعمال

٣٢ تأخير الالتباس

٣٣ الأدوية الموصى بها

٣٤ الأدوية الموصى بها

٣٥ الأدوية الموصى بها

٣٦ الأدوية الموصى بها

٣٧ الأدوية الموصى بها

٣٨ الأدوية الموصى بها

٣٩ الأدوية الموصى بها

٤٠ الأدوية الموصى بها

٤١ مصادرات

٤٢ تأخير الالتباس

٤٣ الأدوية الموصى بها

٤٤ الأدوية الموصى بها

٤٥ الأدوية الموصى بها

٤٦ الأدوية الموصى بها

٤٧ الأدوية الموصى بها

٤٨ الأدوية الموصى بها

٤٩ الأدوية الموصى بها

٥٠ الأدوية الموصى بها

٥١ الأدوية الموصى بها

٥٢ الأدوية الموصى بها

٥٣ الأدوية الموصى بها

٥٤ الأدوية الموصى بها

٥٥ الأدوية الموصى بها

٥٦ الأدوية الموصى بها

٥٧ الأدوية الموصى بها

٥٨ الأدوية الموصى بها

٥٩ الأدوية الموصى بها

٦٠ الأدوية الموصى بها

٦١ الأدوية الموصى بها

٦٢ الأدوية الموصى بها

٦٣ الأدوية الموصى بها

٦٤ الأدوية الموصى بها

٦٥ الأدوية الموصى بها

٦٦ الأدوية الموصى بها

٦٧ الأدوية الموصى بها

٦٨ الأدوية الموصى بها

٦٩ الأدوية الموصى بها

٧٠ الأدوية الموصى بها

٧١ الأدوية الموصى بها

٧٢ الأدوية الموصى بها

٧٣ الأدوية الموصى بها

٧٤ الأدوية الموصى بها

٧٥ الأدوية الموصى بها

٧٦ الأدوية الموصى بها

٧٧ الأدوية الموصى بها

٧٨ الأدوية الموصى بها

٧٩ الأدوية الموصى بها

٨٠ الأدوية الموصى بها

٨١ الأدوية الموصى بها

٨٢ الأدوية الموصى بها

٨٣ الأدوية الموصى بها

٨٤ الأدوية الموصى بها

٨٥ الأدوية الموصى بها

٨٦ الأدوية الموصى بها

٨٧ الأدوية الموصى بها

٨٨ الأدوية الموصى بها

٨٩ الأدوية الموصى بها

٩٠ الأدوية الموصى بها

٩١ الأدوية الموصى بها

٩٢ الأدوية الموصى بها

٩٣ الأدوية الموصى بها

٩٤ الأدوية الموصى بها

٩٥ الأدوية الموصى بها

٩٦ الأدوية الموصى بها

٩٧ الأدوية الموصى بها

٩٨ الأدوية الموصى بها

٩٩ الأدوية الموصى بها

١٠٠ الأدوية الموصى بها

١٠١ الأدوية الموصى بها

١٠٢ الأدوية الموصى بها

١٠٣ الأدوية الموصى بها

١٠٤ الأدوية الموصى بها

١٠٥ الأدوية الموصى بها

١٠٦ الأدوية الموصى بها

١٠٧ الأدوية الموصى بها

١٠٨ الأدوية الموصى بها

١٠٩ الأدوية الموصى بها

١١٠ الأدوية الموصى بها

١١١ الأدوية الموصى بها

١١٢ الأدوية الموصى بها

١١٣ الأدوية الموصى بها

١١٤ الأدوية الموصى بها

١١٥ الأدوية الموصى بها

١١٦ الأدوية الموصى بها

١١٧ الأدوية الموصى بها

١١٨ الأدوية الموصى بها

١١٩ الأدوية الموصى بها

١٢٠ الأدوية الموصى بها

١٢١ الأدوية الموصى بها

١٢٢ الأدوية الموصى بها

١٢٣ الأدوية الموصى بها

١٢٤ الأدوية الموصى بها

١٢٥ الأدوية الموصى بها

١٢٦ الأدوية الموصى بها

١٢٧ الأدوية الموصى بها

١٢٨ الأدوية الموصى بها

١٢٩ الأدوية الموصى بها

١٣٠ الأدوية الموصى بها

١٣١ الأدوية الموصى بها

١٣٢ الأدوية الموصى بها

١٣٣ الأدوية الموصى بها

١٣٤ الأدوية الموصى بها

١٣٥ الأدوية الموصى بها

١٣٦ الأدوية الموصى بها

١٣٧ الأدوية الموصى بها

١٣٨ الأدوية الموصى بها

١٣٩ الأدوية الموصى بها

١٤٠ الأدوية الموصى بها

١٤١ الأدوية الموصى بها

١٤٢ الأدوية الموصى بها

١٤٣ الأدوية الموصى بها

١٤٤ الأدوية الموصى بها

١٤٥ الأدوية الموصى بها

١٤٦ الأدوية الموصى بها

١٤٧ الأدوية الموصى بها

١٤٨ الأدوية الموصى بها

١٤٩ الأدوية الموصى بها

١٥٠ الأدوية الموصى بها

١٥١ الأدوية الموصى بها

١٥٢ الأدوية الموصى بها

١٥٣ الأدوية الموصى بها

١٥٤ الأدوية الموصى بها

١٥٥ الأدوية الموصى بها

١٥٦ الأدوية الموصى بها

١٥٧ الأدوية الموصى بها

١٥٨ الأدوية الموصى بها

١٥٩ الأدوية الموصى بها

١٦٠ الأدوية الموصى بها

١٦١ الأدوية الموصى بها

١٦٢ الأدوية الموصى بها

١٦٣ الأدوية الموصى بها

١٦٤ الأدوية الموصى بها

١٦٥ الأدوية الموصى بها

١٦٦ الأدوية الموصى بها

١٦٧ الأدوية الموصى بها

١٦٨ الأدوية الموصى بها

١٦٩ الأدوية الموصى بها

١٧٠ الأدوية الموصى بها

١٧١ الأدوية الموصى بها

١٧٢ الأدوية الموصى بها

١٧٣ الأدوية الموصى بها

١٧٤ الأدوية الموصى بها

١٧٥ الأدوية الموصى بها

١٧٦ الأدوية الموصى بها

١٧٧ الأدوية الموصى بها

١٧٨ الأدوية الموصى بها

١٧٩ الأدوية الموصى بها

١٨٠ الأدوية الموصى بها

١٨١ الأدوية الموصى بها

١٨٢ الأدوية الموصى بها